

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1	岐阜市打越地内	H30.9.13	死亡	雌	成体	約 100 cm	不明	H30.9.13	陽性
2	関市迫間地内	H30.9.14	捕獲	雌	成体	不明	不明	H30.9.15	陰性
3	関市迫間地内	H30.9.14	捕獲	雌	子	不明	不明	H30.9.15	陰性
4	関市迫間地内	H30.9.14	捕獲	雄	子	不明	不明	H30.9.15	陰性
5	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雄	子	不明	約 20 kg	H30.9.15	陰性
6	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雌	子	不明	約 20 kg	H30.9.15	陰性
7	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雄	子	不明	約 20 kg	H30.9.15	陰性
8	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雌	子	不明	約 20 kg	H30.9.15	陰性
9	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雄	子	不明	約 20 kg	H30.9.15	陰性
10	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雄	子	不明	約 20 kg	H30.9.15	陰性
11	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雄	成体	不明	約 50 kg	H30.9.15	陰性
12	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雄	成体	不明	約 50 kg	H30.9.15	陰性
13	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雌	成体	不明	約 50 kg	H30.9.15	陰性
14	本巣市外山地内	H30.9.14	捕獲	雄	成体	不明	約 50 kg	H30.9.15	陰性
15	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雌	成体	約 105 cm	不明	H30.9.16	陰性
16	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雌	子	約 70 cm	不明	H30.9.16	陰性
17	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雄	子	約 65 cm	不明	H30.9.16	陰性
18	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雌	子	約 70 cm	不明	H30.9.16	陰性
19	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雌	子	約 70 cm	不明	H30.9.16	陰性
20	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雌	子	約 65 cm	不明	H30.9.16	陰性
21	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雌	子	約 65 cm	不明	H30.9.16	陰性
22	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雌	子	約 65 cm	不明	H30.9.16	陰性
23	岐阜市安食地内	H30.9.15	捕獲	雄	子	約 70 cm	不明	H30.9.16	陰性
24	岐阜市大洞地内	H30.9.15	死亡	雄	子	約 60 cm	不明	H30.9.16	陽性
25	坂祝町黒岩地内	H30.9.16	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.9.17	陰性
26	関市下之保地内	H30.9.16	捕獲	雄	子	約 80 cm	不明	H30.9.17	陰性
27	山県市大桑地内	H30.9.16	捕獲	雄	成体	約 135 cm	不明	H30.9.17	陰性
28	山県市小倉地内	H30.9.16	捕獲	雌	子	約 65 cm	不明	H30.9.17	陰性
29	御嵩町上之郷地内	H30.9.16	死亡	雄	成体	約 100 cm	約 50 kg	H30.9.18	陰性
30	岐阜市山県北野地内	H30.9.17	捕獲	雌	成体	約 125 cm	不明	H30.9.18	陰性
31	岐阜市山県北野地内	H30.9.17	捕獲	雌	成体	約 100 cm	不明	H30.9.18	陰性
32	関市下之保地内	H30.9.17	捕獲	雄	子	約 80 cm	不明	H30.9.18	陰性
33	山県市梅原地内	H30.9.17	捕獲	雄	子	約 45 cm	不明	H30.9.18	陰性
34	山県市梅原地内	H30.9.17	捕獲	雌	子	約 45 cm	不明	H30.9.18	陰性
35	山県市梅原地内	H30.9.17	捕獲	雄	子	約 50 cm	不明	H30.9.18	陰性
36	山県市梅原地内	H30.9.17	捕獲	雄	子	約 50 cm	不明	H30.9.18	陰性
37	山県市梅原地内	H30.9.17	捕獲	雌	子	約 50 cm	不明	H30.9.18	陰性
38	岐阜市打越地内	H30.9.18	死亡	雄	成体	約 110 cm	不明	H30.9.19	陽性
39	岐阜市佐野地内	H30.9.18	死亡	雌	成体	約 80 cm	不明	H30.9.19	陰性
40	中津川市苗木地内	H30.9.17	捕獲	雌	子	約 60 cm	不明	H30.9.19	陰性
41	岐阜市城田寺地内	H30.9.18	死亡	雄	子	約 60 cm	不明	H30.9.19	陽性
42	八百津町和知地内	H30.9.17	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 10 kg	H30.9.19	陰性
43	美濃加茂市山之上町地内	H30.9.18	死亡	雌	成体	約 100 cm	不明	H30.9.19	陰性
44	恵那市明智町地内	H30.9.18	死亡	雌	成体	約 100 cm	不明	H30.9.19	陰性
45	高山市上宝町地内	H30.9.18	捕獲	雄	子	約 60 cm	不明	H30.9.19	陰性
46	岐阜市椿洞地内	H30.9.18	死亡	雄	子	約 60 cm	不明	H30.9.19	陽性
47	揖斐川町長良地内	H30.9.19	死亡	雄	子	約 65 cm	約 30 kg	H30.9.21	陰性
48	本巣市文殊地内	H30.9.20	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 18 kg	H30.9.22	陰性
49	本巣市神海地内	H30.9.20	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.9.22	陰性
50	揖斐川町長良地内	H30.9.20	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.9.26	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
51	揖斐川町長良地内	H30.9.20	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.9.26	陰性
52	瑞浪市日吉町地内	H30.9.20	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 60 kg	H30.9.26	陰性
53	海津市南濃町地内	H30.9.20	捕獲	雌	成体	約 90 cm	約 50 kg	H30.9.26	陰性
54	関市西田原地内	H30.9.21	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	H30.9.22	陰性
55	八百津町錦織地内	H30.9.21	死亡	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.9.22	陰性
56	山県市船越地内	H30.9.19	捕獲	雄	子	約 70 cm	不明	H30.9.22	陰性
57	山県市大桑地内	H30.9.21	捕獲	雌	成体	約 90 cm	約 30 kg	H30.9.22	陰性
58	岐阜市椿洞地内	H30.9.21	死亡	雄	子	約 65 cm	不明	H30.9.23	陽性
59	本巣市山口地内	H30.9.22	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.9.23	陰性
60	関市下之保地内	H30.9.22	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 20 kg	H30.9.26	陰性
61	関ヶ原町今須地内	H30.9.22	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 100 kg	H30.9.26	陰性
62	関市武芸川町地内	H30.9.22	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 20 kg	H30.9.26	陰性
63	本巣市山口地内	H30.9.24	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.9.25	陰性
64	本巣市山口地内	H30.9.24	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.9.25	陰性
65	本巣市山口地内	H30.9.24	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.9.25	陰性
66	恵那市東野地内	H30.9.24	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 50 kg	H30.9.28	陰性
67	可児市瀬田地内	H30.9.25	捕獲	不明	成体	約 100 cm	約 80 kg	H30.9.28	陰性
68	本巣市佐原地内	H30.9.25	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 13 kg	H30.9.26	陰性
69	山県市大桑地内	H30.9.25	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 80 kg	H30.9.26	陰性
70	関市富之保地内	H30.9.25	死亡	不明	子	約 40 cm	約 10 kg	H30.9.26	陰性
71	多治見市高田町地内	H30.9.25	死亡	不明	成体	約 130 cm	約 90 kg	H30.9.26	陰性
72	高山市新宮町地内	H30.9.25	捕獲	不明	子	約 40 cm	約 25 kg	H30.10.2	陰性
73	本巣市外山地内	H30.9.26	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 50 kg	H30.9.27	陰性
74	本巣市文殊地内	H30.9.26	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.9.27	陰性
75	本巣市文殊地内	H30.9.26	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.9.27	陰性
76	高山市丹生川町地内	H30.9.26	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 80 kg	H30.9.27	陰性
77	川辺町鹿塩地内	H30.9.26	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 20 kg	H30.10.2	陰性
78	中津川市高山地内	H30.9.26	死亡	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.9.27	陰性
79	中津川市高山地内	H30.9.26	死亡	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.9.27	陰性
80	中津川市高山地内	H30.9.26	死亡	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.9.27	陰性
81	岐阜市椿洞地内	H30.9.26	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 80 kg	H30.9.27	陽性
82	山県市大桑地内	H30.9.27	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 20 kg	H30.9.28	陰性
83	各務原市須衛地内	H30.9.27	死亡	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	H30.9.28	陽性
84	岐阜市岩利地内	H30.9.28	調査	雄	成体	約 95 cm	約 50 kg	H30.9.29	陰性
85	揖斐川町白檜地内	H30.9.28	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.10.2	陰性
86	池田町草深地内	H30.9.28	死亡	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.9.29	陰性
87	岐阜市石谷地内	H30.9.28	死亡	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.9.29	陽性
88	各務原市須衛町地内	H30.9.28	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 80 kg	H30.9.29	陽性
89	本巣市神海地内	H30.9.29	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 25 kg	H30.9.30	陰性
90	関市下之保地内	H30.9.29	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.2	陰性
91	関市下之保地内	H30.9.29	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.2	陰性
92	山県市大桑地内	H30.9.29	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 80 kg	H30.9.30	陰性
93	山県市大桑地内	H30.9.29	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.9.30	陰性
94	関市下之保地内	H30.9.29	死亡	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	H30.9.30	陰性
95	可児市二野地内	H30.9.29	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 90 kg	H30.10.2	陰性
96	中津川市神坂地内	H30.9.29	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 90 kg	H30.10.2	陰性
97	山県市上願地内	H30.9.30	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.1	陰性
98	岐阜市芥見影山地内	H30.9.30	調査	雄	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.10.1	陽性
99	本巣市山口地内	H30.10.1	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 13 kg	H30.10.2	陰性
100	垂井町宮代地内	H30.10.1	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.5	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
101	美濃加茂市山之上町地内	H30.10.1	捕獲	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H30.10.5	陰性
102	岐阜市城田寺地内	H30.10.2	調査	雌	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.10.3	陽性
103	岐阜市達目洞地内	H30.10.2	死亡	雌	子	約 45 cm	約 7 kg	H30.10.3	陰性
104	各務原市各務東町地内	H30.10.3	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.4	陽性
105	各務原市須衛地内	H30.10.3	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.4	陽性
106	高山市塩屋町地内	H30.10.3	捕獲	雄	成体	約 80 cm	約 50 kg	H30.10.10	陰性
107	山県市松尾地内	H30.10.3	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 50 kg	H30.10.4	陰性
108	岐阜市彦坂地内	H30.10.4	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.5	陽性
109	山県市神崎地内	H30.10.4	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 60 kg	H30.10.10	陰性
110	土岐市鶴里町地内	H30.10.4	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.10.10	陰性
111	山県市梅原地内	H30.10.4	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H30.10.5	陰性
112	富加町大平賀地内	H30.10.4	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.5	陰性
113	山県市日永地内	H30.10.4	捕獲	雌	成体	約 90 cm	約 40 kg	H30.10.10	陰性
114	岐阜市秋沢地内	H30.10.5	調査	雄	子	約 70 cm	約 30 kg	H30.10.6	陰性
115	岐阜市諏訪山地内	H30.10.5	調査	雄	成体	約 125 cm	約 70 kg	H30.10.6	陽性
116	揖斐川町谷汲長瀬地内	H30.10.5	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.6	陰性
117	岐阜市打越地内	H30.10.5	死亡	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.6	陽性
118	岐阜市秋沢地内	H30.10.6	調査	雌	子	約 75 cm	約 30 kg	H30.10.7	陰性
119	岐阜市秋沢地内	H30.10.6	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.10.7	陰性
120	岐阜市秋沢地内	H30.10.6	調査	雄	子	約 80 cm	約 35 kg	H30.10.7	陰性
121	岐阜市秋沢地内	H30.10.6	調査	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.7	陰性
122	山県市梅原地内	H30.10.6	調査	雄	子	約 80 cm	約 30 kg	H30.10.7	陰性
123	本巣市文殊地内	H30.10.6	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	H30.10.7	陰性
124	本巣市神海地内	H30.10.6	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 30 kg	H30.10.7	陰性
125	岐阜市外山地内	H30.10.6	調査	雌	子	約 75 cm	約 25 kg	H30.10.7	陰性
126	本巣市文殊地内	H30.10.7	調査	雌	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.8	陰性
127	本巣市文殊地内	H30.10.7	調査	雌	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.8	陰性
128	本巣市文殊地内	H30.10.7	調査	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.8	陰性
129	本巣市文殊地内	H30.10.7	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.8	陰性
130	岐阜市秋沢地内	H30.10.7	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.8	陰性
131	岐阜市秋沢地内	H30.10.7	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.10.8	陰性
132	山県市梅原地内	H30.10.7	調査	雄	成体	約 100 cm	約 50 kg	H30.10.8	陰性
133	岐阜市城田寺地内	H30.10.7	死亡	雄	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.10.8	陽性
134	山県市梅原地内	H30.10.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.10.9	陰性
135	本巣市山口地内	H30.10.8	死亡	雄	子	約 55 cm	約 13 kg	H30.10.9	陰性
136	可児市長洞地内	H30.10.8	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.10.12	陰性
137	揖斐川町春日美東地内	H30.10.8	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 100 kg	H30.10.12	陰性
138	揖斐川町坂内坂本地内	H30.10.8	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 60 kg	H30.10.12	陰性
139	各務原市須衛町地内	H30.10.8	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.10.9	陽性
140	山県市大桑地内	H30.10.8	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.9	陰性
141	岐阜市打越地内	H30.10.9	調査	雌	成体	約 100 cm	約 70 kg	H30.10.10	陽性
142	関市武芸川町地内	H30.10.9	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.12	陰性
143	恵那市飯地町地内	H30.10.8	捕獲	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.10.12	陰性
144	本巣市神海地内	H30.10.9	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 30 kg	H30.10.10	陰性
145	本巣市金原地内	H30.10.9	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 70 kg	H30.10.10	陰性
146	山県市洞田地内	H30.10.9	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.10	陰性
147	七宗町上麻生地内	H30.10.9	死亡	雌	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.10.10	陰性
148	山県市大桑地内	H30.10.10	調査	雌	子	約 75 cm	約 30 kg	H30.10.11	陰性
149	本巣市山口地内	H30.10.10	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.10.11	陰性
150	高山市清見町地内	H30.10.11	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 90 kg	H30.10.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
151	海津市南濃町地内	H30.10.11	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.16	陰性
152	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.10.12	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.10.13	陰性
153	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.10.12	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 15 kg	H30.10.13	陰性
154	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.10.12	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 15 kg	H30.10.13	陰性
155	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.10.12	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 15 kg	H30.10.13	陰性
156	各務原市鵜沼宝積寺町地内	H30.10.12	死亡	雌	成体	約 105 cm	約 35 kg	H30.10.13	陽性
157	川辺町鹿塩地内	H30.10.12	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 35 kg	H30.10.16	陰性
158	美濃市横越地内	H30.10.12	調査	雄	成体	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.13	陰性
159	美濃市富野地内	H30.10.12	調査	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H30.10.14	陰性
160	山県市大桑地内	H30.10.13	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.10.14	陰性
161	山県市赤尾地内	H30.10.13	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.14	陰性
162	各務原市各務地内	H30.10.13	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.14	陽性
163	各務原市各務地内	H30.10.13	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H30.10.14	陽性
164	各務原市各務地内	H30.10.13	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.14	陽性
165	各務原市各務地内	H30.10.13	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.14	陽性
166	岐阜市城田寺地内	H30.10.13	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H30.10.14	陽性
167	美濃加茂市山之上町地内	H30.10.14	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.15	陰性
168	本巣市日当地内	H30.10.14	捕獲	雄	子	約 55 cm	約 6 kg	H30.10.15	陰性
169	山県市梅原地内	H30.10.14	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.10.15	陰性
170	恵那市三郷町地内	H30.10.15	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 90 kg	H30.10.16	陰性
171	七宗町神淵地内	H30.10.15	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.16	陰性
172	瑞浪市日吉町地内	H30.10.15	捕獲	雌	子	約 50 cm	約 6 kg	H30.10.16	陰性
173	御嵩町次月地内	H30.10.15	死亡	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.10.16	陰性
174	大垣市上石津町地内	H30.10.15	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.10.16	陰性
175	山県市洞田地内	H30.10.16	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.17	陰性
176	岐阜市彦坂地内	H30.10.16	調査	雌	成体	約 120 cm	約 75 kg	H30.10.17	陽性
177	瑞浪市陶町大川地内	H30.10.16	捕獲	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	H30.10.17	陰性
178	美濃市横越地内	H30.10.16	調査	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.17	陰性
179	下呂市萩原町四美地内	H30.10.16	捕獲	雌	子	約 56 cm	約 15 kg	H30.10.17	陰性
180	揖斐川町坂内地内	H30.10.16	捕獲	雄	成体	約 96 cm	約 45 kg	H30.10.17	陰性
181	岐阜市城田寺地内	H30.10.16	死亡	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.17	陽性
182	各務原市各務地内	H30.10.16	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.17	陽性
183	山県市大桑地内	H30.10.16	調査	雌	成体	約 115 cm	約 60 kg	H30.10.17	陰性
184	岐阜市打越地内	H30.10.16	死亡	雌	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.10.18	陽性
185	山県市小倉地内	H30.10.17	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.18	陰性
186	美濃市神洞地内	H30.10.17	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.10.18	陰性
187	山県市梅原地内	H30.10.17	調査	雄	成体	約 105 cm	約 70 kg	H30.10.18	陰性
188	岐阜市彦坂地内	H30.10.17	調査	雌	成体	約 90 cm	約 40 kg	H30.10.18	陽性
189	岐阜市石谷地内	H30.10.17	調査	雌	成体	約 105 cm	約 60 kg	H30.10.18	陽性
190	岐阜市石谷地内	H30.10.18	調査	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.20	陽性
191	本巣市文殊地内	H30.10.19	調査	雌	子	約 75 cm	約 25 kg	H30.10.20	陰性
192	多治見市笠原町地内	H30.10.19	死亡	雄	子	約 70 cm	約 15 kg	H30.10.20	陰性
193	本巣市日当地内	H30.10.19	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 90 kg	H30.10.20	陰性
194	岐阜市洞地内	H30.10.19	調査	雌	成体	約 75 cm	約 30 kg	H30.10.20	陰性
195	美濃市富野地内	H30.10.19	調査	雄	子	約 70 cm	約 15 kg	H30.10.20	陰性
196	美濃市富野地内	H30.10.19	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.20	陰性
197	美濃市富野地内	H30.10.19	調査	雄	子	約 75 cm	約 15 kg	H30.10.20	陰性
198	美濃市富野地内	H30.10.19	調査	雌	子	約 75 cm	約 15 kg	H30.10.20	陰性
199	山県市梅原地内	H30.10.19	調査	雄	成体	約 110 cm	約 60 kg	H30.10.20	陰性
200	関市倉知南地内	H30.10.19	調査	雄	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.10.20	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
201	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.10.19	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.20	陰性
202	山県市大桑地内	H30.10.20	調査	雄	成体	約 105 cm	約 60 kg	H30.10.21	陰性
203	各務原市鷺沼地内	H30.10.20	死亡	雄	成体	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.21	陽性
204	美濃市大矢田地内	H30.10.20	調査	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.21	陰性
205	可児市室原地内	H30.10.20	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 80 kg	H30.10.21	陰性
206	恵那市武並町地内	H30.10.20	捕獲	雄	成体	約 90 cm	約 40 kg	H30.10.22	陰性
207	岐阜市村山地内	H30.10.20	調査	雌	成体	約 112 cm	約 70 kg	H30.10.22	陰性
208	坂祝町深萱地内	H30.10.21	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.22	陰性
209	大野町野地内	H30.10.21	調査	雌	成体	約 113 cm	約 45 kg	H30.10.22	陰性
210	山県市大桑地内	H30.10.21	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	H30.10.22	陰性
211	山県市掛地内	H30.10.21	捕獲	雄	子	約 67 cm	約 15 kg	H30.10.22	陰性
212	山県市掛地内	H30.10.21	捕獲	雄	子	約 62 cm	約 15 kg	H30.10.22	陰性
213	本巣市法林寺地内	H30.10.22	調査	雄	子	約 75 cm	約 30 kg	H30.10.23	陰性
214	本巣市法林寺地内	H30.10.22	調査	雄	子	約 77 cm	約 30 kg	H30.10.23	陰性
215	本巣市法林寺地内	H30.10.22	調査	雄	子	約 80 cm	約 30 kg	H30.10.23	陰性
216	美濃加茂市三和町地内	H30.10.22	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.10.23	陰性
217	七宗町神淵地内	H30.10.22	捕獲	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.23	陰性
218	坂祝町黒岩地内	H30.10.22	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.23	陰性
219	本巣市日当地内	H30.10.22	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 15 kg	H30.10.23	陰性
220	郡上市美並町大原地内	H30.10.22	捕獲	雌	子	約 78 cm	約 15 kg	H30.10.23	陰性
221	揖斐川町坂内川上地内	H30.10.22	調査	雌	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.10.23	陰性
222	海津市南濃町地内	H30.10.22	捕獲	雄	成体	約 80 cm	約 35 kg	H30.10.23	陰性
223	富加町大平賀地内	H30.10.22	調査	雄	成体	約 110 cm	約 60 kg	H30.10.23	陰性
224	富加町加治田地内	H30.10.22	調査	雌	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.10.23	陰性
225	岐阜市秋沢地内	H30.10.23	調査	雄	子	約 80 cm	約 35 kg	H30.10.24	陰性
226	岐阜市秋沢地内	H30.10.23	調査	雄	子	約 80 cm	約 35 kg	H30.10.24	陰性
227	岐阜市秋沢地内	H30.10.23	調査	雌	子	約 75 cm	約 35 kg	H30.10.24	陰性
228	岐阜市則松地内	H30.10.23	調査	雄	子	約 85 cm	約 30 kg	H30.10.24	陰性
229	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.10.23	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.24	陰性
230	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.10.23	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.24	陰性
231	美濃市神洞地内	H30.10.23	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	H30.10.24	陰性
232	美濃市御手洗地内	H30.10.23	調査	雄	子	約 57 cm	約 15 kg	H30.10.24	陰性
233	郡上市八幡町地内	H30.10.23	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 50 kg	H30.10.24	陰性
234	山県市椎倉地内	H30.10.23	調査	雄	成体	約 105 cm	約 60 kg	H30.10.24	陰性
235	山県市大桑地内	H30.10.23	調査	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.24	陰性
236	山県市大桑地内	H30.10.23	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.24	陰性
237	岐阜市岩崎地内	H30.10.23	死亡	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.24	陽性
238	山県市大桑地内	H30.10.23	調査	雌	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.10.25	陰性
239	山県市大桑地内	H30.10.23	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.10.25	陰性
240	本巣市法林寺地内	H30.10.24	調査	雌	子	約 75 cm	約 25 kg	H30.10.25	陰性
241	美濃加茂市下米田町地内	H30.10.24	調査	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	H30.10.26	陰性
242	美濃加茂市下米田町地内	H30.10.24	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	H30.10.26	陰性
243	山県市岩佐地内	H30.10.24	調査	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.25	陰性
244	山県市岩佐地内	H30.10.24	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.25	陰性
245	山県市岩佐地内	H30.10.24	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.25	陰性
246	瑞浪市明世町地内	H30.10.24	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 45 kg	H30.10.25	陰性
247	関市迫間地内	H30.10.24	死亡	雄	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.10.25	陽性
248	美濃市大矢田地内	H30.10.24	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.25	陰性
249	美濃市大矢田地内	H30.10.24	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.25	陰性
250	美濃市大矢田地内	H30.10.24	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.25	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
251	美濃市大矢田地内	H30.10.24	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.25	陰性
252	美濃市保木脇地内	H30.10.24	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.25	陰性
253	飛騨市古川町地内	H30.10.24	捕獲	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	H30.10.25	陰性
254	岐阜市御望地内	H30.10.25	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.26	陰性
255	本巣市根尾平野地内	H30.10.25	調査	雄	成体	約 120 cm	約 100 kg	H30.10.26	陰性
256	揖斐川町志津山地内	H30.10.25	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.26	陰性
257	岐阜市佐野地内	H30.10.25	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.26	陰性
258	揖斐川町坂内川上地内	H30.10.25	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H30.10.27	陰性
259	揖斐川町谷汲長瀬地内	H30.10.26	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.27	陰性
260	揖斐川町谷汲長瀬地内	H30.10.26	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.27	陰性
261	美濃市片知地内	H30.10.26	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.27	陰性
262	岐阜市則松地内	H30.10.26	調査	雄	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.10.27	陰性
263	岐阜市洞地内	H30.10.26	調査	雄	成体	約 85 cm	約 40 kg	H30.10.27	陰性
264	岐阜市洞地内	H30.10.26	調査	雄	成体	約 85 cm	約 40 kg	H30.10.27	陰性
265	岐阜市芥見地内	H30.10.26	死亡	雌	成体	約 130 cm	約 70 kg	H30.10.27	陽性
266	瑞浪市日吉町地内	H30.10.26	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 15 kg	H30.10.27	陰性
267	山県市大桑地内	H30.10.26	調査	雌	成体	約 140 cm	約 80 kg	H30.10.27	陰性
268	本巣市木知原地内	H30.10.27	調査	雄	成体	約 95 cm	約 50 kg	H30.10.28	陰性
269	美濃市安毛地内	H30.10.27	調査	雌	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.28	陰性
270	山県市洞地内	H30.10.27	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H30.10.28	陰性
271	富加町加治田地内	H30.10.27	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.10.28	陰性
272	関ヶ原町今須地内	H30.10.28	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.29	陰性
273	可児市西帷子地内	H30.10.28	捕獲	雌	子	約 55 cm	約 10 kg	H30.10.29	陰性
274	富加町加治田地内	H30.10.28	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.29	陰性
275	関市神野地内	H30.10.28	調査	雌	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.10.29	陰性
276	関市神野地内	H30.10.28	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.10.29	陰性
277	関市神野地内	H30.10.28	調査	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.29	陰性
278	関市神野地内	H30.10.28	調査	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.10.29	陰性
279	関市神野地内	H30.10.28	調査	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	H30.10.29	陰性
280	山県市長滝地内	H30.10.28	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 70 kg	H30.10.29	陰性
281	富加町大平賀地内	H30.10.28	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.29	陰性
282	岐阜市雛倉地内	H30.10.28	調査	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.29	陰性
283	岐阜市雛倉地内	H30.10.28	調査	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.29	陰性
284	岐阜市雛倉地内	H30.10.28	調査	雄	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.29	陰性
285	岐阜市雛倉地内	H30.10.28	調査	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.29	陰性
286	関市稲口地内	H30.10.28	調査	雌	成体	約 95 cm	約 60 kg	H30.10.29	陽性
287	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.10.29	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.10.31	陰性
288	岐阜市秋沢地内	H30.10.29	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
289	山県市椎倉地内	H30.10.29	調査	雌	成体	約 120 cm	約 80 kg	H30.10.31	陰性
290	中津川市高山地内	H30.10.29	死亡	雌	成体	約 130 cm	約 100 kg	H30.10.31	陰性
291	関市神野地内	H30.10.29	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
292	関市神野地内	H30.10.29	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
293	関市神野地内	H30.10.29	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
294	関市神野地内	H30.10.29	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
295	関市神野地内	H30.10.29	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
296	山県市出戸地内	H30.10.29	調査	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.31	陰性
297	岐阜市彦坂地内	H30.10.29	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.31	陽性
298	美濃加茂市三和町地内	H30.10.29	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H30.10.31	陰性
299	瑞浪市釜戸町地内	H30.10.29	死亡	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
300	瑞浪市日吉町地内	H30.10.29	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.31	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
301	瑞浪市陶町地内	H30.10.29	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.31	陰性
302	岐阜市佐野地内	H30.10.29	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
303	岐阜市佐野地内	H30.10.30	調査	雌	子	約 85 cm	約 25 kg	H30.10.31	陰性
304	可児市西帷子地内	H30.10.30	捕獲	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.31	陽性
305	本巣市根尾大井地内	H30.10.30	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
306	揖斐川町若松地内	H30.10.30	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
307	揖斐川町若松地内	H30.10.30	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
308	八百津町八百津地内	H30.10.30	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.10.31	陰性
309	中津川市蛭川地内	H30.10.29	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.31	陰性
310	中津川市蛭川地内	H30.10.29	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.10.31	陰性
311	本巣市法林寺地内	H30.10.30	調査	雄	子	約 70 cm	約 25 kg	H30.10.31	陰性
312	岐阜市長良古津地内	H30.10.31	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.11.1	陰性
313	本巣市神海地内	H30.10.31	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.11.1	陰性
314	美濃市安毛地内	H30.10.31	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H30.11.1	陰性
315	美濃市安毛地内	H30.10.31	調査	雄	成体	約 110 cm	約 60 kg	H30.11.1	陰性
316	岐阜市佐野地内	H30.10.31	調査	雌	成体	約 115 cm	約 70 kg	H30.11.1	陰性
317	山県市佐賀地内	H30.11.1	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.2	陽性
318	中津川市高山地内	H30.11.1	死亡	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.11.2	陰性
319	高山市丹生川町地内	H30.11.1	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.2	陰性
320	岐阜市佐野地内	H30.11.2	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.11.3	陰性
321	美濃加茂市山之上町地内	H30.11.2	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.3	陰性
322	美濃加茂市山之上町地内	H30.11.3	調査	雄	子	約 95 cm	約 20 kg	H30.11.4	陰性
323	岐阜市岩崎地内	H30.11.3	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 40 kg	H30.11.4	陽性
324	岐阜市安食地内	H30.11.3	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.11.4	陰性
325	美濃加茂市下米田町地内	H30.11.3	調査	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.11.4	陰性
326	可児市久々利地内	H30.11.3	調査	雄	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.11.4	陰性
327	岐阜市安食地内	H30.11.4	調査	雄	子	約 90 cm	約 25 kg	H30.11.5	陰性
328	岐阜市安食地内	H30.11.4	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.5	陰性
329	岐阜市安食地内	H30.11.4	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.5	陰性
330	岐阜市雛倉地内	H30.11.4	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.5	陰性
331	岐阜市安食地内	H30.11.4	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.5	陰性
332	岐阜市佐野地内	H30.11.4	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.5	陰性
333	岐阜市椿洞地内	H30.11.5	捕獲	雌	成体	約 105 cm	約 60 kg	H30.11.6	陽性
334	関市倉知地内	H30.11.5	調査	雄	成体	約 125 cm	約 90 kg	H30.11.6	陽性
335	中津川市阿木地内	H30.11.5	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.7	陰性
336	郡上市八幡町美山地内	H30.11.5	死亡	雌	子	約 50 cm	約 10 kg	H30.11.7	陰性
337	岐阜市秋沢地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.11.7	陰性
338	岐阜市秋沢地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.11.7	陰性
339	岐阜市秋沢地内	H30.11.6	調査	雌	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.11.7	陰性
340	岐阜市秋沢地内	H30.11.6	調査	雌	子	約 60 cm	約 15 kg	H30.11.7	陰性
341	岐阜市秋沢地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.7	陰性
342	岐阜市秋沢地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.7	陰性
343	岐阜市佐野地内	H30.11.6	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.7	陰性
344	山県市大桑地内	H30.11.6	調査	雄	成体	約 100 cm	約 45 kg	H30.11.7	陰性
345	美濃市大矢田地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.11.7	陰性
346	岐阜市安食地内	H30.11.6	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.7	陰性
347	岐阜市安食地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 95 cm	約 30 kg	H30.11.7	陰性
348	岐阜市安食地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 90 cm	約 30 kg	H30.11.7	陰性
349	岐阜市安食地内	H30.11.6	調査	雌	子	約 90 cm	約 25 kg	H30.11.7	陰性
350	岐阜市安食地内	H30.11.6	調査	雌	子	約 85 cm	約 25 kg	H30.11.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
351	岐阜市安食地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.7	陰性
352	美濃加茂市三和町地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.8	陰性
353	美濃加茂市三和町地内	H30.11.6	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.8	陰性
354	美濃加茂市三和町地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.8	陰性
355	美濃加茂市三和町地内	H30.11.6	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.8	陰性
356	大野町古川地内	H30.11.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.8	陰性
357	関市倉知地内	H30.11.7	調査	雌	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.11.8	陽性
358	富加町加治田地内	H30.11.7	調査	雌	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.11.8	陰性
359	山県市大桑地内	H30.11.7	調査	雌	成体	約 120 cm	約 80 kg	H30.11.8	陰性
360	関市下之保地内	H30.11.8	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.9	陰性
361	岐阜市安食地内	H30.11.8	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.9	陰性
362	岐阜市安食地内	H30.11.8	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.9	陰性
363	岐阜市安食地内	H30.11.8	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.9	陰性
364	岐阜市雛倉地内	H30.11.8	調査	雌	子	約 75 cm	約 30 kg	H30.11.9	陰性
365	本巣市山口地内	H30.11.9	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 100 kg	H30.11.10	陰性
366	関市倉知地内	H30.11.9	調査	雌	成体	約 110 cm	約 55 kg	H30.11.10	陰性
367	岐阜市打越地内	H30.11.9	調査	雄	成体	約 130 cm	約 90 kg	H30.11.10	陽性
368	富加町大平賀地内	H30.11.9	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.11.10	陰性
369	中津川市福岡地内	H30.11.9	死亡	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.10	陰性
370	中津川市福岡地内	H30.11.9	死亡	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.11.10	陰性
371	岐阜市秋沢地内	H30.11.10	調査	雄	子	約 65 cm	約 15 kg	H30.11.13	陰性
372	関市倉知地内	H30.11.10	調査	雌	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.11.13	陽性
373	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.11.10	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
374	山県市梅原地内	H30.11.10	調査	雄	子	約 85 cm	約 30 kg	H30.11.13	陰性
375	山県市梅原地内	H30.11.10	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.11.13	陰性
376	揖斐川町谷汲地内	H30.11.11	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
377	岐阜市村山地内	H30.11.11	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
378	関市小屋名地内	H30.11.11	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
379	美濃市大矢田地内	H30.11.12	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
380	美濃市大矢田地内	H30.11.12	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
381	美濃市大矢田地内	H30.11.12	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
382	美濃市大矢田地内	H30.11.12	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
383	美濃市大矢田地内	H30.11.12	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.13	陰性
384	岐阜市椿洞地内	H30.11.13	死亡	雌	子	約 75 cm	約 15 kg	H30.11.14	陽性
385	本巣市文殊地内	H30.11.13	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.14	陰性
386	山県市梅原地内	H30.11.13	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	H30.11.14	陰性
387	美濃市小倉地内	H30.11.13	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.14	陰性
388	関市西神野地内	H30.11.13	調査	雌	子	約 95 cm	約 30 kg	H30.11.14	陰性
389	揖斐川町谷汲神原地内	H30.11.14	調査	雌	成体	約 105 cm	約 45 kg	H30.11.15	陰性
390	恵那市東野地内	H30.11.15	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.11.16	陰性
391	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.11.15	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.16	陰性
392	本巣市木知原地内	H30.11.16	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.17	陰性
393	本巣市木知原地内	H30.11.16	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.17	陰性
394	美濃加茂市下米田町地内	H30.11.16	調査	雄	子	約 90 cm	約 25 kg	H30.11.17	陰性
395	関市倉知地内	H30.11.16	死亡	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	H30.11.17	陽性
396	多治見市大原町地内	H30.11.16	調査	雄	成体	約 130 cm	約 90 kg	H30.11.17	陰性
397	関市倉知地内	H30.11.16	調査	雌	子	約 95 cm	約 25 kg	H30.11.17	陰性
398	岐阜市安食地内	H30.11.17	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
399	多治見市大原町地内	H30.11.17	調査	雄	子	約 95 cm	約 30 kg	H30.11.20	陰性
400	各務原市鷺沼山崎町地内	H30.11.17	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.11.20	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
401	揖斐川町長良地内	H30.11.17	死亡	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
402	美濃市松森地内	H30.11.17	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
403	美濃市松森地内	H30.11.17	調査	雌	子	約 90 cm	約 30 kg	H30.11.20	陰性
404	関市西神野地内	H30.11.17	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
405	大野町野地内	H30.11.18	調査	雄	成体	約 125 cm	約 70 kg	H30.11.20	陰性
406	関市小野地内	H30.11.18	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
407	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.11.18	調査	雌	成体	約 120 cm	約 80 kg	H30.11.20	陰性
408	関市迫間地内	H30.11.18	死亡	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	H30.11.20	陽性
409	大野町稲富地内	H30.11.19	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
410	大野町稲富地内	H30.11.19	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
411	大野町稲富地内	H30.11.19	調査	雄	子	約 78 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
412	多治見市西山町地内	H30.11.19	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
413	多治見市西山町地内	H30.11.19	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.20	陰性
414	岐阜市石谷地内	H30.11.19	調査	雌	成体	約 115 cm	約 80 kg	H30.11.20	陰性
415	揖斐川町谷汲長瀬地内	H30.11.19	調査	雄	子	約 90 cm	約 30 kg	H30.11.20	陰性
416	美濃市松森地内	H30.11.19	調査	雄	成体	約 120 cm	約 80 kg	H30.11.20	陰性
417	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.11.19	調査	雌	成体	約 120 cm	約 90 kg	H30.11.20	陰性
418	富加町夕田地内	H30.11.19	調査	雄	子	約 80 cm	約 17 kg	H30.11.20	陰性
419	本巣市金原地内	H30.11.19	調査	雌	子	約 70 cm	約 30 kg	H30.11.20	陰性
420	本巣市神海地内	H30.11.20	調査	雌	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.11.21	陰性
421	本巣市外山地内	H30.11.20	調査	雌	子	約 70 cm	約 10 kg	H30.11.21	陰性
422	岐阜市城田寺地内	H30.11.20	死亡	不明	子	不明	不明	H30.11.21	陽性
423	美濃市横越地内	H30.11.20	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.11.21	陰性
424	関市小迫間地内	H30.11.20	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.21	陽性
425	山県市大桑地内	H30.11.21	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	H30.11.22	陰性
426	関市小野地内	H30.11.21	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.22	陰性
427	関市小野地内	H30.11.21	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.22	陰性
428	関市小野地内	H30.11.21	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.22	陰性
429	関市小野地内	H30.11.21	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.22	陰性
430	関市下有知地内	H30.11.21	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.22	陰性
431	各務原市須衛町地内	H30.11.21	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.22	陽性
432	各務原市須衛町地内	H30.11.21	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.22	陽性
433	各務原市須衛町地内	H30.11.21	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.22	陽性
434	岐阜市雛倉地内	H30.11.22	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.23	陰性
435	各務原市須衛地内	H30.11.22	死亡	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H30.11.23	陽性
436	関市神野地内	H30.11.23	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.24	陰性
437	関市神野地内	H30.11.23	調査	雄	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.11.24	陰性
438	坂祝町勝山地内	H30.11.24	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.27	陽性
439	御嵩町古屋敷地内	H30.11.24	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
440	御嵩町古屋敷地内	H30.11.24	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
441	御嵩町古屋敷地内	H30.11.24	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
442	御嵩町古屋敷地内	H30.11.24	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
443	関市志津野地内	H30.11.24	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
444	関市志津野地内	H30.11.25	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
445	関市上大野地内	H30.11.25	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.11.27	陰性
446	関市上大野地内	H30.11.25	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
447	関市上大野地内	H30.11.25	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
448	関市上大野地内	H30.11.25	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
449	山県市梅原地内	H30.11.25	調査	雌	子	約 80 cm	約 25 kg	H30.11.27	陰性
450	御嵩町比衣地内	H30.11.26	調査	雄	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.11.27	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
451	岐阜市雛倉地内	H30.11.26	調査	雄	子	約 80 cm	約 30 kg	H30.11.27	陰性
452	揖斐川町谷汲神原地内	H30.11.26	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
453	八百津町和知地内	H30.11.26	死亡	雄	成体	約 115 cm	約 40 kg	H30.11.27	陽性
454	山県市大桑地内	H30.11.26	調査	雄	子	約 75 cm	約 25 kg	H30.11.27	陰性
455	関市上之保地内	H30.11.26	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.11.27	陰性
456	岐阜市奥地内	H30.11.27	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.28	陰性
457	関市西神野地内	H30.11.27	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.28	陰性
458	関市西神野地内	H30.11.27	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.11.28	陰性
459	岐阜市安食地内	H30.11.27	調査	雄	成体	約 130 cm	約 100 kg	H30.11.28	陰性
460	山県市大桑地内	H30.11.27	調査	雄	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.11.28	陰性
461	御嵩町中地内	H30.11.28	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.11.29	陰性
462	可児市二野地内	H30.11.28	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.11.29	陰性
463	関市倉知地内	H30.11.28	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.11.29	陽性
464	岐阜市佐野地内	H30.11.28	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.11.29	陰性
465	岐阜市粟野西地内	H30.11.28	死亡	不明	子	不明	不明	H30.11.29	陰性
466	関市塔ノ洞地内	H30.11.29	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	H30.11.30	陰性
467	川辺町比久見地内	H30.11.29	調査	雌	子	約 65 cm	約 30 kg	H30.11.30	陰性
468	岐阜市奥地内	H30.11.30	調査	雄	子	約 55 cm	約 10 kg	H30.12.1	陰性
469	美濃加茂市山之上町地内	H30.11.30	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.1	陰性
470	各務原市各務地内	H30.11.30	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.12.1	陽性
471	山県市洞田地内	H30.11.30	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.1	陰性
472	揖斐川町谷汲名札地内	H30.11.30	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.1	陰性
473	関市志津野地内	H30.11.30	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H30.12.1	陰性
474	関市神野地内	H30.11.30	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H30.12.1	陰性
475	関市神野地内	H30.11.30	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H30.12.1	陰性
476	各務原市松が丘地内	H30.11.30	死亡	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.1	陽性
477	可児市兼山地内	H30.12.1	捕獲	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.4	陰性
478	山県市長滝地内	H30.12.1	調査	雌	成体	約 100 cm	約 50 kg	H30.12.4	陰性
479	八百津町八百津地内	H30.12.2	調査	雄	成体	約 135 cm	約 100 kg	H30.12.4	陽性
480	八百津町上牧野地内	H30.12.2	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.4	陰性
481	本巣市神海地内	H30.12.3	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H30.12.4	陰性
482	関市武芸川町地内	H30.12.3	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.4	陰性
483	川辺町下麻生地内	H30.12.3	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.4	陰性
484	川辺町下麻生地内	H30.12.3	捕獲	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.4	陰性
485	川辺町下麻生地内	H30.12.3	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.4	陰性
486	可児市西帷子地内	H30.12.4	調査	雄	成体	約 100 cm	約 40 kg	H30.12.5	陽性
487	各務原市各務東町地内	H30.12.4	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 50 kg	H30.12.5	陽性
488	各務原市各務東町地内	H30.12.4	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.12.5	陽性
489	八百津町上牧野地内	H30.12.5	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.12.6	陰性
490	岐阜市出屋敷地内	H30.12.5	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.6	陰性
491	川辺町下麻生地内	H30.12.5	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.6	陰性
492	川辺町下麻生地内	H30.12.5	捕獲	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.6	陰性
493	美濃市松森地内	H30.12.5	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.6	陰性
494	本巣市神海地内	H30.12.6	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.12.7	陰性
495	関市志津野地内	H30.12.6	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.7	陰性
496	可児市二野地内	H30.12.6	捕獲	雄	子	約 90 cm	約 25 kg	H30.12.7	陽性
497	岐阜市岩利地内	H30.12.6	調査	雌	子	約 85 cm	約 25 kg	H30.12.7	陰性
498	岐阜市彦坂地内	H30.12.6	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.7	陽性
499	坂祝町取組地内	H30.12.6	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.7	陽性
500	川辺町比久見地内	H30.12.6	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.12.7	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
501	可児市柿下地内	H30.12.7	死亡	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	H30.12.8	陰性
502	関市桐ヶ丘地内	H30.12.7	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.8	陽性
503	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.7	調査	雄	子	約 75 cm	約 30 kg	H30.12.11	陰性
504	岐阜市秋沢地内	H30.12.8	調査	雄	子	約 80 cm	約 30 kg	H30.12.11	陰性
505	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.9	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.11	陰性
506	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.9	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.11	陰性
507	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.9	調査	雄	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.12.11	陰性
508	関市小迫間地内	H30.12.9	死亡	雌	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.12.11	陽性
509	八百津町上飯田地内	H30.12.9	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H30.12.11	陽性
510	岐阜市北野地内	H30.12.10	調査	雄	子	約 80 cm	約 30 kg	H30.12.11	陰性
511	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.10	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.11	陰性
512	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.10	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.11	陰性
513	可児市久々利地内	H30.12.10	捕獲	雌	成体	約 90 cm	約 30 kg	H30.12.11	陰性
514	岐阜市洞地内	H30.12.10	調査	雌	子	約 80 cm	約 30 kg	H30.12.11	陰性
515	美濃市松森地内	H30.12.10	調査	雌	子	約 75 cm	約 25 kg	H30.12.11	陰性
516	本巣市外山地内	H30.12.10	調査	雄	成体	約 100 cm	約 45 kg	H30.12.11	陰性
517	富加町大山地内	H30.12.11	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.12.12	陰性
518	富加町加治田地内	H30.12.11	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H30.12.12	陰性
519	各務原市各務地内	H30.12.9	死亡	雌	成体	約 100 cm	約 45 kg	H30.12.12	陽性
520	岐阜市秋沢地内	H30.12.12	調査	雌	成体	約 110 cm	約 50 kg	H30.12.13	陰性
521	岐阜市秋沢地内	H30.12.12	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.13	陰性
522	本巣市外山地内	H30.12.12	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.12.13	陰性
523	本巣市佐原地内	H30.12.12	調査	雌	子	約 50 cm	約 15 kg	H30.12.13	陰性
524	山県市洞田地内	H30.12.12	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.13	陰性
525	本巣市木知原地内	H30.12.13	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.12.14	陰性
526	川辺町下麻生地内	H30.12.13	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.14	陰性
527	美濃加茂市市之上町地内	H30.12.13	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H30.12.14	陰性
528	中津川市高山地内	H30.12.13	死亡	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.12.14	陰性
529	関市上大野地内	H30.12.14	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.12.15	陰性
530	関市上大野地内	H30.12.14	調査	雄	子	約 95 cm	約 20 kg	H30.12.15	陰性
531	関市上大野地内	H30.12.14	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.18	陰性
532	七宗町上麻生地内	H30.12.14	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.15	陰性
533	岐阜市村山地内	H30.12.14	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H30.12.15	陰性
534	坂祝町取組地内	H30.12.14	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H30.12.18	陽性
535	川辺町鹿塩地内	H30.12.14	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.15	陰性
536	美濃加茂市市之上町地内	H30.12.14	死亡	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.18	陰性
537	美濃市曾代地内	H30.12.14	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	H30.12.15	陰性
538	美濃市口野々地内	H30.12.15	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H30.12.18	陰性
539	本巣市文殊地内	H30.12.15	捕獲	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H30.12.18	陰性
540	本巣市文殊地内	H30.12.15	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.18	陰性
541	美濃加茂市市之上町地内	H30.12.15	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.18	陽性
542	七宗町神淵地内	H30.12.15	調査	雌	成体	約 95 cm	約 30 kg	H30.12.18	陰性
543	御嵩町中切地内	H30.12.16	調査	雄	子	約 100 cm	約 30 kg	H30.12.18	陰性
544	御嵩町中切地内	H30.12.16	調査	雌	子	約 95 cm	約 30 kg	H30.12.18	陰性
545	御嵩町中切地内	H30.12.16	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.18	陰性
546	多治見市大藪町地内	H30.12.17	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.12.18	陰性
547	可児市柿下地内	H30.12.17	死亡	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.19	陰性
548	美濃市口野々地内	H30.12.17	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.18	陰性
549	各務原市須衝町地内	H30.12.17	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.18	陽性
550	岐阜市秋沢地内	H30.12.17	調査	雄	成体	約 90 cm	約 30 kg	H30.12.18	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
551	関市上之保地内	H30.12.18	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H30.12.19	陰性
552	可児市西帷子地内	H30.12.18	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H30.12.19	陽性
553	可児市久々利地内	H30.12.18	捕獲	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.19	陰性
554	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H30.12.19	陰性
555	関市黒屋地内	H30.12.19	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.20	陰性
556	可児市臯ヶ丘地内	H30.12.19	捕獲	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H30.12.20	陰性
557	可児市久々利地内	H30.12.19	捕獲	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.20	陰性
558	御嵩町古屋敷地内	H30.12.19	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.12.20	陰性
559	美濃加茂市山之上町地内	H30.12.19	死亡	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H30.12.21	陰性
560	岐阜市安食地内	H30.12.20	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.12.21	陰性
561	美濃加茂市三和町地内	H30.12.20	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H30.12.21	陰性
562	本巣市文殊地内	H30.12.20	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.21	陰性
563	揖斐川町坂内地内	H30.12.21	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H30.12.22	陰性
564	美濃加茂市山之上町地内	H30.12.21	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.22	陰性
565	美濃加茂市山之上町地内	H30.12.21	調査	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.22	陰性
566	川辺町中川辺地内	H30.12.21	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H30.12.22	陰性
567	岐阜市椿洞地内	H30.12.21	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.22	陽性
568	岐阜市安食地内	H30.12.21	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	H30.12.22	陰性
569	岐阜市諏訪山地内	H30.12.22	調査	雌	成体	約 125 cm	約 60 kg	H30.12.25	陰性
570	八百津町福地地内	H30.12.23	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H30.12.25	陰性
571	八百津町福地地内	H30.12.23	調査	雄	子	約 95 cm	約 30 kg	H30.12.25	陰性
572	川辺町比久見地内	H30.12.23	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H30.12.25	陽性
573	御嵩町御嵩地内	H30.12.23	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.25	陰性
574	本巣市金原地内	H30.12.23	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.12.25	陰性
575	山県市大桑地内	H30.12.23	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.25	陰性
576	山県市大桑地内	H30.12.23	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H30.12.25	陰性
577	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.24	調査	雄	子	約 100 cm	約 25 kg	H30.12.26	陰性
578	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.24	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.12.26	陰性
579	多治見市大原町地内	H30.12.24	調査	雄	成体	約 135 cm	約 90 kg	H30.12.26	陰性
580	瑞浪市稲津町地内	H30.12.24	死亡	雄	成体	約 135 cm	約 90 kg	H30.12.26	陰性
581	山県市高富地内	H30.12.25	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.26	陽性
582	美濃加茂市山之上町地内	H30.12.25	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.26	陰性
583	美濃加茂市山之上町地内	H30.12.25	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.26	陰性
584	坂祝町勝山地内	H30.12.26	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.12.27	陽性
585	可児市西帷子地内	H30.12.26	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.27	陽性
586	川辺町鹿塩地内	H30.12.26	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	H30.12.27	陰性
587	川辺町鹿塩地内	H30.12.26	捕獲	雄	子	約 50 cm	約 10 kg	H30.12.27	陰性
588	山県市平井地内	H30.12.26	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H30.12.27	陰性
589	多治見市北小木町地内	H30.12.27	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.12.28	陰性
590	各務原市鷺沼大安寺町地内	H30.12.27	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.12.28	陽性
591	本巣市外山地内	H30.12.27	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H30.12.28	陰性
592	関市志津野地内	H30.12.27	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H30.12.28	陰性
593	八百津町上飯田地内	H30.12.28	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H30.12.29	陽性
594	可児市久々利地内	H30.12.28	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H30.12.29	陰性
595	岐阜市雛倉地内	H30.12.28	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H30.12.29	陰性
596	美濃加茂市蜂屋町地内	H30.12.28	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H30.12.29	陰性
597	美濃市松森地内	H30.12.28	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H30.12.29	陰性
598	富加町加治田地内	H30.12.29	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H30.12.30	陰性
599	岐阜市山県北野地内	H30.12.30	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.1.3	陰性
600	八百津町八百津地内	H30.12.31	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	H31.1.3	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
601	関市倉知地内	H30.12.31	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H31.1.3	陽性
602	各務原市各務地内	H30.12.31	死亡	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	H31.1.3	陽性
603	七宗町上麻生地内	H31.1.2	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.1.3	陰性
604	富加町加治田地内	H31.1.2	調査	雌	子	約 92 cm	約 20 kg	H31.1.3	陰性
605	可児市久々利地内	H31.1.2	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.1.3	陰性
606	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.1.2	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.1.3	陰性
607	岐阜市岩井地内	H31.1.2	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	H31.1.4	陰性
608	岐阜市雛倉地内	H31.1.2	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H31.1.4	陰性
609	岐阜市洞地内	H31.1.3	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.1.4	陰性
610	関市倉知地内	H31.1.3	調査	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	H31.1.4	陽性
611	八百津町八百津地内	H31.1.3	調査	雌	子	約 60 cm	約 20 kg	H31.1.4	陰性
612	関市志津野地内	H31.1.4	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.1.5	陰性
613	美濃加茂市三和町地内	H31.1.4	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.1.5	陰性
614	山県市梅原地内	H31.1.4	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.1.5	陰性
615	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.1.5	調査	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	H31.1.8	陰性
616	各務原市各務東町地内	H31.1.5	死亡	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	H31.1.8	陽性
617	美濃加茂市山之上町地内	H31.1.6	調査	雄	子	約 65 cm	約 20 kg	H31.1.8	陰性
618	土岐市下石町地内	H31.1.6	死亡	雌	成体	約 110 cm	約 40 kg	H31.1.8	陰性
619	美濃加茂市三和町地内	H31.1.7	調査	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.1.8	陰性
620	岐阜市佐野地内	H31.1.7	調査	雄	成体	約 105 cm	約 30 kg	H31.1.8	陰性
621	山県市長滝地内	H31.1.7	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.1.8	陰性
622	川辺町中川辺地内	H31.1.7	捕獲	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.1.8	陰性
623	本巣市木知原地内	H31.1.8	調査	雌	子	約 61 cm	約 10 kg	H31.1.9	陰性
624	八百津町福地地内	H31.1.8	調査	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.1.9	陰性
625	坂祝町黒岩地内	H31.1.8	調査	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.1.9	陽性
626	岐阜市雛倉地内	H31.1.8	調査	雄	成体	約 146 cm	約 115 kg	H31.1.9	陰性
627	岐阜市雛倉地内	H31.1.8	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.1.9	陰性
628	多治見市諏訪町地内	H31.1.8	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.1.9	陰性
629	岐阜市佐野地内	H31.1.8	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	H31.1.9	陰性
630	美濃市富野地内	H31.1.9	調査	雌	子	約 92 cm	約 20 kg	H31.1.10	陰性
631	山県市梅原地内	H31.1.9	調査	雌	子	約 62 cm	約 20 kg	H31.1.10	陰性
632	岐阜市山県北野地内	H31.1.10	調査	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	H31.1.11	陰性
633	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.1.10	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	H31.1.11	陰性
634	可児市久々利地内	H31.1.10	捕獲	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.1.11	陰性
635	可児市兼山地内	H31.1.10	調査	雌	子	約 71 cm	約 20 kg	H31.1.11	陰性
636	多治見市大畑町地内	H31.1.8	死亡	雄	成体	約 109 cm	約 45 kg	H31.1.11	陰性
637	岐阜市佐野地内	H31.1.11	調査	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	H31.1.14	陰性
638	山県市平井地内	H31.1.11	調査	雄	子	約 71 cm	約 20 kg	H31.1.14	陰性
639	岐阜市岩井地内	H31.1.10	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	H31.1.14	陰性
640	八百津町錦織地内	H31.1.11	調査	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	H31.1.14	陰性
641	山県市大桑地内	H31.1.11	調査	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	H31.1.14	陰性
642	可児市久々利地内	H31.1.12	捕獲	雄	成体	約 107 cm	約 50 kg	H31.1.14	陰性
643	山県市椎倉地内	H31.1.12	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.1.14	陰性
644	御嵩町美佐野地内	H31.1.12	死亡	雌	成体	約 114 cm	約 55 kg	H31.1.14	陰性
645	岐阜市出屋敷地内	H31.1.13	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	H31.1.14	陰性
646	山県市富永地内	H31.1.13	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.1.14	陰性
647	岐阜市秋沢地内	H31.1.13	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	H31.1.14	陰性
648	本巣市法林寺地内	H31.1.13	捕獲	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.1.14	陰性
649	八百津町伊岐津志地内	H31.1.14	調査	雄	子	約 59 cm	約 20 kg	H31.1.16	陰性
650	関市志津野地内	H31.1.14	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	H31.1.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
651	関市上之保地内	H31.1.14	調査	雄	成体	約 119 cm	約 60 kg	H31.1.16	陰性
652	山県市大桑地内	H31.1.14	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.1.16	陰性
653	川辺町比久見地内	H31.1.14	調査	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	H31.1.16	陽性
654	関市倉知南地内	H31.1.14	調査	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.1.16	陽性
655	岐阜市秋沢地内	H31.1.15	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.1.16	陽性
656	多治見市北小木町地内	H31.1.15	調査	雄	子	約 95 cm	約 20 kg	H31.1.18	陽性
657	山県市大桑地内	H31.1.15	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.1.16	陰性
658	美濃加茂市山之上町地内	H31.1.15	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.1.16	陰性
659	岐阜市山県北野地内	H31.1.15	調査	雌	成体	約 113 cm	約 50 kg	H31.1.17	陽性
660	八百津町八百津地内	H31.1.16	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.1.18	陰性
661	多治見市廿原町地内	H31.1.16	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.1.18	陰性
662	山県市大桑地内	H31.1.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.1.18	陰性
663	八百津町久田見地内	H31.1.15	死亡	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.1.18	陽性
664	関市のぞみヶ丘地内	H31.1.17	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.1.18	陰性
665	岐阜市安食地内	H31.1.17	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	H31.1.18	陰性
666	白川町河岐地内	H31.1.17	死亡	雌	子	約 65 cm	約 20 kg	H31.1.18	陰性
667	山県市葛原地内	H31.1.17	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.1.18	陰性
668	可児市西帷子地内	H31.1.17	死亡	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	H31.1.18	陽性
669	可児市久々利地内	H31.1.17	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.1.18	陰性
670	可児市今地内	H31.1.18	捕獲	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.1.21	陰性
671	各務原市須衛町地内	H31.1.18	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.1.22	陽性
672	御嵩町古屋敷地内	H31.1.19	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.1.24	陽性
673	可児市久々利地内	H31.1.19	捕獲	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.1.22	陰性
674	山県市梅原地内	H31.1.20	死亡	雌	子	約 66 cm	約 20 kg	H31.1.22	陽性
675	富加町大平賀地内	H31.1.21	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.1.22	陰性
676	川辺町下飯田地内	H31.1.21	捕獲	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.1.22	陽性
677	可児市西帷子地内	H31.1.21	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.1.22	陽性
678	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.1.22	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.1.23	陰性
679	岐阜市日野南地内	H31.1.21	死亡	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.1.23	陽性
680	岐阜市日野南地内	H31.1.22	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.1.23	陽性
681	八百津町久田見地内	H31.1.22	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.1.23	陰性
682	多治見市大原町地内	H31.1.22	調査	雌	成体	約 138 cm	約 100 kg	H31.1.23	陰性
683	美濃市大矢田地内	H31.1.22	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.1.23	陰性
684	岐阜市山県北野地内	H31.1.22	調査	雄	成体	約 114 cm	約 50 kg	H31.1.23	陰性
685	岐阜市村山地内	H31.1.22	調査	雌	成体	約 133 cm	約 80 kg	H31.1.23	陰性
686	山県市出戸地内	H31.1.23	調査	雌	子	約 73 cm	約 20 kg	H31.1.24	陰性
687	山県市大桑地内	H31.1.23	調査	雌	成体	約 103 cm	約 30 kg	H31.1.24	陰性
688	美濃加茂市三和町地内	H31.1.24	調査	雌	成体	約 114 cm	約 50 kg	H31.1.25	陰性
689	美濃加茂市山之上町地内	H31.1.24	調査	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.1.25	陽性
690	関市志津野地内	H31.1.24	調査	雌	子	約 76 cm	約 20 kg	H31.1.28	陰性
691	可児市大森地内	H31.1.24	死亡	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	H31.1.28	陰性
692	八百津町八百津地内	H31.1.25	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.1.28	陰性
693	岐阜市日野南地内	H31.1.25	捕獲	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.1.28	陽性
694	岐阜市新開洞地内	H31.1.25	捕獲	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.1.28	陽性
695	可児市西帷子地内	H31.1.25	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.1.28	陽性
696	八百津町八百津地内	H31.1.26	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	H31.1.29	陰性
697	岐阜市山県北野地内	H31.1.26	調査	雄	成体	約 150 cm	約 130 kg	H31.1.29	陰性
698	山県市大桑地内	H31.1.28	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.1.29	陰性
699	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.1.29	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.2.1	陽性
700	恵那市飯地町地内	H31.1.29	死亡	雌	成体	約 108 cm	約 40 kg	H31.2.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
701	各務原市須衛町地内	H31.1.29	死亡	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.2.1	陽性
702	川辺町上川辺地内	H31.1.30	捕獲	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.2.1	陰性
703	美濃加茂市山之上町地内	H31.1.30	死亡	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	H31.2.1	陽性
704	八百津町久田見地内	H31.1.31	調査	雄	成体	約 122 cm	約 60 kg	H31.2.1	陽性
705	山県市大桑地内	H31.1.31	調査	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.2.1	陰性
706	山県市大桑地内	H31.1.31	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.2.1	陰性
707	可児市柿下地内	H31.1.30	死亡	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.2.1	陰性
708	関市広見地内	H31.2.1	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.2.4	陰性
709	山県市大桑地内	H31.2.1	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.2.4	陰性
710	山県市椎倉地内	H31.2.1	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.2.4	陰性
711	山県市梅原地内	H31.2.2	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.5	陽性
712	関市迫間地内	H31.2.2	調査	雌	成体	約 106 cm	約 40 kg	H31.2.5	陽性
713	岐阜市山県北野地内	H31.2.3	調査	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	H31.2.5	陰性
714	山県市平井地内	H31.2.3	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	H31.2.5	陽性
715	関市迫間地内	H31.2.2	死亡	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	H31.2.5	陽性
716	関市迫間地内	H31.2.2	死亡	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.2.5	陽性
717	山県市大桑地内	H31.2.4	調査	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.2.5	陽性
718	山県市大桑地内	H31.2.4	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.2.5	陰性
719	岐阜市北一色地内	H31.2.4	捕獲	雌	成体	約 97 cm	約 30 kg	H31.2.5	陽性
720	川辺町下麻生地内	H31.2.4	調査	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.2.6	陽性
721	川辺町上川辺地内	H31.2.4	捕獲	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.2.6	陽性
722	川辺町上川辺地内	H31.2.4	捕獲	雌	子	約 87 cm	約 20 kg	H31.2.6	陽性
723	美濃加茂市山之上町地内	H31.2.4	調査	雄	子	約 74 cm	約 20 kg	H31.2.6	陽性
724	可児市皐ヶ丘地内	H31.2.5	捕獲	雄	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.2.6	陽性
725	山県市大桑地内	H31.2.5	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.2.6	陰性
726	山県市梅原地内	H31.2.5	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	H31.2.7	陽性
727	岐阜市洞地内	H31.2.6	調査	雄	成体	約 97 cm	約 30 kg	H31.2.7	陽性
728	可児市久々利地内	H31.2.6	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.2.7	陽性
729	関市倉知南地内	H31.2.6	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	H31.2.7	陽性
730	本巣市外山地内	H31.2.7	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.2.8	陰性
731	山県市青波地内	H31.2.7	調査	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.2.8	陽性
732	山県市富永地内	H31.2.7	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	H31.2.8	陽性
733	山県市大桑地内	H31.2.8	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.2.12	陽性
734	山県市青波地内	H31.2.8	調査	雄	子	約 89 cm	約 20 kg	H31.2.12	陰性
735	飛騨市神岡町地内	H31.2.8	死亡	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	H31.2.13	陰性
736	関市志津野地内	H31.2.8	調査	雄	成体	約 118 cm	約 60 kg	H31.2.12	陽性
737	岐阜市安食地内	H31.2.8	調査	雄	子	約 93 cm	約 20 kg	H31.2.12	陰性
738	関市神野地内	H31.2.8	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.2.12	陽性
739	山県市大桑地内	H31.2.8	調査	雄	子	約 92 cm	約 20 kg	H31.2.12	陰性
740	御嵩町前沢地内	H31.2.9	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.2.13	陰性
741	八百津町久田見地内	H31.2.10	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.2.13	陽性
742	岐阜市則松地内	H31.2.10	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.2.13	陰性
743	美濃市樋ヶ洞地内	H31.2.10	調査	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.2.13	陽性
744	八百津町久田見地内	H31.2.11	調査	雌	成体	約 127 cm	約 80 kg	H31.2.13	陽性
745	岐阜市日野南地内	H31.2.11	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.2.13	陽性
746	富加町加治田地内	H31.2.11	捕獲	雌	子	約 82 cm	約 20 kg	H31.2.13	陰性
747	川辺町鹿塩地内	H31.2.11	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.2.13	陽性
748	瑞浪市明世町地内	H31.2.9	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.14	陰性
749	瑞浪市日吉町地内	H31.2.10	死亡	雄	成体	約 143 cm	約 100 kg	H31.2.14	陽性
750	瑞浪市日吉町地内	H31.2.10	死亡	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.2.14	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
751	関市下有知地内	H31.2.12	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.2.13	陰性
752	八百津町八百津地内	H31.2.12	調査	雄	成体	約 135 cm	約 90 kg	H31.2.13	陽性
753	美濃加茂市伊深町地内	H31.2.12	調査	雄	成体	約 127 cm	約 80 kg	H31.2.13	陽性
754	美濃加茂市伊深町地内	H31.2.12	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.2.13	陽性
755	美濃市樋ヶ洞地内	H31.2.12	調査	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	H31.2.13	陰性
756	山県市松尾地内	H31.2.12	調査	雄	成体	約 128 cm	約 80 kg	H31.2.13	陽性
757	山県市東深瀬地内	H31.2.12	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.2.13	陰性
758	多治見市北小木町地内	H31.2.10	死亡	雌	成体	約 145 cm	約 115 kg	H31.2.15	陽性
759	美濃加茂市下米田町地内	H31.2.12	死亡	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.2.15	陽性
760	富加町大山地内	H31.2.13	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.14	陽性
761	岐阜市安食地内	H31.2.13	調査	雌	成体	約 140 cm	約 100 kg	H31.2.14	陰性
762	多治見市大原町地内	H31.2.13	死亡	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.2.15	陽性
763	恵那市串原地内	H31.2.12	死亡	雄	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.2.15	陰性
764	関市小迫間地内	H31.2.13	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.15	陽性
765	岐阜市佐野地内	H31.2.14	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.2.15	陽性
766	岐阜市日野南地内	H31.2.14	捕獲	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	H31.2.15	陽性
767	八百津町伊岐津志地内	H31.2.14	捕獲	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	H31.2.15	陽性
768	瑞浪市釜戸町地内	H31.2.14	死亡	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H31.2.19	陽性
769	下呂市火打地内	H31.2.14	死亡	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.2.19	陰性
770	可児市久々利柿下入会地内	H31.2.15	捕獲	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.2.18	陽性
771	美濃加茂市伊深町地内	H31.2.15	調査	雌	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.2.18	陰性
772	美濃加茂市伊深町地内	H31.2.15	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.2.18	陰性
773	瑞浪市釜戸町地内	H31.2.15	死亡	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.2.19	陽性
774	恵那市三郷町地内	H31.2.16	死亡	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	H31.2.19	陽性
775	八百津町八百津地内	H31.2.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.19	陽性
776	多治見市大原町地内	H31.2.16	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	H31.2.19	陽性
777	山県市柿野地内	H31.2.16	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.22	陰性
778	可児市久々利地内	H31.2.16	捕獲	雌	成体	約 125 cm	約 70 kg	H31.2.19	陽性
779	川辺町下麻生地内	H31.2.16	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.2.21	陽性
780	岐阜市洞地内	H31.2.16	死亡	不明	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.2.19	陽性
781	岐阜市佐野地内	H31.2.16	死亡	不明	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.2.19	陽性
782	本巣市根尾東板屋地内	H31.2.17	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.2.22	陽性
783	富加町大平賀地内	H31.2.17	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.2.19	陰性
784	富加町大平賀地内	H31.2.17	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.2.19	陰性
785	坂祝町黒岩地内	H31.2.17	調査	雌	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.2.19	陽性
786	岐阜市上土居地内	H31.2.17	死亡	雄	子	約 72 cm	約 20 kg	H31.2.19	陽性
787	山県市葛原地内	H31.2.17	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H31.2.19	陰性
788	関市神野地内	H31.2.18	死亡	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.2.19	陽性
789	山県市葛原地内	H31.2.18	調査	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.2.19	陰性
790	山県市相戸地内	H31.2.18	調査	雌	子	約 77 cm	約 20 kg	H31.2.19	陰性
791	山県市洞田地内	H31.2.18	調査	雌	子	約 93 cm	約 20 kg	H31.2.19	陽性
792	本巣市根尾門脇地内	H31.2.19	調査	雄	子	約 73 cm	約 20 kg	H31.2.22	陰性
793	関市広見北町地内	H31.2.19	調査	雄	成体	約 123 cm	約 70 kg	H31.2.22	陰性
794	八百津町八百津地内	H31.2.19	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.2.21	陽性
795	岐阜市山県岩地内	H31.2.19	調査	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	H31.2.21	陰性
796	岐阜市村山地内	H31.2.19	調査	雄	子	約 75 cm	約 20 kg	H31.2.21	陰性
797	山県市柿野地内	H31.2.19	調査	雄	成体	約 107 cm	約 40 kg	H31.2.22	陰性
798	山県市船越地内	H31.2.19	調査	雄	子	約 87 cm	約 20 kg	H31.2.22	陰性
799	山県市長滝地内	H31.2.19	調査	雌	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.2.22	陽性
800	多治見市大藪町地内	H31.2.19	死亡	雌	成体	約 107 cm	約 40 kg	H31.2.21	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
801	八百津町南戸地内	H31.2.19	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.21	陽性
802	美濃市口野々地内	H31.2.19	調査	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.2.22	陽性
803	川辺町下麻生地内	H31.2.20	捕獲	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.2.21	陽性
804	美濃加茂市山之上町地内	H31.2.20	調査	雌	成体	約 114 cm	約 50 kg	H31.2.22	陽性
805	山県市葛原地内	H31.2.20	調査	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.2.22	陰性
806	岐阜市雛倉地内	H31.2.20	調査	雌	成体	約 130 cm	約 80 kg	H31.2.22	陽性
807	美濃加茂市蜂屋町上蜂屋地内	H31.2.21	調査	雌	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.2.22	陽性
808	岐阜市洞地内	H31.2.21	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.2.22	陽性
809	岐阜市雛倉地内	H31.2.21	調査	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	H31.2.22	陽性
810	美濃加茂市山之上町地内	H31.2.21	調査	雄	成体	約 104 cm	約 40 kg	H31.2.22	陽性
811	山県市大桑地内	H31.2.21	調査	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.2.22	陽性
812	関市志津野地内	H31.2.22	調査	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.2.25	陰性
813	富加町大平賀地内	H31.2.22	捕獲	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.2.25	陰性
814	可児市二野地内	H31.2.22	調査	雌	成体	約 107 cm	約 45 kg	H31.2.25	陰性
815	八百津町錦織地内	H31.2.22	調査	雌	成体	約 118 cm	約 60 kg	H31.2.25	陰性
816	恵那市三郷町地内	H31.2.21	死亡	雌	子	約 96 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
817	川辺町鹿塩地内	H31.2.22	死亡	雄	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.2.25	陽性
818	岐阜市日野南地内	H31.2.23	捕獲	雌	子	約 95 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
819	関市下有知地内	H31.2.23	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.2.26	陰性
820	七宗町中麻生地内	H31.2.23	調査	雄	成体	約 116 cm	約 50 kg	H31.2.26	陽性
821	富加町大平賀地内	H31.2.23	調査	雌	子	約 67 cm	約 20 kg	H31.2.26	陰性
822	美濃加茂市蜂屋町地内	H31.2.23	調査	雌	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
823	山県市葛原地内	H31.2.23	調査	雄	成体	約 133 cm	約 80 kg	H31.2.26	陰性
824	山県市葛原地内	H31.2.23	調査	雌	子	約 96 cm	約 20 kg	H31.2.26	陰性
825	御嵩町中地内	H31.2.24	調査	雄	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
826	関市池尻地内	H31.2.24	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.2.26	陰性
827	八百津町錦織地内	H31.2.24	調査	雄	子	約 97 cm	約 20 kg	H31.2.26	陰性
828	関市下有知地内	H31.2.24	調査	雄	成体	約 125 cm	約 70 kg	H31.2.26	陽性
829	中津川市中津川地内	H31.2.22	死亡	雌	子	約 70 cm	約 20 kg	H31.2.26	陰性
830	美濃加茂市山之上町地内	H31.2.24	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
831	本巣市根尾大井地内	H31.2.24	調査	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H31.2.26	陰性
832	御嵩町美佐野地内	H31.2.22	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.2.26	陽性
833	関市小野地内	H31.2.24	死亡	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.26	陽性
834	可児市室原地内	H31.2.25	捕獲	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	H31.2.26	陽性
835	美濃市松森地内	H31.2.25	調査	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.2.26	陽性
836	可児市今地内	H31.2.25	死亡	雌	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.2.26	陽性
837	岐阜市洞地内	H31.2.25	調査	雄	子	約 85 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
838	岐阜市北唐戸洞地内	H31.2.25	捕獲	雌	子	約 86 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
839	川辺町上川辺地内	H31.2.25	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
840	関市志津野地内	H31.2.25	調査	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.2.26	陽性
841	川辺町下麻生地内	H31.2.26	調査	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.28	陽性
842	美濃市口野々地内	H31.2.27	調査	雌	成体	約 112 cm	約 45 kg	H31.2.28	陰性
843	富加町大平賀地内	H31.2.27	調査	雌	子	約 81 cm	約 20 kg	H31.2.28	陰性
844	富加町大平賀地内	H31.2.27	調査	雄	子	約 88 cm	約 20 kg	H31.2.28	陰性
845	美濃加茂市下米田町地内	H31.2.27	死亡	雌	子	約 83 cm	約 20 kg	H31.3.1	陽性
846	美濃市松森地内	H31.2.27	死亡	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.2.28	陽性
847	関市小野地内	H31.2.27	調査	雌	子	約 72 cm	約 20 kg	H31.2.28	陽性
848	瑞浪市大湫町地内	H31.2.27	死亡	雌	成体	約 123 cm	約 60 kg	H31.3.4	陽性
849	八百津町伊岐津志地内	H31.2.28	調査	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.3.1	陰性
850	八百津町錦織地内	H31.2.28	調査	雄	成体	約 142 cm	約 100 kg	H31.3.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
851	山県市柿野地内	H31.3.1	捕獲	雌	成体	約 124 cm	約 70 kg	H31.3.4	陰性
852	山県市葛原地内	H31.3.1	捕獲	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	H31.3.4	陰性
853	山県市葛原地内	H31.3.1	捕獲	雄	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.3.4	陽性
854	川辺町下麻生地内	H31.3.1	捕獲	雄	子	約 95 cm	約 20 kg	H31.3.4	陽性
855	川辺町鹿塩地内	H31.3.1	捕獲	雌	成体	約 109 cm	約 45 kg	H31.3.4	陽性
856	山県市岩佐地内	H31.3.2	捕獲	雌	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.3.5	陰性
857	山県市田栗地内	H31.3.2	捕獲	雌	子	約 78 cm	約 20 kg	H31.3.5	陰性
858	恵那市武並町地内	H31.3.2	死亡	雄	成体	約 120 cm	約 60 kg	H31.3.5	陽性
859	八百津町野上地内	H31.3.6	捕獲	雌	子	約 64 cm	約 20 kg	H31.3.7	陽性
860	可児市久々利地内	H31.3.6	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.3.7	陽性
861	山県市日永地内	H31.3.6	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	H31.3.7	陰性
862	山県市梅原地内	H31.3.6	捕獲	雄	成体	約 135 cm	約 90 kg	H31.3.7	陽性
863	山県市柿野地内	H31.3.6	捕獲	雄	成体	約 103 cm	約 30 kg	H31.3.7	陰性
864	郡上市和良町地内	H31.3.7	死亡	雄	成体	約 130 cm	約 80 kg	H31.3.8	陰性
865	多治見市大藪町地内	H31.3.8	死亡	雄	成体	約 107 cm	約 45 kg	H31.3.11	陽性
866	美濃加茂市山之上町地内	H31.3.9	死亡	雄	成体	約 125 cm	約 70 kg	H31.3.12	陽性
867	多治見市北丘町地内	H31.3.10	死亡	雄	成体	約 146 cm	約 115 kg	H31.3.12	陽性
868	山県市谷合地内	H31.3.11	捕獲	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.3.12	陰性
869	山県市笹賀地内	H31.3.11	捕獲	雌	子	約 80 cm	約 20 kg	H31.3.12	陰性
870	坂祝町取組地内	H31.3.12	捕獲	雄	成体	約 125 cm	約 70 kg	H31.3.13	陽性
871	八百津町久田見地内	H31.3.12	死亡	雄	成体	約 129 cm	約 80 kg	H31.3.13	陽性
872	可児市久々利地内	H31.3.12	死亡	雄	成体	約 112 cm	約 45 kg	H31.3.13	陽性
873	山県市梅原地内	H31.3.12	捕獲	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	H31.3.14	陰性
874	山県市日永地内	H31.3.12	捕獲	雄	成体	約 132 cm	約 80 kg	H31.3.14	陰性
875	可児市久々利地内	H31.3.14	捕獲	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.3.15	陽性
876	可児市大森地内	H31.3.14	死亡	雄	子	約 33 cm	約 5 kg	H31.3.18	陰性
877	恵那市長島町地内	H31.3.14	死亡	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	H31.3.19	陽性
878	恵那市岩村町地内	H31.3.16	死亡	雄	成体	約 145 cm	約 120 kg	H31.3.19	陽性
879	中津川市田瀬地内	H31.3.16	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.3.19	陰性
880	山県市葛原地内	H31.3.18	死亡	雄	成体	約 111 cm	約 45 kg	H31.3.19	陽性
881	瑞浪市山田町地内	H31.3.15	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.3.19	陽性
882	御嵩町次月地内	H31.3.16	死亡	雄	成体	約 137 cm	約 90 kg	H31.3.20	陰性
883	八百津町野上地内	H31.3.19	死亡	雌	成体	約 108 cm	約 45 kg	H31.3.20	陽性
884	美濃加茂市下米田町地内	H31.3.19	死亡	雌	成体	約 110 cm	約 45 kg	H31.3.22	陽性
885	恵那市山岡町地内	H31.3.19	死亡	雄	子	約 98 cm	約 30 kg	H31.3.22	陽性
886	多治見市富士見町地内	H31.3.19	死亡	雌	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.3.22	陽性
887	岐阜市長良古津地内	H31.3.20	死亡	雄	成体	約 126 cm	約 70 kg	H31.3.22	陽性
888	瑞浪市明世町地内	H31.3.22	死亡	雄	子	約 94 cm	約 25 kg	H31.3.25	陽性
889	瑞浪市日吉町地内	H31.3.22	死亡	雌	子	約 99 cm	約 30 kg	H31.3.25	陽性
890	恵那市三郷町地内	H31.3.22	死亡	雌	成体	約 101 cm	約 30 kg	H31.3.25	陽性
891	白川町切井地内	H31.3.22	死亡	雄	成体	約 140 cm	約 100 kg	H31.3.26	陽性
892	恵那市長島町地内	H31.3.22	死亡	雄	子	約 90 cm	約 20 kg	H31.3.26	陽性
893	郡上市美並町地内	H31.3.25	死亡	雄	子	約 60 cm	約 20 kg	H31.3.26	陰性
894	可児市柿下地内	H31.3.24	死亡	雄	成体	約 100 cm	約 30 kg	H31.3.26	陽性
895	可児市柿下地内	H31.3.25	捕獲	雄	成体	約 138 cm	約 100 kg	H31.3.26	陽性
896	恵那市明智町大泉地内	H31.3.25	死亡	雄	成体	約 135 cm	約 90 kg	H31.3.26	陽性
897	恵那市明智町吉良見地内	H31.3.25	死亡	雄	成体	約 131 cm	約 80 kg	H31.3.26	陽性
898	七宗町神淵地内	H31.3.26	死亡	雄	成体	約 115 cm	約 50 kg	H31.3.27	陽性
899	土岐市妻木町地内	H31.3.25	死亡	雌	成体	約 134 cm	約 90 kg	H31.3.27	陰性
900	可児市大森地内	H31.3.27	捕獲	雄	成体	約 126 cm	約 70 kg	H31.3.28	陽性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

平成30年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
901	郡上市和良町地内	H31.3.27	死亡	雄	成体	約 105 cm	約 40 kg	H31.3.28	陽性