

# ぎふ感染症かわら版

令和7年3月6日 岐阜県感染症情報センター（岐阜県保健環境研究所）



## 岐阜県内に「ノロウイルス食中毒警報」が発表されました！

（発表期間：3月6日～12日の1週間）

2月下旬から、岐阜県内でノロウイルスによる食中毒事例が相次いで起きています。  
ノロウイルスは感染した人の便やおう吐物から二次感染を引き起こします。さらなる蔓延を防止するため、予防方法を確認しておきましょう。

令和7年 岐阜県のノロウイルスによる食中毒発生状況

（令和7年3月5日午後3時時点）

No	発生月日	発生場所	摂食者数	患者数	死者	原因食品	原因施設
1	1月21日	岐阜市ほか	45	21	0	提供された食事	飲食店（岐阜市）
2	1月23日	下呂市ほか	44	23	0	提供された食事	旅館（白川村）
3	2月27日	各務原市ほか	915	261	0	調査中	飲食店（岐南町）
4	3月1日	大垣市	35	17	0	調査中	給食施設（大垣市）

### どんな病気？

潜伏期間は1～2日で、**吐き気、おう吐、下痢、腹痛**などの症状があらわれます。

通常は1～2日で症状は治まりますが、小さいお子さんや高齢の方は、おう吐・下痢による脱水や、おう吐物による窒息に注意が必要です。



### どうやってうつるの？予防方法は？

感染した人の便やおう吐物に含まれるウイルスが、次のような経路で他の人に感染します。

- 患者の便などに含まれるウイルスが、人の手などを介して口に入り感染する
- 感染した人が十分な手洗いをせずに調理をして食品を汚染し、その食品を加熱せずに食べて感染する
- 便やおう吐物が適切に処理されず、床などに残ったウイルスが乾燥して空気中に漂い、それを口や鼻から吸い込んで感染する



また、カキなどの二枚貝にはノロウイルスが潜んでいることがあります。  
十分に加熱しないで食べると感染することがあります。



### こまめな手洗い※注

特に、トイレの後、調理や食事の前などは石けんと流水で入念に手を洗いましょう。



おう吐物の処理は適切に（次ページを参考にしてください）

※注：ノロウイルスは消毒用エタノールによる消毒効果は低いとされています。そのため消毒用エタノールは、すぐに石けんによる手洗いが出来ないような場合、あくまで一般的な感染症対策の観点から手洗いの補助として用いてください。



保育所や幼稚園、高齢者施設など、希望される施設に対して「ぎふ感染症かわら版」のメール配信もおこなっています。  
くわしくは岐阜県感染症情報センターホームページをご覧ください。

# おう吐物の処理例

## 準備するもの

- 0.1%次亜塩素酸ナトリウム液
- 使い捨て手袋（2組）、マスク、エプロン、シューズカバー
- ペーパータオル
- ごみ袋（2枚）とバケツ
- 水ぶき用のバケツ、ぞうきん

ごみ袋は、バケツに2枚重ねて用意しておくと使いやすいです



## おう吐物の処理手順

- ① 使い捨て手袋（二重）、マスク、エプロン、シューズカバーを着け、部屋の換気をする
- ② おう吐物をペーパータオルで広めに覆い、外側から内側へと静かにふき取る
- ③ ペーパータオルと外側の手袋をごみ袋（重ねた内側の袋）に入れ、0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を入れて浸し、袋の口を閉める
- ④ ふき取った場所に、新たにペーパータオルをかぶせ  
0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を浸し、10分以上そのままにして消毒する
- ⑤ ペーパータオルを回収し、ごみ袋（重ねた外側の袋）に入れる
- ⑥ エプロン、内側の手袋、マスク、シューズカバーを  
ごみ袋（外側の袋）に入れ、袋の口を閉めてそのまま捨てる
- ⑦ しっかり手洗いをする




## 次亜塩素酸ナトリウム液の作り方


家庭用の塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム濃度5～6%）を水で薄めて作ります。



**0.1%液**：おう吐物や便で汚れた場所に



**0.02%液**：床やドアノブなどの日常清掃に



※薄めた漂白剤は、時間とともに効果がなくなりますので、作り置きせずにその都度作りましょう。