県民健康実態調査

報告書

（令和3年度版）

岐阜県保健環境研究所
岐阜県保健医療課

県民健康実態調査報告書（令和3年度）
目次

Ⅰ　報告書について・・ **1**
１．目的と概要・・ 1
２．データの解説・・・ 2
３．令和元年度から令和３年度までの結果（まとめ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

Ⅱ　結果・・・ **17**
１．結果の概要（令和元年度－令和３年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
（１）分析対象者について・・・ 19
（２）メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
（３）肥満該当者・・ 25
（４）高血圧症有病者（予備群含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
（５）糖尿病有病者（予備群含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
（６）脂質異常症有病者・・・ 34
（７）習慣的喫煙者・・ 37
２．岐阜県全体・・ 40
（１）健診受診者数及び検査項目別平均値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
（２）検査項目別該当者割合・・・ 41
３．市町村別集計・・ 55
（１）市町村別検査項目別マップ及び数値表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
（２）市町村別　標準化該当比の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103
４．医療保険者別集計・・・ 145
（１）国民健康保険・・ 145
ア　健診受診者数及び検査項目別平均値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145
イ　検査項目別該当者割合・・ 146
（２）協会けんぽ（全国健康保険協会岐阜支部）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
ア　健診受診者数及び検査項目別平均値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
イ　検査項目別該当者割合・・ 159
（３）健保組合・・ 171
ア　健診受診者数及び検査項目別平均値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 171
イ　検査項目別該当者割合・・ 172
（４）共済組合・・ 184
ア　健診受診者数及び検査項目別平均値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
イ　検査項目別該当者割合・・ 185

Ⅲ 詳細情報 ･･･ **197**
１．岐阜県全体･･･ 198
（１）特定健診の状況･･･ 198
（２）生活習慣病重症化予防のためのレセプトと特定健診との突合（市町村別）･･ 207

Ⅰ　報告書について

1　目的と概要

（1）目的

岐阜県民の健康状態や生活習慣病の実態を把握し、地域及び医療保険者ごとの健康課題を明らかにすることで、効果的な健康づくり施策の立案・実施に役立てる目的で「県民健康実態調査事業」を実施しています。

（2）背景と現状

平成20年度から生活習慣病発症の前段階とされるメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査（これ以降、特定健診と略します）及び特定保健指導が、医療保険者を実施主体として開始されました。この特定健診で得られるデータを分析することは、県民の健康づくりや生活習慣病予防対策を講ずる上で非常に重要と考えられます。そこで、岐阜県では、平成28年度から県内の医療保険者の協力を得て、特定健診データを集約・分析する「県民健康実態調査事業」を開始しました。

得られたデータを基に市町村単位、医療保険者ごとの健康課題について分析を行い、その結果を報告書として県民の皆様に提出してきました。令和2年度までの各年度において約30万件のデータを解析対象としてきましたが、実際には特定健診全対象者の約35%程度を解析していたこととなります。

（3）課題

本事業を実施していく過程で大きく2つの課題が明らかとなりました。

ア　データ収集率の限界

前述したとおり協力いただける県内の医療保険者のデータを集約・分析し、令和2年度までの各年度において約30万件のデータを解析してきました。これは特定健診全対象者の約35%程度であり、解析結果の精度をさらに高めるためにはデータ収集率をより向上させる必要があります。

岐阜県内にはこれまで解析対象とした医療保険者以外にも、企業で構成される健康保険組合が12組合存在します。また、愛知県等の隣県で就業する県民の健診データは他県の医療保険者が管理していること等、網羅的なデータ収集が困難です。医療保険者ごとに個別に協力を得る従来の方法では、かなりの時間と労力が必要と考えられます。

イ　医療情報と突合した解析の実施

これまで特定健診データをもとに各地域での生活習慣病該当者等の分布について解析をしてきましたが、各地域においてどの程度の人が生活習慣病関連の疾病で医

療機関を受診しているのかについては不明でした。また、生活習慣病あるいはその予備群に該当すると判明した方々が、どの程度医療機関を受診し、その後の健診データにどのような変化がみられるかについても不明でした。

これらを明らかにするには、特定健診データに紐づけされたレセプト情報を収集し、特定健診データと突き合せた解析を行う必要があります。レセプトとは、正式名称を「診療（調剤）報酬明細書」と言い、その中には傷病名、診療行為などの診療内容に関する情報が含まれています。このレセプト情報を特定健診データと突き合わせることで、各地域における生活習慣病の状況が、より具体的に把握できると考えられます。

（４）対策と今後の方針

以上の課題に対して、厚生労働省が管理する「匿名医療保険等関連情報データベース（これ以降、NDB と略します)」を活用することが最善であると考え、本報告書からは NDB を活用した分析を実施しています。

NDB には、特定健診情報とレセプト情報が匿名化された形で一元的に収集・管理されています。岐阜県は NDB の利用申請を行い、審査を経て承認を取得しました。これにより、県民のほぼ全ての特定健診データと、それに紐づく医療情報を用いた高度な分析が可能となりました。

本報告書は、NDB データを利用して得た解析結果をまとめた最初のものとなります。これまでに比べて、収集・利用可能なデータの件数が飛躍的に増加し、分析結果の精度も向上したことで、県民の健康・生活習慣病の傾向や医療の利用状況をより詳細に把握できるようになりました。今後は、生活習慣病や医療利用の傾向などをより詳しく分析し、予防施策や健康づくりの効果を見える化していく等内容の充実を図り、岐阜県や各市町村がより効果的な健康施策を立案できるよう支援するとともに、県民の皆様が自身の健康管理に役立てられる情報提供を進めてまいります。

２　データの解説

（１）本報告書の結果を活用する場合の注意点について

１　本報告書は、厚生労働省の管理する NDB からデータを得て、その分析結果をまとめたものです。分析に用いた特定健診に関するデータ数は、岐阜県の受診対象者の約５割をカバーしていると推定されます。したがって、本報告書の結果は、必ずしも岐阜県あるいは市町村など、分析対象集団の全体像を反映しているものではなく、該当年度に特定健診を受診された方の結果に基づく集計であることをご了解ください。

２　本報告書での医療保険者の区分は、医療保険制度の種類を表す「法別番号」により、国民健康保険、全国健康保険協会（協会けんぽ)、健康保険組合（健保組合)、

共済組合の４つとしています。本報告書の結果を活用する際には、医療保険者ごとに、受診者数、年齢構成、受診率が異なること、個別健診や集団健診、実施時期、健診受診時間等の健診体制が異なることを念頭において使用してください。また、これらの違いにより、本報告書の結果のみから、地域住民全体の健康状態を推定することはできないことをご了解ください。

3　本報告書では、健診項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない方のデータも分析の対象としています。そのため各分析項目で、分析対象者の総数が異なることがあります。

4　平成 20 年 11 月 18 日厚生労働省令第 159 号により、平成 21 年４月からは実施年度中に 75 歳になる 75 歳未満の者も特定健診の対象に含まれることになりましたが、統計処理を行う上で、年度内年齢が 40 歳以上 75 歳未満の者を分析対象としています。

5　本報告書は、個人情報を削除したデータによる分析のため、総合的な評価を行うことはできますが、「個人」レベルでの評価を行うことはできません。そのため「個人」の評価や「特定保健指導参加者」の評価については、医療保険者が主となり、検査データと特定保健指導のデータを使いながら取り組んでください。

6　本報告書に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が総数と合わないことがあります。

7　本報告書では血糖検査について、空腹時血糖と HbA1c の両方を測定している場合、「標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6 年度版）」（令和 6 年 4 月 厚生労働省健康・生活衛生局）に従い、空腹時血糖の結果を優先して該当者の判定に用いています。

8　平成 25 年度から、HbA1c の測定値が従来用いられてきた HbA1c(JDS)から HbA1c(NGSP)に変更されました。このため、本報告書で用いた HbA1c 値は全て HbA1c(NGSP)です。

9　本報告書では、結果の公表によって特定の個人が第三者に識別されないよう、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第2版」（令和5年10月　厚生労働省保険局）の最小集計単位の原則に従い、該当者数などの数値が10未満の場合には、マスク処理を行っています（該当数値を推計可能な他の数値も含めてマスク処理します。ただし、該当数値が0の場合には原則表示します）。また、市町村ごとでの集計を行う場合には、以下のとおりとします。

ア）人口2,000人未満の白川村については、最小集計単位の原則上は該当者数が表示できませんが、政策的な有益性を理由に、厚生労働省から特別に承諾を得られたことから、人口2,000人以上25,000人未満の市町村と同じ取扱いとします。

イ）人口2,000人以上25,000人未満の市町村については、該当者数などの数値が20未満の場合には、マスク処理を行います（該当数値が0の場合は原則表示します）。

ウ）人口25,000人以上の市町村では、該当者数などの数値が10未満の場合には、マスク処理を行います（該当数値が０の場合は原則表示します）。

（２）検査項目別平均値及び標準偏差の作成方法について

本報告書では、県全体及び各医療保険者について検査項目ごとの平均値と標準偏差を記述しています。その算出方法については以下のとおりとなっています。

１　資料

分析には、該当年度に特定健診を受診した、岐阜県内に住所情報を有する、40 歳以上 75 歳未満のデータを用いました。なお、項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない方のデータも分析対象としました。そのため、項目ごとに対象人数が異なります。

２　検査項目

分析対象とした項目は、身長、体重、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール、空腹時血糖、HbA1c としました。

なお BMI については、身長及び体重の両データを基に再計算した値を分析対象としました。

（３）有病者等該当割合の作成方法について

本報告書では、検査データを基に各種生活習慣病について有病者（予備群を含む場合もあります）に該当する者と該当しない者とに区分し、その集計結果を記述しています。その判定方法等については以下のとおりとなっています。

１　資料

該当年度に特定健診を受診した、岐阜県内に住所情報を有する、40歳以上75歳未満のデータを用いました。なお、項目ごとに分析を行っているため、全項目を受診していない方のデータも分析対象としました。

ただし、高血圧症、糖尿病、脂質異常症の判定においては、服薬の有無が未入力の方や、検査項目の不足等の理由により判定が不可能な方は、分析対象から除外しました。また、使用するデータの範囲は、「標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）」（令和6年4月 厚生労働省健康・生活衛生局）のデータ範囲のチェックを使用し、その範囲外のデータは除外しました（下図「分析に使用したデータの範囲」参照）。

２　検査項目と判定区分の設定

分析対象とした項目は、身長、体重、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール、空腹時血糖、HbA1c 及び標準的な質問票としました。なお BMI については、身長及び体重の両データを基に再計算した値を分析対象としました。

判定区分は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン（確定版）」（平成 19 年 4 月　厚生労働省健康局）の参酌標準を使用しました（下図「生活習慣病該当者の判定区分とその定義」参照）。

なお糖尿病の年齢別該当者割合（県全体）については、「標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6 年度版）」（令和 6 年 4 月 厚生労働省健康・生活衛生局）を参考に、保健指導レベルを超える区分についても調査を行いました。

分析に使用したデータの範囲

項目	単位	最小値　ー　最大値
身長	cm	100 – 250
体重	kg	20 – 250
BMI	kg/m^2	10 – 99.9
腹囲	cm	40 – 250
収縮期血圧	mmHg	60 – 300
拡張期血圧	mmHg	30 – 150
中性脂肪	mg/dL	10 – 2000
HDL コレステロール	mg/dL	10 – 500
LDL コレステロール	mg/dL	20 – 1000
空腹時血糖	mg/dL	20 – 600
HbA1c(NGSP)	%	3 – 20

生活習慣病該当者の判定区分とその定義

判定区分	区分の定義
メタボリックシンドローム該当者	腹囲が男性は85cm以上、女性は90cm以上であり、かつ下記の項目に２つ以上該当する者 ① 中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、もしくはコレステロールを下げる薬を服用 ② 収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用 ③ 空腹時血糖110mg/dl以上、またはHbA1c 6.0%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用
メタボリックシンドローム予備群該当者	腹囲が男性は85cm以上、女性は90cm以上であり、かつ下記の項目のうち１つに該当する者 ① 中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、もしくはコレステロールを下げる薬を服用 ② 収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用 ③ 空腹時血糖110mg/dl以上、またはHbA1c 6.0%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用
肥満該当者	次の３項目のいずれかに該当する者 ① BMIが25以上かつ腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上 ② BMIのみ25以上 ③ 腹囲のみ男性85cm以上、女性90cm以上
高血圧症有病者	収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の者、もしくは血圧を下げる薬を服用する者
高血圧症予備群該当者	① 収縮期血圧が130mmHg以上140mmHg未満、かつ拡張期血圧が90mmHg未満である者 ② 収縮期血圧が140mmHg未満、かつ拡張期血圧が85mmHg以上90mmHg未満である者 ただし、血圧を下げる薬を服用する者を除く

判定区分	区分の定義
糖尿病有病者	空腹時血糖126mg/dl以上、またはHbA1c 6.5%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者
糖尿病予備群該当者	空腹時血糖110mg/dl以上126mg/dl未満、またはHbA1c 6.0%以上6.5未満の者 ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く
(※)糖尿病について保健指導判定値を超えるレベルと判断される者	空腹時血糖100mg/dl以上126mg/dl未満、またはHbA1c 5.6%以上6.5未満の者 ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く
脂質異常症有病者	中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、またはLDLコレステロール140mg/dl以上、もしくはコレステロールを下げる薬を服用する者
習慣的に喫煙している者	「合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている者」であり、「最近1ヶ月間も吸っている者」

（4）標準化該当比について

本報告書では、各市町村における生活習慣病該当者の分布状況を調査するため、市町村毎に各生活習慣病についての標準化該当比を算出し、その集計結果をグラフ及びマップ等で記述しています。その算出方法等については以下のとおりとなっています。

ア　資料

岐阜県全体のデータとして、該当年度に特定健診を受診した、岐阜県内に住所情報を有する、40歳以上75歳未満のデータを用いました。

イ　検査項目と判定区分の設定

分析対象とした項目は、メタボリックシンドローム、肥満、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、習慣的喫煙者としました。

判定区分は、「（3）有病者等該当割合の作成方法について」の「イ 検査項目と判定区分の設定」と同様としました。

ウ　標準化該当比の計算

生活習慣病の発症率は、年齢によって異なることが考えられます。例えば 40 歳代の多い地域と 70 歳代の多い地域とでは、その年齢構成の違いが要因となって発症率に差が生じることが考えられます。そのため各市町村によって年齢構成が異なることを補正する目的で、標準化死亡比（SMR）の計算方法に準じ、各検査項目について有病者（予備群を含む場合もある）に該当する者の「標準化該当比」（岐阜県全体の結果（基準）と当該市町村の結果を比較した値）を算出しました。

その算出のための式は、以下の通りです。

$$\theta\,\mathrm{i} = \frac{\mathrm{Di}}{\mathrm{Ei}} \times 100$$

θi：i 地域の標準化該当比　Di：i 地域の有病者判定該当者数　Ei：i 地域の期待該当者数

$$Ei = \sum_{k=1}^{K} (n_{ik} \times P_k)$$

n_{ik}：i 地域の性別 k 年齢階級の受診者(判定可能)数

P_k：岐阜県全体の性別 k 年齢階級別該当者の出現率

※上記の算出式について

以下のような受診者データを有する架空の自治体（X 市）を例とした場合。

	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70-74 歳
X 市の受診者数（検査を受けた人数）	A（人）	B（人）	C（人）	D（人）	E（人）	F（人）	G（人）
県全体の受診者数（検査を受けた人数）	H（人）	I（人）	J（人）	K（人）	L（人）	M（人）	N（人）
県全体の有病者判定該当者数（当該検査の結果から有病者の区分に該当した人数）	O（人）	P（人）	Q（人）	R（人）	S（人）	T（人）	U（人）

このＸ市の期待該当者数を上記の算定式を用いて算出すると、

$$A\times\frac{O}{H}+B\times\frac{P}{I}+C\times\frac{Q}{J}+D\times\frac{R}{K}+E\times\frac{S}{L}+F\times\frac{T}{M}+G\times\frac{U}{N}$$ （人）となります。

そしてＸ市の有病者判定該当者数を仮にＹ（人）とすると、Ｘ市の標準化該当比は、

$$\frac{Y}{A\times\frac{O}{H}+B\times\frac{P}{I}+C\times\frac{Q}{J}+D\times\frac{R}{K}+E\times\frac{S}{L}+F\times\frac{T}{M}+G\times\frac{U}{N}}\times 100$$ となります。

エ　区間推定

各市町村間の年齢構成の違いを補正する目的で「標準化該当比」を算出しましたが、それでもなお各市町村間での人口の違いによる影響を受けることが考えられます。上記の算定式で得られる期待該当者数は、人口の少ない市町村では必然的に小さくなります。「標準化該当比」の算出においてはこの期待該当者数は分母となるため、分母の小さくなる人口の少ない市町村の方が、分母の大きくなる人口の多い市町村よりも、有病者判定該当者数の増減の影響を受けやすくなり、測定誤差を生じる可能性は高くなります。そのため区間推定により、岐阜県内全住民のデータを調査した場合に得ることのできる標準化該当比（母集団の標準化該当比）を推定し、県全体の基準との比較を行いました。

区間推定については、国立保健医療科学院の横山徹爾先生が公開している「標準化該当比計算シート」を参考に、95%上限値及び 95%下限値を算出し、その間を 95%の確からしさで「母集団の標準化該当比」を含んでいると考えられる範囲（95%信頼区間）としました。

オ　データの読み方と注意点について

標準化該当比は、岐阜県全体を 100（基準）としているため、当該市町村の標準化該当比が 100 より大きい場合は、当該市町村での該当者の数が県全体（基準）よりも多く、100 より小さい場合は、当該市町村での該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを意味しています。

95%信頼区間は、統計上の手法を用いて 95%の確からしさで「母集団の標準化該

当比（この場合は、岐阜県内全住民のデータを調査（全数調査）した結果得られる標準化該当比を意味する）」を含むと考えられる範囲を算出したものであり、95%上限値及び95%下限値とは、その上限と下限をそれぞれ表しています。例えば、ある市町村の標準化該当比の95%下限値が100以上の場合、全数調査した時の当該市町村における該当者の数は、県全体（基準）よりも少なくなる可能性が極めて低いことになります。このことは逆説的に、全数調査時における当該市町村の該当者の数が県全体（基準）よりも多いという結果について、偶然では無く可能性として十分起こり得る（有意である）ことを示します。

それとは逆に95%上限値が100以下の場合は、全数調査時における当該市町村の該当者の数が県全体（基準）よりも少ないという結果について、偶然では無く可能性として十分起こり得る（有意である）ことを示します。

一方、95%上限値が100以上でかつ95%下限値が100以下である市町村の場合、全数調査時における当該市町村の該当者の数が、県全体（基準）より多いことも少ないことも可能性として両方起こり得る（有意差はみられない）ので、どちらとも言えないということになります。

※95%上限値が100以上でかつ95%下限値が100以下である市町村の区分について

この場合上記のとおり、全数調査時における該当者の数が県全体（基準）よりも多いか少ないかを明確に論じることはできません。ただし県民の方々への情報提供ということを考慮し、この範囲に区分される市町村を、今回のデータから算出した標準化該当比（標本の標準化該当比）が100以上であるか否かで便宜的にあえて2つに分けております。そのため本報告書データの読み方については、下記「▽と▲の区分標記に関する注意点」をご参照ください。

本報告書では、上記によって求めた数値を下記のとおり4段階に区分しました。

「標準化該当比<100」かつ「95%信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない（▽▽）

「標準化該当比<100」かつ「95%信頼区間の上限≧100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある（▽）※

「標準化該当比>100」かつ「95%信頼区間の下限≦100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある（▲）※

「標準化該当比>100」かつ「95%信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い（▲▲）

カ　マップ化及びグラフ化について

県内地域の標準化該当比の傾向を見るために、メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）、肥満該当者、高血圧症有病者（予備群含む）、糖尿病有病者（予備群含む）、脂質異常症有病者、習慣的喫煙者の項目について、マップ化とグラフ化を行いました。なおマップ化の色分けは次の通りとしました。

凡例	色	区分
▽▽		県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽※		今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲※		今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲		県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

※▽と▲の区分標記に関する注意点

今回の計算で得られた標準化該当比では、県全体（基準）よりも低い結果、あるいは県全体（基準）よりも高い結果となりました。しかし、岐阜県内の全住民データを調査した場合に得ることのできる標準化該当比（母集団の標準化該当比）を推定したところ、その値は県全体（基準）よりも高くなること、あるいは低くなること、両方の可能性があります。そのため、再度データ収集を行って別の標本（例えばデータ数や保険者の数が異なるなど）で計算すると、標準化該当比は逆の結果、すなわち県全体（基準）よりも高い結果、岐阜県全体よりも低い結果にそれぞれなる可能性もまたあります。そのため今回の結果が偶然である可能性が高いということになり、統計学的にはこれらの区分は「県全体（基準）よりも高いか低いかはどちらとも言えない」という解釈になることにご留意ください。

キ　標準化該当比の経年変化について

各市町村における生活習慣病該当者の年度毎の変化を調査するため、標準化該当比の経年変化をグラフ化しました。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率（県全体の有病者判定該当者数(当該検査の結果から有病者の区分に該当した人数)を県全体の受診者数（検査を受けた人数）で除したもの）が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられます。そのため基準は該当年度ではなく、令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率に固定し、これに各年度各市町村の年齢階級毎の受診者数を掛けて期待該当者数を算出のうえ、標準化該当比を算出（上記（４）ウの算出式の場合、ＨからＵは令和元年度データを用い、その他ＡからＧ及びＹは各年度のデータを用いる）しました。

３　令和元年度から令和３年度までの結果（まとめ）

今回の調査では、これまでに解析した令和元年度及び令和 2 年度のデータに、令和 3 年度のデータを加えた、3 年度分の解析を新たに行いました。対象としたデータ数はそれぞれ令和元年度が約 48 万 2 千人分、令和 2 年度が 47 万 6 千人分、令和 3 年度が約 49 万 7 千人分となり、令和元年度及び令和 2 年度ともに、以前の報告書で対象としたデータ数からは、約 15 万人分の増となっています。また、これらのデータ数は、岐阜県の特定健診受診者総数（厚生労働省の公表）の約 99%に相当します。

（１）岐阜県の概要

・特定健診の受診率(p.21)については、男性よりも女性の方が低い傾向がみられます。また、男女とも 60 代以降で受診率が低下する傾向がみられます。厚生労働省が公表する岐阜県の特定健診受診率は約 50%であり、受診率を向上させるためには、これら受診率が低い層への働きかけが重要と考えられます。

・メタボリックシンドロームに該当する者の割合は、女性よりも男性の方が高い結果となっています（今回の調査結果では、男性全体の約 22%、女性全体の約 7%が該当し、以前の報告書での結果とほぼ同等の数値となっています)。特に男性の場合、予備群を含めると、40 代前半で既にその約 28%（およそ 4 人に 1 人の割合）が該当し、加齢とともにその割合が増加する傾向がみられます。同様に、肥満に該当する者の割合は、女性よりも男性の方が高い結果となっています（今回の調査結果では、男性全体の約 50%、女性全体の約 22%が該当し、以前の報告書での結果とほぼ同等の数値となっています)。加齢に伴う増加は顕著にみられませんが、男性の場合 40 代前半ですでに約 43%が肥満に該当し、高齢期になるまでその高い割合が続く傾向がみられました。そのためメタボリックシンドローム及び肥満に関する予防対策は比較的若い年代のうちから講じる必要があると考えられます。

・高血圧症有病者に該当する者は、女性よりも男性がやや高い結果となっています（今回の調査結果では、男性全体の約 41%、女性全体の約 30%が該当し、以前の報告書での結果とほぼ同等の数値となっています)。男女ともに加齢によって該当者割合が増加する傾向が顕著にみられ、予備群を含めると、男性の場合は 55 歳以上、女性の場合は 65 歳以上の年代で、その 60%以上が高血圧症有病者に該当します。さらに、男性の場合は 65 歳以上、女性の場合は 70 歳以上の年代で、その 70%以上が高血圧症有病者に該当します。

・糖尿病有病者に該当する割合は、女性よりも男性の方がやや高い結果となり（今回の調査結果では、男性全体の約 11%、女性全体の約 5%が該当し、以前の報告書での結果とほぼ同等の数値となっています)、加齢に伴う該当割合の増加傾向についても、女性よりも男性の方がやや顕著にみられます。

また、保健指導判定値を超えるレベルと判断される者の割合も算出したところ、その割合は高く、40 代前半で男性の場合約 19%、女性では約 10%が該当します（以前の

報告書での結果とほぼ同等の数値)。その割合は、男女とも加齢によって顕著に増加し、男性で 50 代後半、女性で 70 代前半に 30%以上に達します。

・脂質異常症有病者に該当する者の割合は、男性全体の約 56%、女性全体の約 49%と男女とも高い数値となっています（以前の報告書での結果とほぼ同等の数値)。男性は 40 代前半からすでに 50%近くに達し、高齢期までその高い割合は続く傾向がみられます。女性の場合 40 代前半では全体の 20%程度の該当割合ですが、50 代後半ではその割合が 55%程度まで増加しています。特に女性の高齢者の該当率は高く、70 代前半の約 70%が該当します。

・習慣的喫煙者については、男性全体の約 32%が該当し、女性全体の約 7.5%を大きく上回っています（以前の報告書での結果とほぼ同等の数値)。男性の場合、加齢に伴って該当割合が減少する傾向がみられますが、65 歳以上の年代においても、その 20%以上に喫煙習慣が有ります。

（２）市町村ごとの比較（標準化該当比）(p.55-144)

・メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）

男女ともに県北部及び東部に該当者の少ない市町村が存在し、他方の県西部に該当者の多い市町村が存在する様相を呈しています。特に県南西部では、岐阜県全体（基準）と比較して有意に該当者が多い市町が存在しています。

・肥満該当者

男女とも、おおよそ県北部及び東部に該当者の少ない市町村が存在し、他方の県西部に該当者の多い市町村が存在する様相を呈しています。

・高血圧症有病者（予備群含む）

男女とも、県の東部と西部に県全体（基準）と比べて該当者が有意に多い市町村がみられます。一方、男性及び女性ともに、県北部に、県全体（基準）と比べて該当者が有意に少ない市町村がみられます。

・糖尿病有病者（予備群含む）

男女ともに、県の南部に県全体（基準）と比べて該当者が有意に多い市町村がみられます。しかし、各市町村とも該当比は 100 付近に分布しており、大きな差が比較的少ない状況です。

・脂質異常症有病者

男女ともに、該当者が有意に多い市町村は少なく、各市町村とも該当比は 100 付近に分布しており、大きな差が比較的少ない状況です。

・習慣的喫煙者

男性の場合、県北部から東部にかけて県全体（基準）と比べて該当者が有意に多い市町村が多くみられます。女性の場合は、県北部、県東部及び岐阜圏域の一部に該当者の有意に多い地域がみられます。ただし女性の場合喫煙者の総数は男性と比較して少ないために、地域間差が比較的大きくなる傾向があり、その影響がでていることも考えられます。

（注意）標準化該当比は２－（４）の方法により求めたものであり、３－（１）で述べた該当率の高低とは直接関連しないことにご注意ください。ここで言う該当者が有意に多いあるいは少ないとは、岐阜県全体を基準として比較した結果であり、該当率の高い生活習慣病であっても、標準化該当比が有意に高い市町村が多いことにはなりません。

（３）「Ⅲ　詳細資料」からみた特定健診の結果(p.197-269)

・令和元年度から令和 3 年度までのデータを基に、県内の各市町村での保健指導の区分を解析したところ、男性の約 15%～27%、女性の約 5%～12%が動機付け支援以上に該当しました。特に男性の場合は、動機付け支援に比べて積極的支援の割合が高く、ほとんどの市町村において、13%以上が該当しています。

・県内の各市町村でのメタボリックシンドローム該当者の区分を解析したところ、男性の約 32%～48%、女性の約 8%～19%が予備群以上に該当しました。

・BMI 区分を解析したところ、ほとんどの県内市町村において、女性の 10%以上が低体重に該当しました。食生活の改善は、生活習慣病の予防に重要と考えられています。

・高血圧症有病者、糖尿病有病者及び脂質異常症有病者について、特定健診データとレセプト情報との突合を行いました。なお、NDB へのレセプト情報の格納時期に関連して、解析は令和 2 年度のデータを用いて行いました。まず、これらの生活習慣病について通院歴のある者のうち、男性の約 55%、女性の約 66%が特定健診未受診である結果となりました。これらの人々は健診データが無いため健康状態がわかりません。そのため、今後は医療機関との連携を図り、これらの人々の特定健診受診勧奨を進めていく必要があると考えられます。各生活習慣病についての詳細は以下のとおりです。

（高血圧）

レセプト情報から、男女ともに 60 代以降に治療者の割合が急激に増加しています。そのうち男性で約 20%、女性で約 15%が虚血性心疾患の治療をしており、医療機関と連携した保健指導が重要と考えられます。

特定健診の結果からは、血圧分類でⅡ度以上に該当する者のうち、その半数近くが未治療でした。また、血圧分類でⅠ度以上の者の多くが脂質異常症を有しており、その割合は未治療者の方が治療中者と比較してやや高い傾向がみられます。

（糖尿病）

特定健診の結果から、糖尿病型に区分される者のうち9割以上が治療を受けています。また、治療中の者の75%以上がコントロールの良い状態となっています。こうしたコントロール状態を把握するためにも、治療中者への特定健診受診勧奨が重要と考えられます。

Ⅱ　結　果

１　結果の概要（令和元年度－令和３年度）

（１）分析対象者について

今回の報告書では、令和元年度から令和３年度までの間に特定健診を受診した、岐阜県に住所情報のある方を解析対象としました。前回の報告書では、令和２年度分データの解析を行ったので、今回の令和３年度分が最新の解析結果となります。残る２年分のデータについては、今回から NDB の利用によりデータ数が飛躍的に増加したので、前回までの解析結果と比較のために掲載しました（前回報告書にて令和２年度分データの総数は約 32 万 5 千人分であったのに対し、今回対象とする同年度のデータ総数は約 47 万 6 千人分であり、約 15 万人分の増となっています)。なお、今回の報告書から保険者別の区分は、NDB の情報区分に従い、国民健康保険、協会けんぽ、健保組合及び共済組合の４つとなります。

データ総数はいずれの年度も 50 万件近くに達しており、厚生労働省の公表する岐阜県の特定健診受診者総数の約 99%をカバーしています（参考 a)。この高いカバー率から、岐阜県の年齢階級別人口との比較を行い、特定健診受診率を推定したところ、男性よりも女性の受診率が低く、また年齢が高くなるほど受診率が減少傾向でした(参考 b、c、d)。

表１　分析対象者の性別保険者別年齢構成表

令和3年度

		年代別							
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	国民健康保険	2,551	3,658	3,773	3,521	5,024	13,129	25,535	57,191
	協会けんぽ	21,684	26,633	24,384	19,531	17,454	11,621	5,967	127,274
	健保組合	11,686	13,930	13,564	11,196	7,866	2,912	1,075	62,229
	共済組合	3,833	5,128	5,119	4,731	2,868	620	169	22,468
	合計	39,754	49,349	46,840	38,979	33,212	28,282	32,746	269,162
女性	国民健康保険	2,476	3,257	3,647	4,108	8,224	18,546	31,687	71,945
	協会けんぽ	14,574	19,100	18,951	16,767	14,434	8,103	4,249	96,178
	健保組合	7,258	9,117	9,490	7,352	4,791	1,688	831	40,527
	共済組合	3,613	4,744	4,656	3,898	1,882	394	255	19,442
	合計	27,921	36,218	36,744	32,125	29,331	28,731	37,022	228,092

令和2年度

		年代別							
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	国民健康保険	2,524	3,413	3,275	3,301	4,894	13,251	24,906	55,564
	協会けんぽ	21,486	25,654	21,485	18,853	16,297	10,626	5,196	119,597
	健保組合	12,036	14,244	13,030	11,295	7,676	2,855	952	62,088
	共済組合	3,977	5,321	4,946	4,860	2,728	532	145	22,509
	合計	40,023	48,632	42,736	38,309	31,595	27,264	31,199	259,758
女性	国民健康保険	2,310	2,963	3,099	3,909	8,035	18,901	30,258	69,475
	協会けんぽ	14,063	18,152	16,880	15,928	12,985	7,191	3,672	88,871
	健保組合	7,353	9,169	8,660	7,261	4,391	1,621	761	39,216
	共済組合	3,576	4,795	4,224	3,720	1,738	331	248	18,632
	合計	27,302	35,079	32,863	30,818	27,149	28,044	34,939	216,194

令和元年度

		年代別							
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	国民健康保険	2,868	3,727	3,281	3,511	5,398	15,822	24,861	59,468
	協会けんぽ	21,966	25,037	20,003	18,159	15,929	10,447	4,686	116,227
	健保組合	12,693	14,681	12,989	11,200	7,719	2,947	960	63,189
	共済組合	4,763	5,895	5,221	5,480	2,534	414	107	24,414
	合計	42,290	49,340	41,494	38,350	31,580	29,630	30,614	263,298
女性	国民健康保険	2,521	3,069	3,216	4,403	9,324	21,796	30,089	74,418
	協会けんぽ	13,986	17,450	16,236	15,487	12,622	7,058	3,272	86,111
	健保組合	7,748	9,547	8,564	7,213	4,363	1,688	697	39,820
	共済組合	3,938	4,814	4,200	3,798	1,457	278	272	18,757
	合計	28,193	34,880	32,216	30,901	27,766	30,820	34,330	219,106

図１　分析対象者の性別保険者別年齢構成グラフ



＜参考＞ａ　岐阜県の特定健診受診者総数に対する解析データのカバー率について

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
※特定健康診査受診者数	483,514	481,022	502,448
解析対象データ数（再掲）	482,404	475,952	497,254
カバー率（%）	99.8	98.9	99.0

※「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況（都道府県別一覧）」（厚生労働省）

＜参考＞ｂ　岐阜県人口（令和２年国勢調査結果）

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	63,022	74,849	64,444	60,061	57,258	63,709	73,040	456,383
女性	60,888	73,412	65,247	63,060	61,244	69,458	80,010	473,319
総　数	123,910	148,261	129,691	123,121	118,502	133,167	153,050	929,702

＜参考＞ｃ　（表１の再掲）分析対象者合計

令和3年度

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	39,754	49,349	46,840	38,979	33,212	28,282	32,746	269,162
女性	27,921	36,218	36,744	32,125	29,331	28,731	37,022	228,092
総 数	67,675	85,567	83,584	71,104	62,543	57,013	69,768	497,254

令和2年度

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	40,023	48,632	42,736	38,309	31,595	27,264	31,199	259,758
女性	27,302	35,079	32,863	30,818	27,149	28,044	34,939	216,194
総 数	67,325	83,711	75,599	69,127	58,744	55,308	66,138	475,952

令和元年度

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	42,290	49,340	41,494	38,350	31,580	29,630	30,614	263,298
女性	28,193	34,880	32,216	30,901	27,766	30,820	34,330	219,106
総 数	70,483	84,220	73,710	69,251	59,346	60,450	64,944	482,404

＜参考＞ｄ　特定健診受診率の推計（ｃ表/ｂ表＊100）

令和3年度

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	63.1	65.9	72.7	64.9	58.0	44.4	44.8	59.0
女性	45.9	49.3	56.3	50.9	47.9	41.4	46.3	48.2
総　数	54.6	57.7	64.4	57.8	52.8	42.8	45.6	53.5

令和2年度

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	63.5	65.0	66.3	63.8	55.2	42.8	42.7	56.9
女性	44.8	47.8	50.4	48.9	44.3	40.4	43.7	45.7
総　数	54.3	56.5	58.3	56.1	49.6	41.5	43.2	51.2

令和元年度

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	合計
男性	67.1	65.9	64.4	63.9	55.2	46.5	41.9	57.7
女性	46.3	47.5	49.4	49.0	45.3	44.4	42.9	46.3
総　数	56.9	56.8	56.8	56.2	50.1	45.4	42.4	51.9

（２）メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）

メタボリックシンドローム該当者及びその予備群は女性よりも男性に多くみられます。

また、メタボリックシンドローム該当者の割合は加齢とともに増加する傾向がみられ、こうした傾向は各保険者ともに共通しています。これらの傾向は前回までの報告書の結果と概ね一致しています。（年齢階級によっては、保険者間の該当者割合に差がみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊メタボリックシンドローム該当者
腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ下記の項目の２つ以上に該当する者
①中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、もしくはコレステロールを下げる薬を服用
②収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡張期血圧 85mmHg 以上、もしくは血圧を下げる薬を服用
③空腹時血糖 110mg/dl 以上、または HbA1c 6.0%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用
＊メタボリックシンドローム予備群
腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ上記の項目の１つに該当する者

図 2-1 メタボリックシンドローム該当者の割合



図 2-2-1 年代別医療保険者別メタボリックシンドローム該当者の割合（令和3年度（男性））



図 2-2-2 年代別医療保険者別メタボリックシンドローム該当者の割合（令和2年度（男性））



図 2-2-3 年代別医療保険者別メタボリックシンドローム該当者の割合（令和元年度（男性））



図 2-3-1 年代別医療保険者別メタボリックシンドローム該当者の割合（令和3年度（女性））



図 2-3-2 年代別医療保険者別メタボリックシンドローム該当者の割合（令和2年度（女性））



図 2-3-3 年代別医療保険者別メタボリックシンドローム該当者の割合（令和元年度（女性））



（３）肥満該当者

肥満該当者は、女性よりも男性に多い傾向がみられます。特に男性の場合、40 歳代前半ですでに 40%以上が肥満に該当し、高齢期になるまでその高割合は続く傾向がみられます。そのため肥満対策は、40 歳以下のできるだけ若い時期に開始することが重要と考えられます。なお、これらの傾向は前回までの報告書の結果と概ね一致しています。（年齢階級によっては、保険者間の該当者割合に差がみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊肥満該当者は次の３項目のいずれかに該当する者
①BMI が 25 以上かつ腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以上
②BMI のみ 25 以上
③腹囲のみ男性 85cm 以上、女性 90cm 以上

図 3-1 肥満該当者の割合



図 3-2-1 年代別医療保険者別肥満該当者の割合（令和3年度（男性））



図 3-2-2 年代別医療保険者別肥満該当者の割合（令和2年度（男性））



図 3-2-3 年代別医療保険者別肥満該当者の割合（令和元年度（男性））



図 3-3-1 年代別医療保険者別肥満該当者の割合（令和3年度（女性））



図 3-3-2 年代別医療保険者別肥満該当者の割合（令和2年度（女性））



図 3-3-3 年代別医療保険者別肥満該当者の割合（令和元年度（女性））



（４）高血圧症有病者（予備群含む）

高血圧症有病者及びその予備群の該当割合は、男性の方が女性よりもやや高い傾向があります。高血圧症有病者の該当割合は、加齢によって増加する傾向が男女とも顕著にみられ、男性は 60 代前半、女性は 60 代後半において、その割合は 50%近くに達しています。そのため男女とも対策は壮年期から講じることが重要と考えらます。なお、これらの傾向は前回までの報告書の結果と概ね一致しています。（年齢階級によっては、保険者間の該当者割合に差がみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊高血圧症有病者
　収縮期血圧が 140mmHg 以上、または拡張期血圧が 90mmHg 以上の者、もしくは血圧を下げる薬を服用する者
＊高血圧症予備群（血圧を下げる薬を服用する者を除く）
　①収縮期血圧が 130mmHg 以上 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 90mmHg 未満である者
　②収縮期血圧が 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 85mmHg 以上 90mmHg 未満である者

図 4-1 高血圧症有病者の割合



図 4-2-1 年代別医療保険者別高血圧症有病者の割合（令和3年度（男性））



図 4-2-2 年代別医療保険者別高血圧症有病者の割合（令和2年度（男性））



図 4-2-3 年代別医療保険者別高血圧症有病者の割合（令和元年度（男性））



図 4-3-1年代別医療保険者別高血圧症有病者の割合（令和3年度（女性））



図 4-3-2年代別医療保険者別高血圧症有病者の割合（令和2年度（女性））



図 4-3-3年代別医療保険者別高血圧症有病者の割合（令和元年度（女性））



（５）糖尿病有病者（予備群含む）

糖尿病有病者及びその予備群の該当割合は、男性の方が女性に比べてやや高い傾向にあり、加齢による該当者割合の増加も男性の方が顕著にみられます。なお、これらの傾向は前回までの報告書の結果と概ね一致しています。（年齢階級によっては、保険者間の該当者割合に差がみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊糖尿病有病者
　空腹時血糖 126mg/dl 以上、または HbA1c　6.5%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者
＊糖尿病予備群
　空腹時血糖 110mg/dl 以上 126mg/dl 未満、または HbA1c 6.0%以上 6.5%未満の者
　ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く

図 5-1 糖尿病有病者の割合

図 5-2-1 年代別医療保険者別糖尿病有病者の割合（令和3年度（男性））



図 5-2-2 年代別医療保険者別糖尿病有病者の割合（令和2年度（男性））



図 5-2-3 年代別医療保険者別糖尿病有病者の割合（令和元年度（男性））



図 5-3-1 年代別医療保険者別糖尿病有病者の割合（令和3年度（女性））



図 5-3-2 年代別医療保険者別糖尿病有病者の割合（令和2年度（女性））



図 5-3-3 年代別医療保険者別糖尿病有病者の割合（令和元年度（女性））



（６）脂質異常症有病者

脂質異常症有病者の該当割合は、男性では 40 代前半からすでに 50%程度と高く、高齢期までその高割合は続く傾向がみられます。一方女性では、50 代前半から加齢とともに該当者割合が増加し、60 代前半で約 60%以上の高割合に達しています。そのため男性は 40 歳以下から、女性は 50 歳以下からその対策を講じることが重要と考えられます。なお、これらの傾向は前回までの報告書の結果と概ね一致しています。（保険者間の該当者割合に差がみられますが、保険者によってデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊脂質異常症有病者
中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、または LDL コレステロール 140mg/dl 以上、もしくはコレステロールを下げる薬を服用する者

図 6-1 脂質異常症有病者の割合



図 6-2-1 年代別医療保険者別脂質異常症有病者の割合（令和3年度（男性））



図 6-2-2 年代別医療保険者別脂質異常症有病者の割合（令和2年度（男性））



図 6-2-3 年代別医療保険者別脂質異常症有病者の割合（令和元年度（男性））



図 6-3-1 年代別医療保険者別脂質異常症有病者の割合（令和3年度（女性））



図 6-3-2 年代別医療保険者別脂質異常症有病者の割合（令和2年度（女性））



図 6-3-3 年代別医療保険者別脂質異常症有病者の割合（令和元年度（女性））



（７）習慣的喫煙者

習慣的な喫煙については男性の該当割合が高く、加齢にともないその割合は低下するものの、60 代後半においても概ね 20%以上が喫煙習慣を維持している結果となりました。（保険者間の該当者割合に差が顕著にみられますが、保険者によって各年齢階級のデータ総数にバラつきがあるため、この高低のみをもって一概に判断することは難しいと考えられます。）

＊現在、習慣的に喫煙している者
「合計 100 本以上、または 6 ヶ月以上吸っている者」であり、「最近 1 ヶ月間も吸っている者」

図 7-1 習慣的喫煙者の割合



図 7-2-1 年代別医療保険者別習慣的喫煙者の割合（令和3年度（男性））



図 7-2-2 年代別医療保険者別習慣的喫煙者の割合（令和2年度（男性））



図 7-2-3 年代別医療保険者別習慣的喫煙者の割合（令和元年度（男性））



※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、この年代は65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

図 7-3-1 年代別医療保険者別習慣的喫煙者の割合（令和3年度（女性））



図 7-3-2 年代別医療保険者別習慣的喫煙者の割合（令和2年度（女性））



図 7-3-3 年代別医療保険者別習慣的喫煙者の割合（令和元年度（女性））



※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、この年代は65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

2　岐阜県全体

（1）　健診受診者数及び検査項目別平均値

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	人数	39,754	49,349	46,840	38,979	33,212	28,282	32,746	269,162
		割合(%)	14.8	18.3	17.4	14.5	12.3	10.5	12.2	100
	女性	人数	27,921	36,218	36,744	32,125	29,331	28,731	37,022	228,092
		割合(%)	12.2	15.9	16.1	14.1	12.9	12.6	16.2	100
	合計	人数	67,675	85,567	83,584	71,104	62,543	57,013	69,768	497,254
		割合(%)	13.6	17.2	16.8	14.3	12.6	11.5	14.0	100
令和2年度	男性	人数	40,023	48,632	42,736	38,309	31,595	27,264	31,199	259,758
		割合(%)	15.4	18.7	16.5	14.8	12.2	10.5	12.0	100
	女性	人数	27,302	35,079	32,863	30,818	27,149	28,044	34,939	216,194
		割合(%)	12.6	16.2	15.2	14.3	12.6	13.0	16.2	100
	合計	人数	67,325	83,711	75,599	69,127	58,744	55,308	66,138	475,952
		割合(%)	14.2	17.6	15.9	14.5	12.3	11.6	13.9	100
令和元年度	男性	人数	42,290	49,340	41,494	38,350	31,580	29,630	30,614	263,298
		割合(%)	16.1	18.7	15.8	14.6	12.0	11.3	11.6	100
	女性	人数	28,193	34,880	32,216	30,901	27,766	30,820	34,330	219,106
		割合(%)	12.9	15.9	14.7	14.1	12.7	14.1	15.7	100
	合計	人数	70,483	84,220	73,710	69,251	59,346	60,450	64,944	482,404
		割合(%)	14.6	17.5	15.3	14.4	12.3	12.5	13.5	100

検査項目別平均値

		男性	女性	男性	女性	男性	女性
		令和3年度		令和2年度		令和元年度	
BMI	度数	269,156	228,085	259,755	216,189	263,292	219,101
	平均値 (kg/m^2)	24.0	22.3	24.1	22.3	23.9	22.2
	標準偏差 (kg/m^2)	3.6	3.8	3.6	3.8	3.5	3.7
腹囲	度数	269,140	228,049	259,743	216,156	263,276	219,070
	平均値 (cm)	84.9	79.3	85.0	79.4	84.7	79.3
	標準偏差 (cm)	9.7	10.2	9.6	10.1	9.4	9.9
収縮期血圧	度数	269,160	228,081	259,748	216,181	263,290	219,097
	平均値 (mmHg)	127.8	123.4	128.0	123.5	126.9	122.1
	標準偏差 (mmHg)	16.8	18.0	16.7	17.9	16.7	17.8
拡張期血圧	度数	269,150	228,076	259,742	216,179	263,276	219,089
	平均値 (mmHg)	79.4	73.7	79.5	73.7	78.8	72.9
	標準偏差 (mmHg)	11.5	11.3	11.6	11.2	11.6	11.3
中性脂肪	度数	269,082	228,058	259,687	216,164	263,229	219,075
	平均値 (mg/dl)	130.2	96.4	132.9	96.8	130.7	96.5
	標準偏差 (mg/dl)	98.9	61.8	102.1	62.1	100.0	61.2
HDL コレステロール	度数	269,111	228,051	259,719	216,165	263,249	219,078
	平均値 (mg/dl)	58.7	71.3	58.6	71.3	58.5	70.6
	標準偏差 (mg/dl)	15.6	17.2	15.7	17.2	15.5	16.9
LDL コレステロール	度数	268,996	227,911	259,652	216,121	263,136	219,005
	平均値 (mg/dl)	124.2	125.2	125.1	126.1	124.0	125.0
	標準偏差 (mg/dl)	31.6	31.1	31.6	31.3	31.2	30.8
GOT	度数	269,120	228,065	259,724	216,170	263,253	219,071
	平均値 (IU/L)	24.6	21.7	24.7	21.6	24.4	21.5
	標準偏差 (IU/L)	12.5	9.6	12.7	9.3	12.2	9.4
GPT	度数	269,122	228,057	259,723	216,171	263,254	219,070
	平均値 (IU/L)	27.7	19.0	27.8	18.7	26.5	18.2
	標準偏差 (IU/L)	19.4	13.1	19.7	13.1	18.6	12.4
γ-GTP	度数	269,030	228,051	259,632	216,156	263,170	219,060
	平均値 (IU/L)	45.7	24.8	46.9	24.7	46.1	24.4
	標準偏差 (IU/L)	53.7	26.9	55.0	26.1	52.8	25.3
空腹時血糖	度数	204,064	166,233	195,193	154,924	201,489	159,996
	平均値 (mg/dl)	100.1	93.0	100.1	93.0	99.4	92.2
	標準偏差 (mg/dl)	20.9	14.6	21.2	14.8	20.6	14.3
HbA1c	度数	236,141	203,497	228,004	193,556	230,394	195,574
	平均値 (%)	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	5.6
	標準偏差 (%)	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5

（２）　検査項目別該当者割合







メタボリックシンドローム該当者の割合（岐阜県全体）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	4,739	8,054	9,716	9,540	9,075	8,643	10,906	60,673
			割合（%）	11.9	16.3	20.7	24.5	27.3	30.6	33.3	22.5
		予備群該当	人数	6,440	8,663	8,457	6,750	5,537	4,601	5,152	45,600
			割合（%）	16.2	17.6	18.1	17.3	16.7	16.3	15.7	16.9
		非該当	人数	28,571	32,631	28,665	22,689	18,598	15,031	16,682	162,867
			割合（%）	71.9	66.1	61.2	58.2	56.0	53.2	51.0	60.5
		合計	人数	39,750	49,348	46,838	38,979	33,210	28,275	32,740	269,140
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	509	1,081	1,630	1,956	2,353	3,114	4,854	15,497
			割合（%）	1.8	3.0	4.4	6.1	8.0	10.8	13.1	6.8
		予備群該当	人数	992	1,580	1,940	1,785	1,591	1,638	2,139	11,665
			割合（%）	3.6	4.4	5.3	5.6	5.4	5.7	5.8	5.1
		非該当	人数	26,400	33,552	33,174	28,381	25,381	23,971	30,027	200,886
			割合（%）	94.6	92.7	90.3	88.4	86.6	83.5	81.1	88.1
		合計	人数	27,901	36,213	36,744	32,122	29,325	28,723	37,020	228,048
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	4,861	8,118	9,119	9,414	8,670	8,454	10,123	58,759
			割合（%）	12.1	16.7	21.3	24.6	27.4	31.0	32.4	22.6
		予備群該当	人数	6,664	8,632	7,729	6,638	5,174	4,472	5,107	44,416
			割合（%）	16.7	17.7	18.1	17.3	16.4	16.4	16.4	17.1
		非該当	人数	28,497	31,881	25,886	22,256	17,748	14,334	15,966	156,568
			割合（%）	71.2	65.6	60.6	58.1	56.2	52.6	51.2	60.3
		合計	人数	40,022	48,631	42,734	38,308	31,592	27,260	31,196	259,743
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	469	1,054	1,472	1,906	2,168	3,074	4,478	14,621
			割合（%）	1.7	3.0	4.5	6.2	8.0	11.0	12.8	6.8
		予備群該当	人数	955	1,513	1,725	1,670	1,525	1,657	2,080	11,125
			割合（%）	3.5	4.3	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0	5.1
		非該当	人数	25,865	32,507	29,663	27,237	23,451	23,308	28,378	190,409
			割合（%）	94.8	92.7	90.3	88.4	86.4	83.1	81.2	88.1
		合計	人数	27,289	35,074	32,860	30,813	27,144	28,039	34,936	216,155
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	4,866	7,654	8,229	8,867	8,218	8,643	9,406	55,883
			割合（%）	11.5	15.5	19.8	23.1	26.0	29.2	30.7	21.2
		予備群該当	人数	6,907	8,616	7,453	6,571	5,194	4,914	4,933	44,588
			割合（%）	16.3	17.5	18.0	17.1	16.4	16.6	16.1	16.9
		非該当	人数	30,516	33,067	25,810	22,909	18,165	16,069	16,269	162,805
			割合（%）	72.2	67.0	62.2	59.7	57.5	54.2	53.2	61.8
		合計	人数	42,289	49,337	41,492	38,347	31,577	29,626	30,608	263,276
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	487	915	1,339	1,726	2,108	2,979	4,234	13,788
			割合（%）	1.7	2.6	4.2	5.6	7.6	9.7	12.3	6.3
		予備群該当	人数	923	1,428	1,598	1,573	1,515	1,796	1,942	10,775
			割合（%）	3.3	4.1	5.0	5.1	5.5	5.8	5.7	4.9
		非該当	人数	26,773	32,534	29,272	27,599	24,141	26,039	28,147	194,505
			割合（%）	95.0	93.3	90.9	89.3	87.0	84.5	82.0	88.8
		合計	人数	28,183	34,877	32,209	30,898	27,764	30,814	34,323	219,068
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0


令和3年度男女別年齢別肥満該当者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.5
9.5
30.1
3.7
10.9
32.7
3.3
12.8
34.3
2.7
15.0
33.1
2.4
17.4
31.4
1.7
24.0
27.7
2.9
15.4
31.4
8.6
0.5
8.8
9.5
0.7
10.0
8.9
1.3
11.6
7.8
2.1
12.3
7.3
2.7
12.8
7.1
5.3
13.8
8.1
2.5
11.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上


令和2年度男女別年齢別肥満該当者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.8
9.5
30.3
3.7
11.0
33.2
3.3
13.0
34.6
2.8
15.4
32.9
2.5
18.1
30.7
1.7
24.1
27.7
2.9
15.6
31.4
8.8
0.5
8.4
9.5
0.7
10.0
9.1
1.3
11.6
7.8
2.0
12.2
7.8
2.8
12.8
7.2
5.5
13.8
8.2
2.6
11.8
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上


令和元年度男女別年齢別肥満該当者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.7
9.6
29.6
3.4
11.1
32.2
3.1
13.3
33.3
2.8
15.4
31.6
2.4
18.1
29.7
1.7
24.0
26.3
2.8
15.6
30.2
8.6
0.5
8.1
9.1
0.7
9.5
8.7
1.3
11.1
7.6
1.8
11.5
7.6
2.8
12.3
7.2
5.2
13.1
8.0
2.5
11.3
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上

肥満該当者の割合(岐阜県全体)

					年代別						合計
					40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	1,390	1,846	1,568	1,059	796	1,030	7,689
				割合(%)	3.5	3.7	3.3	2.7	2.4	1.7	2.9
			腹囲のみ基準以上	人数	3,783	5,394	5,972	5,849	5,769	14,646	41,413
				割合(%)	9.5	10.9	12.8	15.0	17.4	24.0	15.4
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	11,950	16,137	16,068	12,916	10,421	16,924	84,416
				割合(%)	30.1	32.7	34.3	33.1	31.4	27.7	31.4
		非該当		人数	22,626	25,969	23,230	19,155	16,222	28,415	135,617
				割合(%)	56.9	52.6	49.6	49.1	48.8	46.6	50.4
		合計		人数	39,749	49,346	46,838	38,979	33,208	61,015	269,135
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	2,413	3,458	3,262	2,508	2,129	4,650	18,420
				割合(%)	8.6	9.5	8.9	7.8	7.3	7.1	8.1
			腹囲のみ基準以上	人数	142	253	469	661	791	3,486	5,802
				割合(%)	0.5	0.7	1.3	2.1	2.7	5.3	2.5
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	2,446	3,636	4,270	3,946	3,746	9,090	27,134
				割合(%)	8.8	10.0	11.6	12.3	12.8	13.8	11.9
		非該当		人数	22,900	28,864	28,742	25,007	22,660	48,514	176,687
				割合(%)	82.1	79.7	78.2	77.9	77.3	73.8	77.5
		合計		人数	27,901	36,211	36,743	32,122	29,326	65,740	228,043
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	1,528	1,781	1,410	1,074	780	966	7,539
				割合(%)	3.8	3.7	3.3	2.8	2.5	1.7	2.9
			腹囲のみ基準以上	人数	3,818	5,358	5,547	5,914	5,711	14,067	40,415
				割合(%)	9.5	11.0	13.0	15.4	18.1	24.1	15.6
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	12,135	16,168	14,792	12,600	9,712	16,196	81,603
				割合(%)	30.3	33.2	34.6	32.9	30.7	27.7	31.4
		非該当		人数	22,539	25,324	20,985	18,720	15,389	27,226	130,183
				割合(%)	56.3	52.1	49.1	48.9	48.7	46.6	50.1
		合計		人数	40,020	48,631	42,734	38,308	31,592	58,455	259,740
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	2,406	3,325	2,991	2,399	2,113	4,529	17,763
				割合(%)	8.8	9.5	9.1	7.8	7.8	7.2	8.2
			腹囲のみ基準以上	人数	146	244	414	601	757	3,490	5,652
				割合(%)	0.5	0.7	1.3	2.0	2.8	5.5	2.6
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	2,280	3,515	3,814	3,758	3,475	8,682	25,524
				割合(%)	8.4	10.0	11.6	12.2	12.8	13.8	11.8
		非該当		人数	22,456	27,990	25,641	24,055	20,800	46,271	167,213
				割合(%)	82.3	79.8	78.0	78.1	76.6	73.5	77.4
		合計		人数	27,288	35,074	32,860	30,813	27,145	62,972	216,152
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	1,568	1,672	1,292	1,073	745	994	7,344
				割合(%)	3.7	3.4	3.1	2.8	2.4	1.7	2.8
			腹囲のみ基準以上	人数	4,072	5,462	5,516	5,919	5,700	14,435	41,104
				割合(%)	9.6	11.1	13.3	15.4	18.1	24.0	15.6
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	12,520	15,880	13,806	12,107	9,381	15,821	79,515
				割合(%)	29.6	32.2	33.3	31.6	29.7	26.3	30.2
		非該当		人数	24,128	26,323	20,877	19,247	15,750	28,984	135,309
				割合(%)	57.1	53.4	50.3	50.2	49.9	48.1	51.4
		合計		人数	42,288	49,337	41,491	38,346	31,576	60,234	263,272
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	2,433	3,159	2,810	2,349	2,112	4,668	17,531
				割合(%)	8.6	9.1	8.7	7.6	7.6	7.2	8.0
			腹囲のみ基準以上	人数	132	235	408	552	781	3,397	5,505
				割合(%)	0.5	0.7	1.3	1.8	2.8	5.2	2.5
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	2,277	3,322	3,588	3,555	3,421	8,508	24,671
				割合(%)	8.1	9.5	11.1	11.5	12.3	13.1	11.3
		非該当		人数	23,340	28,159	25,403	24,442	21,451	48,563	171,358
				割合(%)	82.8	80.7	78.9	79.1	77.3	74.6	78.2
		合計		人数	28,182	34,875	32,209	30,898	27,765	65,136	219,065
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、この年代は65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

令和3年度男女別年齢別高血圧症有病者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
16.0
18.1
16.5
27.1
15.6
36.5
15.0
46.0
13.5
54.6
12.7
59.9
11.8
65.1
14.7
41.6
8.2
8.0
11.0
14.2
12.3
21.8
13.3
28.5
14.1
36.6
15.0
47.5
14.1
58.3
12.6
30.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

令和2年度男女別年齢別高血圧症有病者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
15.8
18.4
16.6
27.2
16.4
36.3
14.9
45.6
14.1
53.9
13.0
60.0
12.0
64.8
14.9
41.3
8.2
7.7
10.7
14.2
12.5
21.4
13.2
28.5
14.3
36.9
14.8
48.0
14.2
57.6
12.6
30.8
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当


令和元年度男女別年齢別高血圧症有病者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
15.3
17.4
15.6
25.3
15.4
34.7
14.6
43.8
14.1
51.6
12.8
57.3
11.5
62.4
14.4
39.3
7.6
7.2
9.9
12.9
11.9
20.2
12.7
26.3
13.7
34.9
14.2
44.8
13.3
54.9
11.9
29.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

高血圧症有病者の割合（岐阜県全体）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	7,205	13,360	17,112	17,944	18,129	16,948	21,317	112,015
			割合（%）	18.1	27.1	36.5	46.0	54.6	59.9	65.1	41.6
		予備群該当	人数	6,347	8,149	7,304	5,839	4,496	3,582	3,868	39,585
			割合（%）	16.0	16.5	15.6	15.0	13.5	12.7	11.8	14.7
		非該当	人数	26,202	27,840	22,424	15,196	10,587	7,752	7,560	117,561
			割合（%）	65.9	56.4	47.9	39.0	31.9	27.4	23.1	43.7
		合計	人数	39,754	49,349	46,840	38,979	33,212	28,282	32,745	269,161
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	2,227	5,129	7,993	9,140	10,732	13,651	21,571	70,443
			割合（%）	8.0	14.2	21.8	28.5	36.6	47.5	58.3	30.9
		予備群該当	人数	2,301	3,967	4,535	4,267	4,132	4,310	5,228	28,740
			割合（%）	8.2	11.0	12.3	13.3	14.1	15.0	14.1	12.6
		非該当	人数	23,393	27,121	24,213	18,714	14,465	10,770	10,223	128,899
			割合（%）	83.8	74.9	65.9	58.3	49.3	37.5	27.6	56.5
		合計	人数	27,921	36,217	36,741	32,121	29,329	28,731	37,022	228,082
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	7,361	13,248	15,524	17,453	17,016	16,347	20,212	107,161
			割合（%）	18.4	27.2	36.3	45.6	53.9	60.0	64.8	41.3
		予備群該当	人数	6,313	8,056	6,994	5,702	4,456	3,532	3,735	38,788
			割合（%）	15.8	16.6	16.4	14.9	14.1	13.0	12.0	14.9
		非該当	人数	26,347	27,327	20,218	15,152	10,123	7,384	7,251	113,802
			割合（%）	65.8	56.2	47.3	39.6	32.0	27.1	23.2	43.8
		合計	人数	40,021	48,631	42,736	38,307	31,595	27,263	31,198	259,751
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	2,089	4,981	7,044	8,794	10,030	13,469	20,136	66,543
			割合（%）	7.7	14.2	21.4	28.5	36.9	48.0	57.6	30.8
		予備群該当	人数	2,238	3,738	4,111	4,071	3,870	4,145	4,962	27,135
			割合（%）	8.2	10.7	12.5	13.2	14.3	14.8	14.2	12.6
		非該当	人数	22,975	26,357	21,704	17,951	13,247	10,430	9,841	122,505
			割合（%）	84.2	75.1	66.1	58.3	48.8	37.2	28.2	56.7
		合計	人数	27,302	35,076	32,859	30,816	27,147	28,044	34,939	216,183
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	7,375	12,480	14,408	16,796	16,306	16,969	19,090	103,424
			割合（%）	17.4	25.3	34.7	43.8	51.6	57.3	62.4	39.3
		予備群該当	人数	6,454	7,720	6,399	5,598	4,441	3,783	3,535	37,930
			割合（%）	15.3	15.6	15.4	14.6	14.1	12.8	11.5	14.4
		非該当	人数	28,459	29,140	20,686	15,956	10,832	8,878	7,988	121,939
			割合（%）	67.3	59.1	49.9	41.6	34.3	30.0	26.1	46.3
		合計	人数	42,288	49,340	41,493	38,350	31,579	29,630	30,613	263,293
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	2,043	4,490	6,500	8,129	9,703	13,804	18,858	63,527
			割合（%）	7.2	12.9	20.2	26.3	34.9	44.8	54.9	29.0
		予備群該当	人数	2,144	3,457	3,823	3,931	3,800	4,363	4,571	26,089
			割合（%）	7.6	9.9	11.9	12.7	13.7	14.2	13.3	11.9
		非該当	人数	24,004	26,932	21,892	18,841	14,262	12,652	10,899	129,482
			割合（%）	85.1	77.2	68.0	61.0	51.4	41.1	31.7	59.1
		合計	人数	28,191	34,879	32,215	30,901	27,765	30,819	34,328	219,098
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和3年度男女別年齢別糖尿病有病者の割合（岐阜県全体）



令和2年度男女別年齢別糖尿病有病者の割合（岐阜県全体）



令和元年度男女別年齢別糖尿病有病者の割合（岐阜県全体）



糖尿病有病者の割合（岐阜県全体）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	1,346	2,822	4,258	4,788	5,158	5,092	6,737	30,201
			割合（%）	3.4	5.7	9.1	12.3	15.6	18.1	20.6	11.3
		予備群該当	人数	1,374	2,788	3,411	3,619	3,566	3,080	3,580	21,418
			割合（%）	3.5	5.7	7.3	9.3	10.8	10.9	11.0	8.0
		非該当	人数	36,894	43,579	38,997	30,435	24,380	19,999	22,360	216,644
			割合（%）	93.1	88.6	83.6	78.4	73.6	71.0	68.4	80.8
		合計	人数	39,614	49,189	46,666	38,842	33,104	28,171	32,677	268,263
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	356	735	1,167	1,467	1,869	2,553	4,277	12,424
			割合（%）	1.3	2.0	3.2	4.6	6.4	8.9	11.6	5.5
		予備群該当	人数	371	709	1,124	1,603	1,747	2,144	3,166	10,864
			割合（%）	1.3	2.0	3.1	5.0	6.0	7.5	8.6	4.8
		非該当	人数	27,069	34,603	34,291	28,884	25,563	23,911	29,462	203,783
			割合（%）	97.4	96.0	93.7	90.4	87.6	83.6	79.8	89.7
		合計	人数	27,796	36,047	36,582	31,954	29,179	28,608	36,905	227,071
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	1,379	2,865	3,804	4,625	4,862	4,914	6,329	28,778
			割合（%）	3.5	5.9	8.9	12.1	15.4	18.1	20.3	11.1
		予備群該当	人数	1,454	2,589	3,162	3,714	3,328	2,966	3,286	20,499
			割合（%）	3.6	5.3	7.4	9.7	10.6	10.9	10.6	7.9
		非該当	人数	37,038	43,013	35,624	29,833	23,302	19,303	21,518	209,631
			割合（%）	92.9	88.7	83.6	78.2	74.0	71.0	69.1	81.0
		合計	人数	39,871	48,467	42,590	38,172	31,492	27,183	31,133	258,908
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	332	707	1,056	1,421	1,747	2,555	4,041	11,859
			割合（%）	1.2	2.0	3.2	4.6	6.5	9.1	11.6	5.5
		予備群該当	人数	378	735	1,001	1,534	1,742	2,048	2,878	10,316
			割合（%）	1.4	2.1	3.1	5.0	6.4	7.3	8.3	4.8
		非該当	人数	26,454	33,470	30,665	27,712	23,535	23,352	27,955	193,143
			割合（%）	97.4	95.9	93.7	90.4	87.1	83.5	80.2	89.7
		合計	人数	27,164	34,912	32,722	30,667	27,024	27,955	34,874	215,318
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	1,370	2,746	3,513	4,564	4,647	5,167	6,041	28,048
			割合（%）	3.3	5.6	8.5	11.9	14.8	17.5	19.8	10.7
		予備群該当	人数	1,455	2,597	3,080	3,491	3,289	3,169	3,262	20,343
			割合（%）	3.5	5.3	7.5	9.1	10.4	10.7	10.7	7.8
		非該当	人数	39,264	43,809	34,732	30,157	23,544	21,212	21,266	213,984
			割合（%）	93.3	89.1	84.0	78.9	74.8	71.8	69.6	81.6
		合計	人数	42,089	49,152	41,325	38,212	31,480	29,548	30,569	262,375
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	315	675	915	1,359	1,763	2,690	3,841	11,558
			割合（%）	1.1	1.9	2.9	4.4	6.4	8.8	11.2	5.3
		予備群該当	人数	375	640	1,054	1,402	1,634	2,183	2,862	10,150
			割合（%）	1.3	1.8	3.3	4.6	5.9	7.1	8.4	4.7
		非該当	人数	27,331	33,398	30,074	27,979	24,237	25,857	27,571	196,447
			割合（%）	97.5	96.2	93.9	91.0	87.7	84.1	80.4	90.0
		合計	人数	28,021	34,713	32,043	30,740	27,634	30,730	34,274	218,155
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

糖尿病有病者（再掲）：保健指導判定値を超えるレベルと判断される者の割合

※糖尿病については、下記に示す保健指導判定値による区分も調査を行った。

＊糖尿病有病者
　空腹時血糖 126mg/dl 以上、または HbA1c　6.5%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者
＊糖尿病について保健指導判定値を超えるレベルと判断される者
　空腹時血糖 100mg/dl 以上 126mg/dl 未満、または HbA1c 5.6%以上 6.5%未満の者
　ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く







糖尿病有病者の割合(岐阜県全体(再掲))

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	1,346	2,822	4,258	4,788	5,158	5,092	6,737	30,201
			割合(%)	3.4	5.7	9.1	12.3	15.6	18.1	20.6	11.3
		予備群該当	人数	7,669	12,054	13,271	12,594	11,230	9,643	11,011	77,472
			割合(%)	19.4	24.5	28.4	32.4	33.9	34.2	33.7	28.9
		非該当	人数	30,599	34,313	29,137	21,460	16,716	13,436	14,929	160,590
			割合(%)	77.2	69.8	62.4	55.2	50.5	47.7	45.7	59.9
		合計	人数	39,614	49,189	46,666	38,842	33,104	28,171	32,677	268,263
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	356	735	1,167	1,467	1,869	2,553	4,277	12,424
			割合(%)	1.3	2.0	3.2	4.6	6.4	8.9	11.6	5.5
		予備群該当	人数	2,707	4,594	6,296	7,405	7,695	8,396	11,826	48,919
			割合(%)	9.7	12.7	17.2	23.2	26.4	29.3	32.0	21.5
		非該当	人数	24,733	30,718	29,119	23,082	19,615	17,659	20,802	165,728
			割合(%)	89.0	85.2	79.6	72.2	67.2	61.7	56.4	73.0
		合計	人数	27,796	36,047	36,582	31,954	29,179	28,608	36,905	227,071
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	1,379	2,865	3,804	4,625	4,862	4,914	6,329	28,778
			割合(%)	3.5	5.9	8.9	12.1	15.4	18.1	20.3	11.1
		予備群該当	人数	7,756	11,866	12,232	12,556	10,745	9,288	10,223	74,666
			割合(%)	19.5	24.5	28.7	32.9	34.1	34.2	32.8	28.8
		非該当	人数	30,736	33,736	26,554	20,991	15,885	12,981	14,581	155,464
			割合(%)	77.1	69.6	62.3	55.0	50.4	47.8	46.8	60.0
		合計	人数	39,871	48,467	42,590	38,172	31,492	27,183	31,133	258,908
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	332	707	1,056	1,421	1,747	2,555	4,041	11,859
			割合(%)	1.2	2.0	3.2	4.6	6.5	9.1	11.6	5.5
		予備群該当	人数	2,642	4,616	5,583	7,147	7,279	8,098	10,898	46,263
			割合(%)	9.7	13.2	17.1	23.3	26.9	29.0	31.2	21.5
		非該当	人数	24,190	29,589	26,083	22,099	17,998	17,302	19,935	157,196
			割合(%)	89.1	84.8	79.7	72.1	66.6	61.9	57.2	73.0
		合計	人数	27,164	34,912	32,722	30,667	27,024	27,955	34,874	215,318
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	1,370	2,746	3,513	4,564	4,647	5,167	6,041	28,048
			割合(%)	3.3	5.6	8.5	11.9	14.8	17.5	19.8	10.7
		予備群該当	人数	7,753	11,671	11,568	12,169	10,572	9,738	10,072	73,543
			割合(%)	18.4	23.7	28.0	31.8	33.6	33.0	32.9	28.0
		非該当	人数	32,966	34,735	26,244	21,479	16,261	14,643	14,456	160,784
			割合(%)	78.3	70.7	63.5	56.2	51.7	49.6	47.3	61.3
		合計	人数	42,089	49,152	41,325	38,212	31,480	29,548	30,569	262,375
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	315	675	915	1,359	1,763	2,690	3,841	11,558
			割合(%)	1.1	1.9	2.9	4.4	6.4	8.8	11.2	5.3
		予備群該当	人数	2,610	4,132	5,323	6,649	7,086	8,577	10,567	44,944
			割合(%)	9.3	11.9	16.6	21.6	25.6	27.9	30.8	20.6
		非該当	人数	25,096	29,906	25,805	22,732	18,785	19,463	19,866	161,653
			割合(%)	89.6	86.2	80.5	73.9	68.0	63.3	58.0	74.1
		合計	人数	28,021	34,713	32,043	30,740	27,634	30,730	34,274	218,155
			割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0


令和3年度男女別年齢別脂質異常症有病者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
49.1
54.2
56.8
57.9
58.0
59.3
59.2
56.0
20.9
28.3
43.4
55.1
61.8
66.2
69.0
49.3
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和2年度男女別年齢別脂質異常症有病者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
49.9
55.2
58.0
58.7
58.8
59.7
59.4
56.8
20.8
28.7
43.2
55.8
62.8
67.7
70.0
49.8
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和元年度男女別年齢別脂質異常症有病者の割合（岐阜県全体）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
47.9
53.2
55.6
57.0
56.7
58.2
57.6
54.8
19.1
26.9
41.3
54.3
60.8
65.7
68.3
48.1
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当

脂質異常症有病者の割合（岐阜県全体）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	19,498	26,751	26,607	22,557	19,248	16,761	19,361	150,783
			割合（%）	49.1	54.2	56.8	57.9	58.0	59.3	59.2	56.0
		非該当	人数	20,241	22,581	20,215	16,411	13,956	11,512	13,368	118,284
			割合（%）	50.9	45.8	43.2	42.1	42.0	40.7	40.8	44.0
		合計	人数	39,739	49,332	46,822	38,968	33,204	28,273	32,729	269,067
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	5,839	10,257	15,925	17,691	18,109	19,014	25,529	112,364
			割合（%）	20.9	28.3	43.4	55.1	61.8	66.2	69.0	49.3
		非該当	人数	22,068	25,935	20,802	14,408	11,197	9,698	11,478	115,586
			割合（%）	79.1	71.7	56.6	44.9	38.2	33.8	31.0	50.7
		合計	人数	27,907	36,192	36,727	32,099	29,306	28,712	37,007	227,950
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	19,988	26,850	24,780	22,479	18,563	16,260	18,532	147,452
			割合（%）	49.9	55.2	58.0	58.7	58.8	59.7	59.4	56.8
		非該当	人数	20,030	21,776	17,950	15,819	13,024	10,995	12,649	112,243
			割合（%）	50.1	44.8	42.0	41.3	41.2	40.3	40.6	43.2
		合計	人数	40,018	48,626	42,730	38,298	31,587	27,255	31,181	259,695
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	5,672	10,064	14,202	17,209	17,048	18,972	24,451	107,618
			割合（%）	20.8	28.7	43.2	55.8	62.8	67.7	70.0	49.8
		非該当	人数	21,624	25,009	18,654	13,607	10,093	9,065	10,478	108,530
			割合（%）	79.2	71.3	56.8	44.2	37.2	32.3	30.0	50.2
		合計	人数	27,296	35,073	32,856	30,816	27,141	28,037	34,929	216,148
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	20,260	26,207	23,051	21,836	17,904	17,233	17,613	144,104
			割合（%）	47.9	53.2	55.6	57.0	56.7	58.2	57.6	54.8
		非該当	人数	21,997	23,089	18,415	16,482	13,653	12,382	12,978	118,996
			割合（%）	52.1	46.8	44.4	43.0	43.3	41.8	42.4	45.2
		合計	人数	42,257	49,296	41,466	38,318	31,557	29,615	30,591	263,100
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	5,386	9,395	13,314	16,770	16,872	20,234	23,437	105,408
			割合（%）	19.1	26.9	41.3	54.3	60.8	65.7	68.3	48.1
		非該当	人数	22,788	25,466	18,885	14,121	10,886	10,573	10,878	113,597
			割合（%）	80.9	73.1	58.7	45.7	39.2	34.3	31.7	51.9
		合計	人数	28,174	34,861	32,199	30,891	27,758	30,807	34,315	219,005
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和3年度男女別年齢別習慣的喫煙者の割合（岐阜県全体）



令和2年度男女別年齢別習慣的喫煙者の割合（岐阜県全体）



令和元年度男女別年齢別習慣的喫煙者の割合（岐阜県全体）



習慣的喫煙者の割合（岐阜県全体）

				年代別						合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	喫煙者	人数	14,951	18,048	16,291	12,666	9,920	12,812	84,688
			割合（%）	37.6	36.6	34.8	32.5	29.9	21.0	31.5
		非喫煙者	人数	24,802	31,300	30,549	26,311	23,291	48,214	184,467
			割合（%）	62.4	63.4	65.2	67.5	70.1	79.0	68.5
		合計	人数	39,753	49,348	46,840	38,977	33,211	61,026	269,155
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	2,658	3,866	3,473	2,573	1,960	2,440	16,970
			割合（%）	9.5	10.7	9.5	8.0	6.7	3.7	7.4
		非喫煙者	人数	25,261	32,350	33,271	29,551	27,371	63,313	211,117
			割合（%）	90.5	89.3	90.5	92.0	93.3	96.3	92.6
		合計	人数	27,919	36,216	36,744	32,124	29,331	65,753	228,087
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	喫煙者	人数	15,290	17,943	15,098	12,658	9,448	12,114	82,551
			割合（%）	38.2	36.9	35.3	33.0	29.9	20.7	31.8
		非喫煙者	人数	24,731	30,687	27,638	25,650	22,147	46,349	177,202
			割合（%）	61.8	63.1	64.7	67.0	70.1	79.3	68.2
		合計	人数	40,021	48,630	42,736	38,308	31,595	58,463	259,753
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	2,721	3,853	3,019	2,503	1,825	2,256	16,177
			割合（%）	10.0	11.0	9.2	8.1	6.7	3.6	7.5
		非喫煙者	人数	24,578	31,225	29,841	28,313	25,323	60,727	200,007
			割合（%）	90.0	89.0	90.8	91.9	93.3	96.4	92.5
		合計	人数	27,299	35,078	32,860	30,816	27,148	62,983	216,184
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	喫煙者	人数	16,404	18,602	14,816	12,911	9,569	12,847	85,149
			割合（%）	38.8	37.7	35.7	33.7	30.3	21.3	32.4
		非喫煙者	人数	25,869	30,718	26,656	25,423	22,002	47,384	178,052
			割合（%）	61.2	62.3	64.3	66.3	69.7	78.7	67.6
		合計	人数	42,273	49,320	41,472	38,334	31,571	60,231	263,201
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	2,940	3,901	3,034	2,560	1,771	2,345	16,551
			割合（%）	10.4	11.2	9.4	8.3	6.4	3.6	7.6
		非喫煙者	人数	25,241	30,971	29,171	28,337	25,993	62,800	202,513
			割合（%）	89.6	88.8	90.6	91.7	93.6	96.4	92.4
		合計	人数	28,181	34,872	32,205	30,897	27,764	65,145	219,064
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、この年代は65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

３　市町村別集計

（１）　市町村別 検査項目別マップ及び数値表

各市町村における生活習慣病該当者（予備群を含む）の分布状況を調査するため、市町村毎に標準化該当比を算出し、その集計結果をグラフ及びマップ等で記載しました。その算出及び記載の方法等については、「Ⅰ　報告書について」をご覧ください。

○メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）の概況

県内の状況を地域別でみると、男女ともに県北部及び東部に該当者の少ない市町村が存在し、他方の県西部に該当者の多い市町村が存在する様相を呈しています。特に県南西部では、県全体（基準）と比較して有意に該当者が多い市町村が存在しています。なおこれらの傾向は、前回までの報告書の結果とも概ね一致しています。

＊メタボリックシンドローム該当者
　腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ下記の項目の２つ以上に該当する者
　①中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、もしくはコレステロールを下げる薬を服用
　②収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡張期血圧 85mmHg 以上、もしくは血圧を下げる薬を服用
　③空腹時血糖 110mg/dl 以上、または HbA1c 6.0%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用
＊メタボリックシンドローム予備群
　腹囲男性 85cm 以上、女性 90cm 以上かつ上記の項目の１つに該当する者

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和3年度　メタボ該当者（予備群含む））



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　メタボ該当者（予備群含む））



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和元年度　メタボ該当者（予備群含む））



メタボ該当者（予備群含む）（令和3年度（男性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボ該当者（予備群含む）（令和3年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）（令和３年度　女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	5381	5431.0	99.1	96.4	101.8	▽
	岐阜保健所	羽島市	1045	845.8	123.5	116.2	131.3	▲▲
		各務原市	1907	1842.6	103.5	98.9	108.2	▲
		山県市	414	361.7	114.4	103.7	126.0	▲▲
		瑞穂市	759	681.8	111.3	103.5	119.5	▲▲
		本巣市	506	465.5	108.7	99.4	118.6	▲
		岐南町	278	298.6	93.1	82.5	104.7	▽
		笠松町	331	281.1	117.8	105.4	131.2	▲▲
		北方町	226	223.6	101.1	88.3	115.1	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	2103	1909.7	110.1	105.5	114.9	▲▲
		海津市	503	449.2	112.0	102.4	122.2	▲▲
		養老町	518	401.0	129.2	118.3	140.8	▲▲
		垂井町	375	328.7	114.1	102.8	126.3	▲▲
		関ケ原町	120	98.4	121.9	101.1	145.8	▲▲
		神戸町	339	288.6	117.5	105.3	130.7	▲▲
		輪之内町	159	136.1	116.8	99.4	136.5	▲
		安八町	273	207.6	131.5	116.4	148.1	▲▲
		揖斐川町	381	328.7	115.9	104.6	128.2	▲▲
		大野町	334	300.4	111.2	99.6	123.8	▲
		池田町	317	295.8	107.2	95.7	119.6	▲
中濃圏域	関保健所	関市	1044	1090.0	95.8	90.1	101.8	▽
		美濃市	233	262.3	88.8	77.8	101.0	▽
		郡上市	674	712.7	94.6	87.6	102.0	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	671	642.7	104.4	96.7	112.6	▲
		可児市	1363	1245.0	109.5	103.7	115.5	▲▲
		坂祝町	129	108.4	119.0	99.3	141.4	▲
		富加町	85	82.0	103.6	82.8	128.1	▲
		川辺町	132	135.0	97.8	81.8	116.0	▽
		七宗町	52	65.4	79.5	59.4	104.2	▽
		八百津町	155	160.7	96.4	81.9	112.9	▽
		白川町	93	114.4	81.3	65.6	99.6	▽▽
		東白川村	44	34.8	126.3	91.7	169.5	▲
		御嵩町	275	256.4	107.3	95.0	120.7	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	1376	1561.2	88.1	83.5	92.9	▽▽
		瑞浪市	436	510.6	85.4	77.6	93.8	▽▽
		土岐市	745	797.6	93.4	86.8	100.4	▽
	恵那保健所	中津川市	988	1075.4	91.9	86.2	97.8	▽▽
		恵那市	608	723.4	84.0	77.5	91.0	▽▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	984	1397.4	70.4	66.1	75.0	▽▽
		飛騨市	354	445.8	79.4	71.4	88.1	▽▽
		下呂市	421	536.4	78.5	71.2	86.4	▽▽
		白川村	31	28.7	108.1	73.4	153.4	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）（令和３年度　男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	21554	20599.4	104.6	103.2	106.0	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	3773	3503.1	107.7	104.3	111.2	▲▲
		各務原市	7805	7610.0	102.6	100.3	104.9	▲▲
		山県市	1388	1324.8	104.8	99.3	110.4	▲
		瑞穂市	2747	2771.4	99.1	95.4	102.9	▽
		本巣市	1907	1815.1	105.1	100.4	109.9	▲▲
		岐南町	1309	1229.7	106.5	100.8	112.4	▲▲
		笠松町	1194	1105.9	108.0	101.9	114.3	▲▲
		北方町	889	857.2	103.7	97.0	110.8	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	8157	7869.8	103.6	101.4	105.9	▲▲
		海津市	1974	1833.8	107.6	102.9	112.5	▲▲
		養老町	1678	1538.7	109.1	103.9	114.4	▲▲
		垂井町	1359	1289.2	105.4	99.9	111.2	▲
		関ケ原町	348	344.0	101.2	90.8	112.4	▲
		神戸町	1274	1240.8	102.7	97.1	108.5	▲
		輪之内町	571	527.8	108.2	99.5	117.4	▲
		安八町	939	881.5	106.5	99.8	113.6	▲
		揖斐川町	1226	1105.6	110.9	104.8	117.3	▲▲
		大野町	1228	1148.6	106.9	101.0	113.1	▲▲
		池田町	1255	1216.4	103.2	97.5	109.0	▲
中濃圏域	関保健所	関市	4446	4370.0	101.7	98.8	104.8	▲
		美濃市	919	993.3	92.5	86.6	98.7	▽▽
		郡上市	2467	2557.5	96.5	92.7	100.3	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	2774	2748.1	100.9	97.2	104.8	▲
		可児市	5057	5170.8	97.8	95.1	100.5	▽
		坂祝町	445	430.2	103.4	94.1	113.5	▲
		富加町	303	303.3	99.9	89.0	111.8	▽
		川辺町	556	580.6	95.8	88.0	104.1	▽
		七宗町	178	208.9	85.2	73.2	98.7	▽▽
		八百津町	614	608.1	101.0	93.1	109.3	▲
		白川町	333	432.6	77.0	68.9	85.7	▽▽
		東白川村	105	111.2	94.4	77.2	114.3	▽
		御嵩町	1081	1087.0	99.4	93.6	105.6	▽
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	5711	5948.8	96.0	93.5	98.5	▽▽
		瑞浪市	1842	1979.1	93.1	88.9	97.4	▽▽
		土岐市	3001	3256.0	92.2	88.9	95.5	▽▽
	恵那保健所	中津川市	4119	4303.6	95.7	92.8	98.7	▽▽
		恵那市	2540	2736.1	92.8	89.3	96.5	▽▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	4223	5116.5	82.5	80.1	85.1	▽▽
		飛騨市	1278	1574.3	81.2	76.8	85.8	▽▽
		下呂市	1599	1847.5	86.5	82.4	90.9	▽▽
		白川村	107	97.1	110.2	90.3	133.2	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボ該当者（予備群含む）（令和2年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボ該当者（予備群含む）（令和2年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）（令和２年度　女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	5514	5269.4	104.6	101.9	107.4	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	923	773.7	119.3	111.7	127.2	▲▲
		各務原市	1906	1757.6	108.4	103.6	113.4	▲▲
		山県市	421	347.4	121.2	109.9	133.3	▲▲
		瑞穂市	680	655.1	103.8	96.1	111.9	▲
		本巣市	461	458.2	100.6	91.6	110.2	▲
		岐南町	264	275.3	95.9	84.7	108.2	▽
		笠松町	322	273.9	117.6	105.1	131.1	▲▲
		北方町	215	210.4	102.2	89.0	116.8	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	1893	1750.4	108.1	103.3	113.1	▲▲
		海津市	534	438.2	121.9	111.7	132.6	▲▲
		養老町	501	383.1	130.8	119.6	142.7	▲▲
		垂井町	318	298.0	106.7	95.3	119.1	▲
		関ケ原町	114	98.4	115.9	95.6	139.2	▲
		神戸町	348	282.0	123.4	110.8	137.1	▲▲
		輪之内町	144	129.6	111.1	93.7	130.8	▲
		安八町	259	199.7	129.7	114.4	146.5	▲▲
		揖斐川町	335	321.9	104.1	93.2	115.8	▲
		大野町	314	290.1	108.3	96.6	120.9	▲
		池田町	310	291.0	106.5	95.0	119.1	▲
中濃圏域	関保健所	関市	990	1016.8	97.4	91.4	103.6	▽
		美濃市	202	246.0	82.1	71.2	94.3	▽▽
		郡上市	633	680.5	93.0	85.9	100.6	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	558	590.6	94.5	86.8	102.7	▽
		可児市	1195	1142.1	104.6	98.8	110.7	▲
		坂祝町	114	90.5	125.9	103.9	151.3	▲▲
		富加町	84	67.6	124.3	99.2	153.9	▲
		川辺町	139	128.6	108.1	90.9	127.6	▲
		七宗町	46	57.3	80.2	58.7	107.0	▽
		八百津町	170	153.2	111.0	94.9	129.0	▲
		白川町	84	119.0	70.6	56.3	87.4	▽▽
		東白川村	49	33.8	144.8	107.1	191.4	▲▲
		御嵩町	265	250.0	106.0	93.6	119.6	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	1272	1456.8	87.3	82.6	92.3	▽▽
		瑞浪市	404	474.6	85.1	77.0	93.9	▽▽
		土岐市	682	738.2	92.4	85.6	99.6	▽▽
	恵那保健所	中津川市	946	1042.4	90.8	85.1	96.7	▽▽
		恵那市	572	682.9	83.8	77.0	90.9	▽▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	812	1295.3	62.7	58.4	67.2	▽▽
		飛騨市	312	425.3	73.4	65.5	82.0	▽▽
		下呂市	407	523.1	77.8	70.4	85.7	▽▽
		白川村	34	28.1	121.2	83.9	169.4	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）（令和２年度　男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	21309	20304.5	104.9	103.5	106.4	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	3565	3312.8	107.6	104.1	111.2	▲▲
		各務原市	7603	7420.5	102.5	100.2	104.8	▲▲
		山県市	1397	1313.9	106.3	100.8	112.0	▲▲
		瑞穂市	2698	2725.7	99.0	95.3	102.8	▽
		本巣市	1853	1777.8	104.2	99.5	109.1	▲
		岐南町	1217	1163.0	104.6	98.8	110.7	▲
		笠松町	1178	1079.1	109.2	103.0	115.6	▲▲
		北方町	884	820.4	107.8	100.8	115.1	▲▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	7654	7498.3	102.1	99.8	104.4	▲
		海津市	1978	1816.2	108.9	104.2	113.8	▲▲
		養老町	1586	1494.0	106.2	101.0	111.5	▲▲
		垂井町	1300	1260.9	103.1	97.6	108.9	▲
		関ケ原町	340	345.2	98.5	88.3	109.6	▽
		神戸町	1156	1131.8	102.1	96.3	108.2	▲
		輪之内町	534	501.4	106.5	97.7	115.9	▲
		安八町	908	851.7	106.6	99.8	113.8	▲
		揖斐川町	1155	1116.1	103.5	97.6	109.6	▲
		大野町	1185	1117.4	106.0	100.1	112.3	▲▲
		池田町	1245	1194.7	104.2	98.5	110.2	▲
中濃圏域	関保健所	関市	4390	4271.1	102.8	99.8	105.9	▲
		美濃市	948	984.3	96.3	90.3	102.6	▽
		郡上市	2360	2508.6	94.1	90.3	97.9	▽▽
	可茂保健所	美濃加茂市	2712	2630.3	103.1	99.3	107.1	▲
		可児市	4964	4972.2	99.8	97.1	102.7	▽
		坂祝町	480	458.8	104.6	95.5	114.4	▲
		富加町	294	268.2	109.6	97.4	122.9	▲
		川辺町	540	573.2	94.2	86.4	102.5	▽
		七宗町	200	196.7	101.7	88.1	116.8	▲
		八百津町	572	588.2	97.2	89.4	105.5	▽
		白川町	360	448.1	80.3	72.3	89.1	▽▽
		東白川村	100	111.5	89.7	73.0	109.1	▽
		御嵩町	1052	1045.5	100.6	94.6	106.9	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	5430	5698.1	95.3	92.8	97.9	▽▽
		瑞浪市	1788	1876.1	95.3	90.9	99.8	▽▽
		土岐市	2814	3066.9	91.8	88.4	95.2	▽▽
	恵那保健所	中津川市	4005	4215.5	95.0	92.1	98.0	▽▽
		恵那市	2457	2655.9	92.5	88.9	96.2	▽▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	4061	4892.7	83.0	80.5	85.6	▽▽
		飛騨市	1265	1551.5	81.5	77.1	86.2	▽▽
		下呂市	1520	1817.0	83.7	79.5	88.0	▽▽
		白川村	118	99.2	118.9	98.4	142.4	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボ該当者（予備群含む）（令和元年度（男性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボ該当者（予備群含む）（令和元年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）（令和元年度　女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	4960	4877.5	101.7	98.9	104.6	▲
	岐阜保健所	羽島市	956	749.9	127.5	119.5	135.8	▲▲
		各務原市	1807	1644.2	109.9	104.9	115.1	▲▲
		山県市	406	330.6	122.8	111.1	135.3	▲▲
		瑞穂市	664	601.1	110.5	102.2	119.2	▲▲
		本巣市	436	437.7	99.6	90.5	109.4	▽
		岐南町	245	264.4	92.7	81.4	105.0	▽
		笠松町	319	254.1	125.5	112.1	140.1	▲▲
		北方町	244	202.3	120.6	105.9	136.7	▲▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	1760	1653.0	106.5	101.6	111.6	▲▲
		海津市	460	411.4	111.8	101.8	122.5	▲▲
		養老町	459	359.4	127.7	116.3	139.9	▲▲
		垂井町	305	281.1	108.5	96.7	121.4	▲
		関ケ原町	106	98.4	107.7	88.2	130.3	▲
		神戸町	330	254.6	129.6	116.0	144.4	▲▲
		輪之内町	126	111.8	112.7	93.8	134.1	▲
		安八町	240	196.4	122.2	107.2	138.7	▲▲
		揖斐川町	342	320.7	106.6	95.6	118.6	▲
		大野町	274	273.8	100.1	88.6	112.7	▲
		池田町	277	283.7	97.6	86.5	109.8	▽
中濃圏域	関保健所	関市	1008	981.3	102.7	96.5	109.3	▲
		美濃市	221	241.2	91.6	79.9	104.5	▽
		郡上市	563	642.5	87.6	80.5	95.2	▽▽
	可茂保健所	美濃加茂市	546	553.4	98.7	90.6	107.3	▽
		可児市	1108	1128.8	98.2	92.5	104.1	▽
		坂祝町	124	109.6	113.1	94.1	134.9	▲
		富加町	78	69.9	111.6	88.2	139.3	▲
		川辺町	126	123.6	102.0	84.9	121.4	▲
		七宗町	45	57.1	78.8	57.4	105.4	▽
		八百津町	179	150.8	118.7	101.9	137.4	▲▲
		白川町	91	112.5	80.9	65.1	99.3	▽▽
		東白川村	47	32.8	143.5	105.4	190.8	▲▲
		御嵩町	230	232.7	98.8	86.5	112.5	▽
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	1315	1447.1	90.9	86.0	95.9	▽▽
		瑞浪市	406	448.3	90.6	82.0	99.8	▽▽
		土岐市	660	694.5	95.0	87.9	102.6	▽
	恵那保健所	中津川市	893	1012.6	88.2	82.5	94.2	▽▽
		恵那市	617	669.2	92.2	85.1	99.8	▽▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	830	1304.1	63.6	59.4	68.1	▽▽
		飛騨市	306	406.5	75.3	67.1	84.2	▽▽
		下呂市	431	512.0	84.2	76.4	92.5	▽▽
		白川村	23	26.5	86.8	55.0	130.2	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

メタボリックシンドローム該当者（予備群含む）（令和元年度　男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	20401	19305.7	105.7	104.2	107.1	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	3413	3172.7	107.6	104.0	111.2	▲▲
		各務原市	7292	7156.7	101.9	99.6	104.3	▲
		山県市	1368	1286.4	106.3	100.8	112.1	▲▲
		瑞穂市	2556	2582.5	99.0	95.2	102.9	▽
		本巣市	1855	1792.2	103.5	98.8	108.3	▲
		岐南町	1241	1153.3	107.6	101.7	113.8	▲▲
		笠松町	1104	1017.7	108.5	102.2	115.1	▲▲
		北方町	882	808.8	109.1	102.0	116.5	▲▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	7609	7333.8	103.8	101.4	106.1	▲▲
		海津市	1860	1748.4	106.4	101.6	111.3	▲▲
		養老町	1593	1460.6	109.1	103.8	114.6	▲▲
		垂井町	1303	1217.5	107.0	101.3	113.0	▲▲
		関ケ原町	343	342.2	100.2	89.9	111.4	▲
		神戸町	1013	991.3	102.2	96.0	108.7	▲
		輪之内町	533	478.0	111.5	102.2	121.4	▲▲
		安八町	870	794.7	109.5	102.3	117.0	▲▲
		揖斐川町	1173	1137.2	103.2	97.3	109.2	▲
		大野町	1149	1100.1	104.4	98.5	110.7	▲
		池田町	1198	1167.8	102.6	96.9	108.6	▲
中濃圏域	関保健所	関市	4329	4233.3	102.3	99.2	105.4	▲
		美濃市	911	976.2	93.3	87.4	99.6	▽▽
		郡上市	2259	2418.2	93.4	89.6	97.4	▽▽
	可茂保健所	美濃加茂市	2676	2639.8	101.4	97.6	105.3	▲
		可児市	4775	4923.4	97.0	94.3	99.8	▽▽
		坂祝町	545	561.1	97.1	89.1	105.6	▽
		富加町	277	299.9	92.4	81.8	103.9	▽
		川辺町	518	557.4	92.9	85.1	101.3	▽
		七宗町	201	201.2	99.9	86.6	114.7	▽
		八百津町	544	574.9	94.6	86.8	102.9	▽
		白川町	331	407.4	81.2	72.7	90.5	▽▽
		東白川村	105	98.2	106.9	87.4	129.4	▲
		御嵩町	995	994.5	100.0	93.9	106.5	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	5528	5800.0	95.3	92.8	97.9	▽▽
		瑞浪市	1723	1835.6	93.9	89.5	98.4	▽▽
		土岐市	2649	2859.0	92.7	89.2	96.3	▽▽
	恵那保健所	中津川市	3924	4132.0	95.0	92.0	98.0	▽▽
		恵那市	2479	2628.6	94.3	90.6	98.1	▽▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	4044	4862.5	83.2	80.6	85.8	▽▽
		飛騨市	1227	1506.1	81.5	77.0	86.2	▽▽
		下呂市	1570	1822.6	86.1	81.9	90.5	▽▽
		白川村	105	91.6	114.6	93.8	138.8	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○肥満該当者の概況

県内の状況を地域別でみると、男性及び女性ともに、おおよそ県北部及び東部に該当者の少ない市町村が存在し、他方の県西部に該当者の多い市町村が存在する様相を呈しています。なおこれらの傾向は、前回までの報告書の結果とも概ね一致しています。

＊肥満該当者は次の３項目のいずれかに該当する者
①BMI が 25 以上かつ腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以上
②BMI のみ 25 以上
③腹囲のみ男性 85cm 以上、女性 90cm 以上
※BMI=体重(kg)÷(身長(m))^2

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和3年度　肥満該当者）



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　肥満該当者）



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和元年度　肥満該当者）



肥満該当者（令和3年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和3年度（女性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和３年度　女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	9999	10387.0	96.3	94.4	98.2	▽▽
	羽島市	1827	1607.6	113.6	108.5	119.0	▲▲
	各務原市	3597	3500.5	102.8	99.4	106.2	▲
	山県市	720	662.8	108.6	100.8	116.9	▲▲
	瑞穂市	1396	1321.2	105.7	100.2	111.3	▲▲
	本巣市	917	865.0	106.0	99.3	113.1	▲
	岐南町	551	577.8	95.4	87.6	103.7	▽
	笠松町	585	534.8	109.4	100.7	118.6	▲▲
	北方町	427	436.5	97.8	88.8	107.6	▽
西濃圏域	大垣市	3914	3718.9	105.2	102.0	108.6	▲▲
	海津市	926	817.5	113.3	106.1	120.8	▲▲
	養老町	896	733.8	122.1	114.2	130.4	▲▲
	垂井町	709	627.2	113.0	104.9	121.7	▲▲
	関ケ原町	217	180.1	120.5	105.0	137.6	▲▲
	神戸町	579	528.9	109.5	100.7	118.8	▲▲
	輪之内町	313	258.1	121.2	108.2	135.5	▲▲
	安八町	447	389.6	114.7	104.3	125.9	▲▲
	揖斐川町	666	581.9	114.5	105.9	123.5	▲▲
	大野町	602	561.3	107.2	98.8	116.2	▲
	池田町	637	568.5	112.1	103.5	121.1	▲▲
中濃圏域	関市	2020	2043.7	98.8	94.6	103.2	▽
	美濃市	450	482.6	93.2	84.8	102.3	▽
	美濃加茂市	1303	1267.2	102.8	97.3	108.6	▲
	可児市	2561	2402.9	106.6	102.5	110.8	▲▲
	郡上市	1322	1303.8	101.4	96.0	107.0	▲
	坂祝町	215	200.8	107.1	93.3	122.4	▲
	富加町	162	153.3	105.7	90.1	123.3	▲
	川辺町	244	253.6	96.2	84.5	109.1	▽
	七宗町	105	113.4	92.6	75.7	112.1	▽
	八百津町	272	283.9	95.8	84.8	107.9	▽
	白川町	166	205.7	80.7	68.9	93.9	▽▽
	東白川村	65	61.8	105.1	81.1	134.0	▲
	御嵩町	504	476.4	105.8	96.8	115.4	▲
東濃圏域	多治見市	2655	2924.2	90.8	87.4	94.3	▽▽
	中津川市	1930	2034.0	94.9	90.7	99.2	▽▽
	瑞浪市	869	967.2	89.8	84.0	96.0	▽▽
	恵那市	1261	1336.6	94.3	89.2	99.7	▽▽
	土岐市	1496	1511.6	99.0	94.0	104.1	▽
飛騨圏域	高山市	2243	2635.0	85.1	81.6	88.7	▽▽
	飛騨市	712	802.8	88.7	82.3	95.5	▽▽
	下呂市	818	984.1	83.1	77.5	89.0	▽▽
	白川村	58	52.2	111.2	84.4	143.7	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和３年度　男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	26937	25979.6	103.7	102.5	104.9	▲▲
	羽島市	4670	4409.9	105.9	102.9	109.0	▲▲
	各務原市	9902	9612.4	103.0	101.0	105.1	▲▲
	山県市	1698	1638.9	103.6	98.7	108.7	▲
	瑞穂市	3578	3533.2	101.3	98.0	104.6	▲
	本巣市	2427	2278.5	106.5	102.3	110.8	▲▲
	岐南町	1666	1571.8	106.0	101.0	111.2	▲▲
	笠松町	1467	1395.1	105.2	99.8	110.7	▲
	北方町	1127	1089.6	103.4	97.5	109.7	▲
西濃圏域	大垣市	10192	9971.4	102.2	100.2	104.2	▲▲
	海津市	2399	2279.2	105.3	101.1	109.6	▲▲
	養老町	2038	1902.5	107.1	102.5	111.9	▲▲
	垂井町	1692	1631.7	103.7	98.8	108.8	▲
	関ケ原町	416	421.8	98.6	89.4	108.6	▽
	神戸町	1614	1558.9	103.5	98.5	108.7	▲
	輪之内町	722	663.5	108.8	101.0	117.1	▲▲
	安八町	1191	1108.7	107.4	101.4	113.7	▲▲
	揖斐川町	1500	1357.0	110.5	105.0	116.3	▲▲
	大野町	1533	1443.1	106.2	101.0	111.7	▲▲
	池田町	1573	1538.9	102.2	97.2	107.4	▲
中濃圏域	関市	5539	5488.3	100.9	98.3	103.6	▲
	美濃市	1156	1233.6	93.7	88.4	99.3	▽▽
	美濃加茂市	3515	3496.4	100.5	97.2	103.9	▲
	可児市	6479	6544.7	99.0	96.6	101.4	▽
	郡上市	3089	3147.2	98.1	94.7	101.7	▽
	坂祝町	539	534.4	100.9	92.5	109.7	▲
	富加町	367	376.8	97.4	87.7	107.9	▽
	川辺町	703	720.6	97.6	90.5	105.0	▽
	七宗町	229	251.4	91.1	79.7	103.7	▽
	八百津町	736	746.1	98.6	91.6	106.0	▽
	白川町	422	522.1	80.8	73.3	88.9	▽▽
	東白川村	137	135.2	101.4	85.1	119.8	▲
	御嵩町	1356	1357.9	99.9	94.6	105.3	▽
東濃圏域	多治見市	7166	7439.3	96.3	94.1	98.6	▽▽
	中津川市	5114	5412.7	94.5	91.9	97.1	▽▽
	瑞浪市	2280	2486.8	91.7	88.0	95.5	▽▽
	恵那市	3119	3403.0	91.7	88.5	94.9	▽▽
	土岐市	3767	4103.1	91.8	88.9	94.8	▽▽
飛騨圏域	高山市	5600	6393.6	87.6	85.3	89.9	▽▽
	飛騨市	1685	1935.1	87.1	83.0	91.3	▽▽
	下呂市	2035	2283.7	89.1	85.3	93.1	▽▽
	白川村	143	120.7	118.5	99.9	139.6	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和2年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和2年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和2年度　女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	9996	10094.4	99.0	97.1	101.0	▽
	岐阜保健所	羽島市	1653	1479.4	111.7	106.4	117.3	▲▲
		各務原市	3528	3356.6	105.1	101.7	108.6	▲▲
		山県市	707	638.5	110.7	102.7	119.2	▲▲
		瑞穂市	1317	1263.5	104.2	98.7	110.0	▲
		本巣市	895	853.4	104.9	98.1	112.0	▲
		岐南町	523	537.8	97.3	89.1	106.0	▽
		笠松町	570	523.2	108.9	100.2	118.3	▲▲
		北方町	393	417.1	94.2	85.1	104.0	▽
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	3605	3458.4	104.2	100.9	107.7	▲▲
		海津市	958	799.7	119.8	112.3	127.6	▲▲
		養老町	879	706.8	124.4	116.3	132.9	▲▲
		垂井町	629	581.1	108.2	99.9	117.0	▲
		関ケ原町	200	179.6	111.4	96.5	127.9	▲
		神戸町	597	514.3	116.1	107.0	125.8	▲▲
		輪之内町	300	249.9	120.1	106.9	134.5	▲▲
		安八町	426	377.7	112.8	102.3	124.0	▲▲
		揖斐川町	632	574.1	110.1	101.7	119.0	▲▲
		大野町	570	545.0	104.6	96.2	113.5	▲
		池田町	652	560.8	116.3	107.5	125.5	▲▲
中濃圏域	関保健所	関市	1927	1919.1	100.4	96.0	105.0	▲
		美濃市	393	455.6	86.3	77.9	95.2	▽▽
		郡上市	1246	1258.0	99.0	93.6	104.7	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	1126	1168.3	96.4	90.8	102.2	▽
		可児市	2291	2222.8	103.1	98.9	107.4	▲
		坂祝町	196	169.4	115.7	100.1	133.1	▲▲
		富加町	151	128.6	117.4	99.4	137.7	▲
		川辺町	227	241.7	93.9	82.1	107.0	▽
		七宗町	94	101.1	93.0	75.1	113.8	▽
		八百津町	275	273.4	100.6	89.1	113.2	▲
		白川町	170	214.3	79.3	67.9	92.2	▽▽
		東白川村	72	60.3	119.4	93.4	150.4	▲
		御嵩町	482	465.0	103.7	94.6	113.3	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	2464	2747.5	89.7	86.2	93.3	▽▽
		瑞浪市	807	906.8	89.0	83.0	95.4	▽▽
		土岐市	1395	1411.3	98.8	93.7	104.2	▽
	恵那保健所	中津川市	1864	1972.3	94.5	90.3	98.9	▽▽
		恵那市	1201	1266.5	94.8	89.5	100.3	▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	1982	2456.5	80.7	77.2	84.3	▽▽
		飛騨市	664	768.0	86.5	80.0	93.3	▽▽
		下呂市	823	970.4	84.8	79.1	90.8	▽▽
		白川村	59	51.1	115.6	88.0	149.1	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和2年度　男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	26680	25570.3	104.3	103.1	105.6	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	4429	4177.2	106.0	102.9	109.2	▲▲
		各務原市	9559	9366.5	102.1	100.0	104.1	▲▲
		山県市	1705	1619.8	105.3	100.3	110.4	▲▲
		瑞穂市	3489	3465.2	100.7	97.4	104.1	▲
		本巣市	2313	2229.4	103.7	99.6	108.1	▲
		岐南町	1582	1487.8	106.3	101.2	111.7	▲▲
		笠松町	1458	1360.5	107.2	101.7	112.8	▲▲
		北方町	1107	1041.9	106.3	100.1	112.7	▲▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	9718	9519.2	102.1	100.1	104.1	▲▲
		海津市	2401	2252.2	106.6	102.4	111.0	▲▲
		養老町	1971	1847.0	106.7	102.1	111.5	▲▲
		垂井町	1644	1601.2	102.7	97.8	107.8	▲
		関ケ原町	410	422.4	97.1	87.9	106.9	▽
		神戸町	1433	1415.1	101.3	96.1	106.7	▲
		輪之内町	674	632.0	106.6	98.7	115.0	▲
		安八町	1118	1073.0	104.2	98.2	110.5	▲
		揖斐川町	1429	1368.0	104.5	99.1	110.0	▲
		大野町	1472	1398.4	105.3	100.0	110.8	▲
		池田町	1563	1510.3	103.5	98.4	108.7	▲
中濃圏域	関保健所	関市	5466	5361.1	102.0	99.3	104.7	▲
		美濃市	1172	1219.6	96.1	90.7	101.8	▽
		郡上市	2968	3091.5	96.0	92.6	99.5	▽▽
	可茂保健所	美濃加茂市	3393	3343.2	101.5	98.1	105.0	▲
		可児市	6283	6282.5	100.0	97.5	102.5	▲
		坂祝町	592	581.0	101.9	93.8	110.4	▲
		富加町	373	335.1	111.3	100.3	123.2	▲▲
		川辺町	679	709.8	95.7	88.6	103.1	▽
		七宗町	236	237.1	99.6	87.3	113.1	▽
		八百津町	709	721.1	98.3	91.2	105.8	▽
		白川町	443	539.1	82.2	74.7	90.2	▽▽
		東白川村	126	135.8	92.8	77.3	110.5	▽
		御嵩町	1310	1301.9	100.6	95.2	106.2	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	6778	7129.4	95.1	92.8	97.4	▽▽
		瑞浪市	2210	2356.0	93.8	89.9	97.8	▽▽
		土岐市	3532	3859.4	91.5	88.5	94.6	▽▽
	恵那保健所	中津川市	4931	5297.2	93.1	90.5	95.7	▽▽
		恵那市	3028	3302.2	91.7	88.5	95.0	▽▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	5415	6117.5	88.5	86.2	90.9	▽▽
		飛騨市	1664	1907.0	87.3	83.1	91.6	▽▽
		下呂市	1940	2249.2	86.3	82.5	90.2	▽▽
		白川村	154	122.9	125.3	106.3	146.7	▲▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和元年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和元年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和元年度　女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	9361	9596.4	97.5	95.6	99.5	▽▽
	岐阜保健所	羽島市	1715	1464.0	117.1	111.7	122.8	▲▲
		各務原市	3353	3213.8	104.3	100.8	107.9	▲▲
		山県市	702	624.5	112.4	104.3	121.0	▲▲
		瑞穂市	1252	1187.4	105.4	99.7	111.4	▲
		本巣市	860	836.2	102.8	96.1	110.0	▲
		岐南町	498	525.2	94.8	86.7	103.5	▽
		笠松町	576	498.2	115.6	106.4	125.5	▲▲
		北方町	414	406.4	101.9	92.3	112.2	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	3525	3313.9	106.4	102.9	109.9	▲▲
		海津市	867	774.2	112.0	104.7	119.7	▲▲
		養老町	813	678.0	119.9	111.8	128.4	▲▲
		垂井町	612	556.3	110.0	101.5	119.1	▲▲
		関ケ原町	203	184.3	110.1	95.5	126.4	▲
		神戸町	573	476.9	120.1	110.5	130.4	▲▲
		輪之内町	251	218.7	114.8	101.0	129.9	▲▲
		安八町	413	372.6	110.8	100.4	122.1	▲▲
		揖斐川町	663	584.3	113.5	105.0	122.4	▲▲
		大野町	559	524.4	106.6	97.9	115.8	▲
		池田町	588	554.8	106.0	97.6	114.9	▲
中濃圏域	関保健所	関市	1926	1893.7	101.7	97.2	106.3	▲
		美濃市	443	457.1	96.9	88.1	106.4	▽
		郡上市	1200	1213.6	98.9	93.4	104.6	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	1122	1125.6	99.7	93.9	105.7	▽
		可児市	2234	2232.7	100.1	96.0	104.3	▲
		坂祝町	217	205.7	105.5	91.9	120.5	▲
		富加町	137	136.5	100.4	84.3	118.7	▲
		川辺町	236	240.6	98.1	86.0	111.4	▽
		七宗町	88	102.8	85.6	68.7	105.5	▽
		八百津町	291	278.1	104.6	92.9	117.4	▲
		白川町	161	207.7	77.5	66.0	90.5	▽▽
		東白川村	83	58.7	141.3	112.6	175.2	▲▲
		御嵩町	450	444.4	101.3	92.1	111.1	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	2524	2776.8	90.9	87.4	94.5	▽▽
		瑞浪市	812	872.7	93.0	86.8	99.7	▽▽
		土岐市	1363	1355.0	100.6	95.3	106.1	▲
	恵那保健所	中津川市	1826	1955.4	93.4	89.1	97.8	▽▽
		恵那市	1243	1274.0	97.6	92.2	103.1	▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	2036	2516.2	80.9	77.4	84.5	▽▽
		飛騨市	648	753.2	86.0	79.5	92.9	▽▽
		下呂市	812	966.3	84.0	78.4	90.0	▽▽
		白川村	57	49.8	114.4	86.6	148.2	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

肥満該当者（令和元年度　男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	25833	24697.2	104.6	103.3	105.9	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	4268	4061.8	105.1	101.9	108.3	▲▲
		各務原市	9371	9176.9	102.1	100.1	104.2	▲▲
		山県市	1700	1611.4	105.5	100.5	110.6	▲▲
		瑞穂市	3366	3339.0	100.8	97.4	104.3	▲
		本巣市	2377	2278.2	104.3	100.2	108.6	▲▲
		岐南町	1600	1495.8	107.0	101.8	112.3	▲▲
		笠松町	1384	1304.6	106.1	100.6	111.8	▲▲
		北方町	1109	1041.4	106.5	100.3	112.9	▲▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	9680	9432.4	102.6	100.6	104.7	▲▲
		海津市	2324	2202.2	105.5	101.3	109.9	▲▲
		養老町	1994	1832.8	108.8	104.1	113.7	▲▲
		垂井町	1636	1567.4	104.4	99.4	109.6	▲
		関ケ原町	414	426.1	97.1	88.0	107.0	▽
		神戸町	1264	1251.2	101.0	95.5	106.7	▲
		輪之内町	669	611.1	109.5	101.3	118.1	▲▲
		安八町	1085	1013.4	107.1	100.8	113.6	▲▲
		揖斐川町	1526	1415.4	107.8	102.5	113.4	▲▲
		大野町	1469	1397.2	105.1	99.8	110.7	▲
		池田町	1517	1496.4	101.4	96.3	106.6	▲
中濃圏域	関保健所	関市	5487	5378.3	102.0	99.3	104.8	▲
		美濃市	1181	1227.6	96.2	90.8	101.9	▽
		郡上市	2898	3022.5	95.9	92.4	99.4	▽▽
	可茂保健所	美濃加茂市	3458	3412.6	101.3	98.0	104.8	▲
		可児市	6227	6301.9	98.8	96.4	101.3	▽
		坂祝町	725	725.7	99.9	92.8	107.4	▽
		富加町	366	375.8	97.4	87.7	107.9	▽
		川辺町	681	702.4	96.9	89.8	104.5	▽
		七宗町	246	247.0	99.6	87.5	112.8	▽
		八百津町	674	714.4	94.3	87.4	101.7	▽
		白川町	416	496.0	83.9	76.0	92.3	▽▽
		東白川村	120	120.2	99.9	82.8	119.4	▽
		御嵩町	1258	1251.6	100.5	95.0	106.2	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	7045	7349.5	95.9	93.6	98.1	▽▽
		瑞浪市	2201	2337.2	94.2	90.3	98.2	▽▽
		土岐市	3330	3639.7	91.5	88.4	94.7	▽▽
	恵那保健所	中津川市	4875	5251.6	92.8	90.2	95.5	▽▽
		恵那市	3078	3317.0	92.8	89.5	96.1	▽▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	5365	6161.2	87.1	84.8	89.4	▽▽
		飛騨市	1619	1880.7	86.1	81.9	90.4	▽▽
		下呂市	1991	2283.3	87.2	83.4	91.1	▽▽
		白川村	136	115.1	118.1	99.1	139.7	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○高血圧症有病者（予備群含む）の概況

県内の状況を地域別でみると、男性及び女性ともに、県の東部と西部に県全体（基準）と比べて該当者が有意に多い市町村がみられます。一方、男性及び女性ともに、県北部に、県全体（基準）と比べて該当者が有意に少ない市町村がみられます。これらの傾向は、前回までの報告書の結果とも概ね一致しています。

＊高血圧症有病者
　収縮期血圧が 140mmHg 以上、または拡張期血圧が 90mmHg 以上の者、もしくは血圧を下げる薬を服用する者
＊高血圧症予備群（血圧を下げる薬を服用する者を除く）
　①収縮期血圧が 130mmHg 以上 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 90mmHg 未満である者
　②収縮期血圧が 140mmHg 未満、かつ拡張期血圧が 85mmHg 以上 90mmHg 未満である者

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和3年度　高血圧症有病者（予備群含む））



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　高血圧症有病者（予備群含む））



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和元年度　高血圧症有病者（予備群含む））



高血圧症有病者（予備群含む）（令和3年度（男性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和3年度（女性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和3年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	19192	19781.5	97.0	95.7	98.4	▽▽
	岐阜保健所	羽島市	3317	3085.2	107.5	103.9	111.2	▲▲
		各務原市	6792	6722.1	101.0	98.7	103.5	▲
		山県市	1427	1329.5	107.3	101.8	113.1	▲▲
		瑞穂市	2446	2477.1	98.7	94.9	102.7	▽
		本巣市	1635	1705.8	95.9	91.3	100.6	▽
		岐南町	1072	1085.0	98.8	93.0	104.9	▽
		笠松町	1020	1025.1	99.5	93.5	105.8	▽
		北方町	797	811.2	98.3	91.5	105.3	▽
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	7092	6933.1	102.3	99.9	104.7	▲
		海津市	1844	1652.0	111.6	106.6	116.8	▲▲
		養老町	1600	1474.6	108.5	103.3	114.0	▲▲
		垂井町	1280	1198.2	106.8	101.1	112.8	▲▲
		関ケ原町	340	361.6	94.0	84.3	104.6	▽
		神戸町	1146	1059.9	108.1	101.9	114.6	▲▲
		輪之内町	524	496.6	105.5	96.7	115.0	▲
		安八町	781	759.5	102.8	95.7	110.3	▲
		揖斐川町	1340	1216.0	110.2	104.4	116.3	▲▲
		大野町	1144	1099.3	104.1	98.1	110.3	▲
		池田町	1150	1076.5	106.8	100.7	113.2	▲▲
中濃圏域	関保健所	関市	4053	3987.7	101.6	98.5	104.8	▲
		美濃市	933	962.8	96.9	90.8	103.3	▽
		郡上市	2351	2618.3	89.8	86.2	93.5	▽▽
	可茂保健所	美濃加茂市	2342	2326.8	100.7	96.6	104.8	▲
		可児市	4281	4527.4	94.6	91.7	97.4	▽▽
		坂祝町	386	398.3	96.9	87.5	107.1	▽
		富加町	292	300.1	97.3	86.5	109.1	▽
		川辺町	437	493.4	88.6	80.5	97.3	▽▽
		七宗町	239	242.7	98.5	86.4	111.8	▽
		八百津町	579	594.2	97.4	89.7	105.7	▽
		白川町	423	421.8	100.3	91.0	110.3	▲
		東白川村	134	128.7	104.1	87.2	123.3	▲
		御嵩町	968	939.1	103.1	96.7	109.8	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	5658	5710.5	99.1	96.5	101.7	▽
		瑞浪市	2089	1864.4	112.0	107.3	117.0	▲▲
		土岐市	3194	2910.9	109.7	106.0	113.6	▲▲
	恵那保健所	中津川市	4215	3927.0	107.3	104.1	110.6	▲▲
		恵那市	2849	2654.5	107.3	103.4	111.3	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	4317	5105.9	84.5	82.0	87.1	▽▽
		飛騨市	1509	1643.4	91.8	87.2	96.6	▽▽
		下呂市	1918	1970.0	97.4	93.1	101.8	▽
		白川村	77	105.6	72.9	57.6	91.2	▽▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和3年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	28914	29284.0	98.7	97.6	99.9	▽▽
	岐阜保健所	羽島市	5139	4985.6	103.1	100.3	105.9	▲▲
		各務原市	10756	10801.0	99.6	97.7	101.5	▽
		山県市	1974	1915.1	103.1	98.6	107.7	▲
		瑞穂市	3790	3905.3	97.0	94.0	100.2	▽
		本巣市	2500	2590.1	96.5	92.8	100.4	▽
		岐南町	1713	1727.7	99.1	94.5	104.0	▽
		笠松町	1550	1570.3	98.7	93.9	103.7	▽
		北方町	1176	1210.8	97.1	91.7	102.8	▽
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	11315	11149.7	101.5	99.6	103.4	▲
		海津市	2708	2640.7	102.5	98.7	106.5	▲
		養老町	2362	2224.2	106.2	102.0	110.6	▲▲
		垂井町	1913	1827.6	104.7	100.0	109.5	▲▲
		関ケ原町	487	500.4	97.3	88.9	106.4	▽
		神戸町	1783	1768.5	100.8	96.2	105.6	▲
		輪之内町	789	752.4	104.9	97.7	112.4	▲
		安八町	1250	1255.4	99.6	94.1	105.2	▽
		揖斐川町	1716	1607.8	106.7	101.7	111.9	▲▲
		大野町	1694	1638.0	103.4	98.6	108.5	▲
		池田町	1746	1725.0	101.2	96.5	106.1	▲
中濃圏域	関保健所	関市	6321	6239.3	101.3	98.8	103.8	▲
		美濃市	1415	1431.0	98.9	93.8	104.2	▽
		郡上市	3597	3713.8	96.9	93.7	100.1	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	3828	3879.8	98.7	95.6	101.8	▽
		可児市	7246	7330.4	98.8	96.6	101.2	▽
		坂祝町	625	619.5	100.9	93.1	109.1	▲
		富加町	423	437.8	96.6	87.6	106.3	▽
		川辺町	805	836.5	96.2	89.7	103.1	▽
		七宗町	297	308.3	96.3	85.7	107.9	▽
		八百津町	942	884.5	106.5	99.8	113.5	▲
		白川町	640	638.0	100.3	92.7	108.4	▲
		東白川村	148	163.2	90.7	76.6	106.5	▽
		御嵩町	1579	1560.5	101.2	96.3	106.3	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	8423	8516.7	98.9	96.8	101.0	▽
		瑞浪市	2919	2824.6	103.3	99.6	107.2	▲
		土岐市	4795	4632.8	103.5	100.6	106.5	▲▲
	恵那保健所	中津川市	6453	6137.2	105.1	102.6	107.7	▲▲
		恵那市	4108	3936.9	104.3	101.2	107.6	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	6760	7331.8	92.2	90.0	94.4	▽▽
		飛騨市	2330	2285.4	102.0	97.9	106.2	▲
		下呂市	2553	2672.9	95.5	91.8	99.3	▽▽
		白川村	118	139.8	84.4	69.9	101.1	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和2年度（男性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和2年度（女性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和2年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	18862	19145.2	98.5	97.1	99.9	▽▽
	岐阜保健所	羽島市	3029	2810.9	107.8	104.0	111.7	▲▲
		各務原市	6526	6389.6	102.1	99.7	104.6	▲
		山県市	1370	1272.4	107.7	102.0	113.5	▲▲
		瑞穂市	2359	2377.1	99.2	95.3	103.3	▽
		本巣市	1623	1673.8	97.0	92.3	101.8	▽
		岐南町	1022	996.7	102.5	96.3	109.0	▲
		笠松町	997	995.6	100.1	94.0	106.6	▲
		北方町	772	760.0	101.6	94.5	109.0	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	6451	6320.6	102.1	99.6	104.6	▲
		海津市	1802	1606.2	112.2	107.1	117.5	▲▲
		養老町	1526	1401.5	108.9	103.5	114.5	▲▲
		垂井町	1194	1079.3	110.6	104.4	117.1	▲▲
		関ケ原町	373	360.8	103.4	93.2	114.4	▲
		神戸町	1110	1034.4	107.3	101.1	113.8	▲▲
		輪之内町	506	470.2	107.6	98.5	117.4	▲
		安八町	729	727.5	100.2	93.1	107.7	▲
		揖斐川町	1220	1185.6	102.9	97.2	108.8	▲
		大野町	1062	1058.1	100.4	94.4	106.6	▲
		池田町	1104	1055.7	104.6	98.5	110.9	▲
中濃圏域	関保健所	関市	3809	3705.0	102.8	99.6	106.1	▲
		美濃市	857	899.3	95.3	89.0	101.9	▽
		郡上市	2242	2487.8	90.1	86.4	93.9	▽▽
	可茂保健所	美濃加茂市	2052	2132.6	96.2	92.1	100.5	▽
		可児市	3912	4135.9	94.6	91.6	97.6	▽▽
		坂祝町	344	330.5	104.1	93.4	115.7	▲
		富加町	248	246.6	100.5	88.4	113.9	▲
		川辺町	438	468.8	93.4	84.9	102.6	▽
		七宗町	205	211.6	96.9	84.1	111.1	▽
		八百津町	555	563.6	98.5	90.4	107.0	▽
		白川町	419	437.5	95.8	86.8	105.4	▽
		東白川村	134	124.5	107.7	90.2	127.5	▲
		御嵩町	919	912.7	100.7	94.3	107.4	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	5295	5307.8	99.8	97.1	102.5	▽
		瑞浪市	1868	1724.0	108.4	103.5	113.4	▲▲
		土岐市	2914	2683.6	108.6	104.7	112.6	▲▲
	恵那保健所	中津川市	4040	3796.1	106.4	103.2	109.8	▲▲
		恵那市	2638	2497.2	105.6	101.6	109.7	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	3826	4715.2	81.1	78.6	83.8	▽▽
		飛騨市	1412	1561.5	90.4	85.8	95.3	▽▽
		下呂市	1826	1911.6	95.5	91.2	100.0	▽
		白川村	88	103.4	85.1	68.2	104.8	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和2年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	28501	28635.4	99.5	98.4	100.7	▽
	岐阜保健所	羽島市	4810	4666.7	103.1	100.2	106.0	▲▲
		各務原市	10472	10440.0	100.3	98.4	102.2	▲
		山県市	1970	1889.0	104.3	99.7	109.0	▲
		瑞穂市	3740	3813.0	98.1	95.0	101.3	▽
		本巣市	2468	2517.7	98.0	94.2	102.0	▽
		岐南町	1601	1616.2	99.1	94.3	104.0	▽
		笠松町	1513	1519.0	99.6	94.7	104.8	▽
		北方町	1138	1148.7	99.1	93.4	105.0	▽
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	10685	10503.2	101.7	99.8	103.7	▲
		海津市	2682	2597.6	103.2	99.4	107.2	▲
		養老町	2213	2144.5	103.2	98.9	107.6	▲
		垂井町	1859	1766.3	105.2	100.5	110.1	▲▲
		関ケ原町	506	499.5	101.3	92.7	110.5	▲
		神戸町	1650	1606.8	102.7	97.8	107.8	▲
		輪之内町	725	707.1	102.5	95.2	110.3	▲
		安八町	1210	1200.4	100.8	95.2	106.6	▲
		揖斐川町	1662	1613.2	103.0	98.1	108.1	▲
		大野町	1608	1585.3	101.4	96.5	106.5	▲
		池田町	1677	1679.9	99.8	95.1	104.7	▽
中濃圏域	関保健所	関市	6175	6048.3	102.1	99.6	104.7	▲
		美濃市	1379	1408.8	97.9	92.8	103.2	▽
		郡上市	3506	3611.6	97.1	93.9	100.3	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	3649	3679.7	99.2	96.0	102.4	▽
		可児市	6859	6995.1	98.1	95.7	100.4	▽
		坂祝町	690	644.6	107.0	99.2	115.3	▲
		富加町	372	382.5	97.3	87.6	107.7	▽
		川辺町	771	820.8	93.9	87.4	100.8	▽
		七宗町	304	288.4	105.4	93.9	117.9	▲
		八百津町	840	851.0	98.7	92.1	105.6	▽
		白川町	652	658.3	99.0	91.6	107.0	▽
		東白川村	157	162.4	96.7	82.1	113.0	▽
		御嵩町	1516	1491.8	101.6	96.6	106.9	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	7946	8082.1	98.3	96.2	100.5	▽
		瑞浪市	2710	2656.0	102.0	98.2	105.9	▲
		土岐市	4478	4332.1	103.4	100.4	106.4	▲▲
	恵那保健所	中津川市	6183	5963.3	103.7	101.1	106.3	▲▲
		恵那市	4025	3791.7	106.2	102.9	109.5	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	6256	6948.9	90.0	87.8	92.3	▽▽
		飛騨市	2278	2236.1	101.9	97.7	106.1	▲
		下呂市	2375	2603.9	91.2	87.6	95.0	▽▽
		白川村	138	142.2	97.0	81.5	114.6	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和元年度（男性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧症有病者（予備群含む）（令和元年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧有病者（予備群含む）（令和元年度 女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	17552	17747.3	98.9	97.4	100.4	▽
	羽島市	3018	2732.7	110.4	106.5	114.5	▲▲
	各務原市	6158	5988.7	102.8	100.3	105.4	▲▲
	山県市	1262	1212.9	104.0	98.4	109.9	▲
	瑞穂市	2186	2186.4	100.0	95.8	104.3	▽
	本巣市	1555	1602.0	97.1	92.3	102.0	▽
	岐南町	989	959.9	103.0	96.7	109.7	▲
	笠松町	919	926.1	99.2	92.9	105.9	▽
	北方町	759	732.6	103.6	96.4	111.2	▲
西濃圏域	大垣市	6068	5993.6	101.2	98.7	103.8	▲
	海津市	1707	1510.7	113.0	107.7	118.5	▲▲
	養老町	1389	1318.6	105.3	99.9	111.0	▲
	垂井町	1118	1021.7	109.4	103.1	116.0	▲▲
	関ケ原町	344	361.6	95.1	85.3	105.7	▽
	神戸町	1017	934.7	108.8	102.2	115.7	▲▲
	輪之内町	426	407.3	104.6	94.9	115.0	▲
	安八町	732	719.0	101.8	94.6	109.5	▲
	揖斐川町	1187	1183.5	100.3	94.7	106.2	▲
	大野町	1001	1001.3	100.0	93.9	106.4	▽
	池田町	1068	1033.7	103.3	97.2	109.7	▲
中濃圏域	関市	3692	3584.1	103.0	99.7	106.4	▲
	美濃市	822	884.2	93.0	86.7	99.5	▽▽
	美濃加茂市	1945	2000.6	97.2	92.9	101.6	▽
	可児市	3829	4104.2	93.3	90.4	96.3	▽▽
	郡上市	2076	2356.8	88.1	84.3	92.0	▽▽
	坂祝町	391	402.4	97.2	87.8	107.3	▽
	富加町	252	254.5	99.0	87.2	112.0	▽
	川辺町	413	450.8	91.6	83.0	100.9	▽
	七宗町	187	211.5	88.4	76.2	102.0	▽
	八百津町	559	555.8	100.6	92.4	109.3	▲
	白川町	383	414.7	92.4	83.3	102.1	▽
	東白川村	138	121.3	113.8	95.6	134.4	▲
	御嵩町	840	852.2	98.6	92.0	105.5	▽
東濃圏域	多治見市	5223	5297.1	98.6	95.9	101.3	▽
	中津川市	3906	3698.7	105.6	102.3	109.0	▲▲
	瑞浪市	1782	1635.1	109.0	104.0	114.2	▲▲
	恵那市	2657	2451.0	108.4	104.3	112.6	▲▲
	土岐市	2815	2530.8	111.2	107.2	115.4	▲▲
飛騨圏域	高山市	4024	4763.4	84.5	81.9	87.1	▽▽
	飛騨市	1377	1496.3	92.0	87.2	97.0	▽▽
	下呂市	1772	1878.9	94.3	90.0	98.8	▽▽
	白川村	78	97.3	80.1	63.3	100.0	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

高血圧有病者（予備群含む）（令和元年度 男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	26963	27040.4	99.7	98.5	100.9	▽
	羽島市	4573	4439.8	103.0	100.0	106.0	▲▲
	各務原市	9867	10000.1	98.7	96.7	100.6	▽
	山県市	1907	1839.1	103.7	99.1	108.5	▲
	瑞穂市	3472	3581.6	96.9	93.7	100.2	▽
	本巣市	2450	2525.0	97.0	93.2	101.0	▽
	岐南町	1580	1593.6	99.1	94.3	104.2	▽
	笠松町	1413	1421.6	99.4	94.3	104.7	▽
	北方町	1134	1126.3	100.7	94.9	106.7	▲
西濃圏域	大垣市	10488	10225.1	102.6	100.6	104.6	▲▲
	海津市	2485	2485.0	100.0	96.1	104.0	▲
	養老町	2148	2083.6	103.1	98.8	107.5	▲
	垂井町	1793	1696.6	105.7	100.8	110.7	▲▲
	関ケ原町	484	491.2	98.5	90.0	107.7	▽
	神戸町	1430	1405.3	101.8	96.6	107.2	▲
	輪之内町	730	670.6	108.9	101.1	117.1	▲▲
	安八町	1120	1116.0	100.4	94.6	106.4	▲
	揖斐川町	1617	1634.5	98.9	94.2	103.9	▽
	大野町	1546	1551.5	99.6	94.7	104.7	▽
	池田町	1650	1633.9	101.0	96.2	106.0	▲
中濃圏域	関市	6098	5970.2	102.1	99.6	104.7	▲
	美濃市	1358	1389.6	97.7	92.6	103.1	▽
	美濃加茂市	3637	3663.1	99.3	96.1	102.6	▽
	可児市	6733	6894.6	97.7	95.3	100.0	▽
	郡上市	3294	3463.5	95.1	91.9	98.4	▽▽
	坂祝町	764	779.6	98.0	91.2	105.2	▽
	富加町	401	429.2	93.4	84.5	103.0	▽
	川辺町	748	792.2	94.4	87.8	101.4	▽
	七宗町	293	292.7	100.1	89.0	112.2	▲
	八百津町	826	827.1	99.9	93.2	106.9	▽
	白川町	584	597.6	97.7	90.0	106.0	▽
	東白川村	155	143.4	108.1	91.7	126.5	▲
	御嵩町	1427	1415.7	100.8	95.6	106.2	▲
東濃圏域	多治見市	8004	8198.5	97.6	95.5	99.8	▽▽
	中津川市	6170	5828.7	105.9	103.2	108.5	▲▲
	瑞浪市	2667	2584.5	103.2	99.3	107.2	▲
	恵那市	3909	3731.3	104.8	101.5	108.1	▲▲
	土岐市	4212	4023.5	104.7	101.5	107.9	▲▲
飛騨圏域	高山市	6446	6874.3	93.8	91.5	96.1	▽▽
	飛騨市	2189	2157.3	101.5	97.3	105.8	▲
	下呂市	2464	2605.9	94.6	90.9	98.4	▽▽
	白川村	125	130.7	95.6	79.6	113.9	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○糖尿病有病者の概況

県内の状況を地域別でみると、男性及び女性ともに、県の南部に県全体（基準）と比べて該当者が有意に多い市町村がみられます。しかし、各市町村とも該当比は100付近に分布しており、大きな差が比較的少ない状況です。これらの傾向は、前回までの報告書の結果とも概ね一致しています。

＊糖尿病有病者
空腹時血糖126mg/dl以上、またはHbA1c 6.5%以上、もしくはインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者
＊糖尿病予備群
空腹時血糖110mg/dl以上126mg/dl未満、またはHbA1c 6.0%以上6.5%未満の者
ただしインスリン注射または血糖を下げる薬を服用する者を除く

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和3年度　糖尿病有病者（予備群含む））



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　糖尿病有病者（予備群含む））



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和元年度　糖尿病有病者（予備群含む））



糖尿病有病者（予備群含む）（令和3年度（男性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和3年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和3年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	4916	4596.4	107.0	104.0	110.0	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	834	722.9	115.4	107.7	123.5	▲▲
		各務原市	1655	1573.1	105.2	100.2	110.4	▲▲
		山県市	298	317.3	93.9	83.6	105.2	▽
		瑞穂市	569	574.5	99.0	91.1	107.5	▽
		本巣市	400	405.1	98.8	89.3	108.9	▽
		岐南町	214	251.1	85.2	74.2	97.4	▽▽
		笠松町	241	238.7	101.0	88.6	114.5	▲
		北方町	181	185.9	97.4	83.7	112.6	▽
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	1577	1595.5	98.8	94.0	103.8	▽
		海津市	420	397.4	105.7	95.8	116.3	▲
		養老町	370	354.6	104.3	94.0	115.5	▲
		垂井町	289	279.4	103.4	91.8	116.1	▲
		関ケ原町	158	86.3	183.1	155.6	213.9	▲▲
		神戸町	277	255.2	108.6	96.1	122.1	▲
		輪之内町	140	117.0	119.7	100.7	141.3	▲▲
		安八町	204	179.6	113.6	98.6	130.3	▲
		揖斐川町	285	298.6	95.4	84.7	107.2	▽
		大野町	271	260.7	104.0	92.0	117.1	▲
		池田町	229	249.9	91.6	80.2	104.3	▽
中濃圏域	関保健所	関市	978	942.2	103.8	97.4	110.5	▲
		美濃市	235	230.0	102.2	89.5	116.1	▲
		郡上市	656	627.9	104.5	96.6	112.8	▲
	可茂保健所	美濃加茂市	461	532.0	86.6	78.9	94.9	▽▽
		可児市	1111	1049.1	105.9	99.8	112.3	▲
		坂祝町	103	94.3	109.2	89.1	132.4	▲
		富加町	61	70.8	86.2	65.9	110.7	▽
		川辺町	101	116.0	87.1	70.9	105.8	▽
		七宗町	50	59.9	83.4	61.9	110.0	▽
		八百津町	147	144.8	101.5	85.8	119.3	▲
		白川町	87	102.0	85.3	68.3	105.3	▽
		東白川村	26	31.1	83.6	54.6	122.4	▽
		御嵩町	217	223.7	97.0	84.5	110.8	▽
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	1302	1347.5	96.6	91.4	102.0	▽
		瑞浪市	457	437.4	104.5	95.1	114.5	▲
		土岐市	711	682.7	104.1	96.6	112.1	▲
	恵那保健所	中津川市	889	923.1	96.3	90.1	102.8	▽
		恵那市	643	634.0	101.4	93.7	109.6	▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	791	1204.3	65.7	61.2	70.4	▽▽
		飛騨市	337	399.1	84.4	75.7	94.0	▽▽
		下呂市	372	471.4	78.9	71.1	87.4	▽▽
		白川村	25	25.5	97.9	63.3	144.5	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和3年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	10418	9887.0	105.4	103.4	107.4	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	1781	1688.5	105.5	100.6	110.5	▲▲
		各務原市	3651	3639.1	100.3	97.1	103.6	▲
		山県市	669	669.2	100.0	92.5	107.8	▽
		瑞穂市	1314	1296.0	101.4	96.0	107.0	▲
		本巣市	870	884.3	98.4	92.0	105.1	▽
		岐南町	547	569.6	96.0	88.1	104.4	▽
		笠松町	576	529.4	108.8	100.1	118.1	▲▲
		北方町	437	403.7	108.3	98.3	118.9	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	3923	3740.2	104.9	101.6	108.2	▲▲
		海津市	1017	912.9	111.4	104.7	118.5	▲▲
		養老町	814	778.2	104.6	97.5	112.0	▲
		垂井町	652	614.8	106.0	98.1	114.5	▲
		関ケ原町	212	177.2	119.6	104.1	136.9	▲▲
		神戸町	609	602.8	101.0	93.2	109.4	▲
		輪之内町	288	256.2	112.4	99.8	126.2	▲
		安八町	455	426.8	106.6	97.0	116.9	▲
		揖斐川町	561	569.9	98.4	90.5	106.9	▽
		大野町	556	558.1	99.6	91.5	108.3	▽
		池田町	573	580.8	98.7	90.8	107.1	▽
中濃圏域	関保健所	関市	2016	2128.4	94.7	90.6	98.9	▽▽
		美濃市	473	497.9	95.0	86.6	104.0	▽
		郡上市	1301	1313.5	99.0	93.7	104.6	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	1203	1291.5	93.1	88.0	98.6	▽▽
		可児市	2600	2465.5	105.5	101.4	109.6	▲▲
		坂祝町	219	213.4	102.6	89.5	117.2	▲
		富加町	137	152.7	89.7	75.3	106.0	▽
		川辺町	292	290.0	100.7	89.5	112.9	▲
		七宗町	97	112.7	86.1	69.8	105.0	▽
		八百津町	285	313.6	90.9	80.6	102.1	▽
		白川町	202	232.1	87.0	75.4	99.9	▽▽
		東白川村	50	57.7	86.7	64.4	114.3	▽
		御嵩町	534	537.8	99.3	91.1	108.1	▽
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	2816	2920.9	96.4	92.9	100.0	▽
		瑞浪市	890	962.5	92.5	86.5	98.7	▽▽
		土岐市	1511	1571.4	96.2	91.4	101.1	▽
	恵那保健所	中津川市	1935	2085.4	92.8	88.7	97.0	▽▽
		恵那市	1418	1366.0	103.8	98.5	109.4	▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	2133	2525.7	84.5	80.9	88.1	▽▽
		飛騨市	700	808.5	86.6	80.3	93.2	▽▽
		下呂市	842	938.7	89.7	83.7	96.0	▽▽
		白川村	42	48.6	86.3	62.2	116.7	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和2年度（男性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和2年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和２年度 女性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	4732	4498.8	105.2	102.2	108.2	▲▲
	羽島市	735	663.1	110.8	103.0	119.2	▲▲
	各務原市	1594	1507.3	105.8	100.6	111.1	▲▲
	山県市	312	306.0	102.0	91.0	113.9	▲
	瑞穂市	546	558.8	97.7	89.7	106.3	▽
	本巣市	397	401.9	98.8	89.3	109.0	▽
	岐南町	226	232.4	97.3	85.0	110.8	▽
	笠松町	268	234.6	114.2	101.0	128.7	▲▲
	北方町	185	175.2	105.6	90.9	122.0	▲
西濃圏域	大垣市	1345	1458.8	92.2	87.3	97.3	▽▽
	海津市	462	389.3	118.7	108.1	130.0	▲▲
	養老町	367	338.2	108.5	97.7	120.2	▲
	垂井町	237	251.7	94.2	82.5	106.9	▽
	関ケ原町	141	87.6	160.9	135.4	189.7	▲▲
	神戸町	282	251.9	112.0	99.3	125.8	▲
	輪之内町	133	110.8	120.1	100.5	142.3	▲▲
	安八町	182	173.0	105.2	90.5	121.7	▲
	揖斐川町	286	292.2	97.9	86.9	109.9	▽
	大野町	256	252.6	101.3	89.3	114.5	▲
	池田町	205	247.5	82.8	71.9	95.0	▽▽
中濃圏域	関市	958	882.1	108.6	101.8	115.7	▲▲
	美濃市	215	216.2	99.4	86.6	113.6	▽
	美濃加茂市	407	492.7	82.6	74.8	91.0	▽▽
	可児市	1056	963.9	109.6	103.0	116.4	▲▲
	郡上市	625	600.0	104.2	96.2	112.7	▲
	坂祝町	76	78.7	96.6	76.1	120.9	▽
	富加町	65	58.5	111.2	85.8	141.7	▲
	川辺町	107	111.3	96.1	78.8	116.2	▽
	七宗町	46	52.3	87.9	64.4	117.3	▽
	八百津町	133	138.2	96.2	80.6	114.1	▽
	白川町	99	106.8	92.7	75.3	112.8	▽
	東白川村	26	30.3	85.9	56.1	125.8	▽
	御嵩町	219	218.8	100.1	87.3	114.3	▲
東濃圏域	多治見市	1225	1262.9	97.0	91.6	102.6	▽
	中津川市	893	901.1	99.1	92.7	105.8	▽
	瑞浪市	419	406.3	103.1	93.5	113.5	▲
	恵那市	609	601.2	101.3	93.4	109.7	▲
	土岐市	648	635.3	102.0	94.3	110.2	▲
飛騨圏域	高山市	730	1120.7	65.1	60.5	70.0	▽▽
	飛騨市	321	381.4	84.2	75.2	93.9	▽▽
	下呂市	387	459.5	84.2	76.0	93.1	▽▽
	白川村(※)	≦20	－	79.3	48.4	122.6	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い
(※)結果の公表によって特定の個人が第三者に識別されないよう、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第3版）」（令和6年11月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人以下の場合は、該当者数及び期待該当者数は表示しません。

糖尿病有病者（予備群含む）（令和２年度 男性）

圏域	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市	10138	9611.8	105.5	103.4	107.5	▲▲
	羽島市	1650	1560.8	105.7	100.7	110.9	▲▲
	各務原市	3564	3485.1	102.3	98.9	105.7	▲
	山県市	639	658.2	97.1	89.7	104.9	▽
	瑞穂市	1264	1259.4	100.4	94.9	106.1	▲
	本巣市	830	852.6	97.3	90.8	104.2	▽
	岐南町	500	526.4	95.0	86.8	103.7	▽
	笠松町	550	506.6	108.6	99.7	118.0	▲
	北方町	404	378.5	106.7	96.6	117.7	▲
西濃圏域	大垣市	3571	3479.2	102.6	99.3	106.1	▲
	海津市	974	894.5	108.9	102.2	116.0	▲▲
	養老町	779	744.6	104.6	97.4	112.2	▲
	垂井町	604	585.7	103.1	95.1	111.7	▲
	関ケ原町	201	176.2	114.1	98.8	131.0	▲
	神戸町	545	546.0	99.8	91.6	108.6	▽
	輪之内町	272	237.4	114.6	101.4	129.0	▲▲
	安八町	437	402.7	108.5	98.6	119.2	▲
	揖斐川町	549	568.6	96.6	88.6	105.0	▽
	大野町	552	537.7	102.6	94.3	111.6	▲
	池田町	568	561.9	101.1	92.9	109.8	▲
中濃圏域	関市	1975	2043.3	96.7	92.4	101.0	▽
	美濃市	494	485.8	101.7	92.9	111.1	▲
	美濃加茂市	1116	1216.8	91.7	86.4	97.3	▽▽
	可児市	2509	2336.3	107.4	103.2	111.7	▲▲
	郡上市	1289	1261.7	102.2	96.7	107.9	▲
	坂祝町	199	214.2	92.9	80.5	106.8	▽
	富加町	135	130.7	103.3	86.6	122.3	▲
	川辺町	280	284.1	98.6	87.4	110.8	▽
	七宗町	94	104.1	90.3	73.0	110.5	▽
	八百津町	258	298.9	86.3	76.1	97.5	▽▽
	白川町	197	238.0	82.8	71.6	95.2	▽▽
	東白川村	43	56.2	76.6	55.4	103.1	▽
	御嵩町	497	511.3	97.2	88.8	106.1	▽
東濃圏域	多治見市	2664	2747.2	97.0	93.3	100.7	▽
	中津川市	1880	2010.4	93.5	89.3	97.8	▽▽
	瑞浪市	842	899.1	93.7	87.4	100.2	▽
	恵那市	1314	1304.5	100.7	95.4	106.3	▲
	土岐市	1383	1459.9	94.7	89.8	99.9	▽▽
飛騨圏域	高山市	1953	2365.5	82.6	78.9	86.3	▽▽
	飛騨市	681	783.2	86.9	80.5	93.7	▽▽
	下呂市	836	903.1	92.6	86.4	99.1	▽▽
	白川村	47	49.3	95.4	70.1	126.9	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和元年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和元年度（女性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和元年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	4728	4256.3	111.1	107.9	114.3	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	815	659.7	123.5	115.2	132.3	▲▲
		各務原市	1530	1446.5	105.8	100.5	111.2	▲▲
		山県市	318	298.3	106.6	95.2	119.0	▲
		瑞穂市	516	525.8	98.1	89.8	107.0	▽
		本巣市	386	392.2	98.4	88.8	108.7	▽
		岐南町	212	229.0	92.6	80.5	105.9	▽
		笠松町	250	222.7	112.3	98.8	127.1	▲
		北方町	187	173.4	107.8	92.9	124.4	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	1300	1423.5	91.3	86.4	96.4	▽▽
		海津市	370	372.1	99.4	89.5	110.1	▽
		養老町	355	324.6	109.4	98.3	121.4	▲
		垂井町	224	244.7	91.5	79.9	104.4	▽
		関ケ原町	151	89.5	168.8	142.9	197.9	▲▲
		神戸町	250	233.0	107.3	94.4	121.5	▲
		輪之内町	109	98.7	110.5	90.7	133.3	▲
		安八町	192	177.8	108.0	93.3	124.4	▲
		揖斐川町	274	298.3	91.9	81.3	103.4	▽
		大野町	251	245.4	102.3	90.0	115.7	▲
		池田町	218	249.5	87.4	76.2	99.8	▽▽
中濃圏域	関保健所	関市	955	871.8	109.5	102.7	116.7	▲▲
		美濃市	207	216.9	95.5	82.9	109.4	▽
		郡上市	609	581.0	104.8	96.7	113.5	▲
	可茂保健所	美濃加茂市	411	468.6	87.7	79.4	96.6	▽▽
		可児市	851	982.8	86.6	80.9	92.6	▽▽
		坂祝町	112	99.7	112.3	92.5	135.1	▲
		富加町	58	61.5	94.3	71.6	121.9	▽
		川辺町	90	108.2	83.2	66.9	102.2	▽
		七宗町	47	53.3	88.3	64.8	117.4	▽
		八百津町	130	138.3	94.0	78.5	111.6	▽
		白川町	101	103.2	97.9	79.7	119.0	▽
		東白川村	34	30.5	111.3	77.1	155.5	▲
		御嵩町	190	208.2	91.3	78.8	105.2	▽
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	1335	1292.5	103.3	97.8	109.0	▲
		瑞浪市	450	393.7	114.3	104.0	125.4	▲▲
		土岐市	617	612.2	100.8	93.0	109.1	▲
	恵那保健所	中津川市	892	899.8	99.1	92.7	105.9	▽
		恵那市	592	601.4	98.4	90.7	106.7	▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	738	1162.6	63.5	59.0	68.2	▽▽
		飛騨市	274	374.0	73.3	64.8	82.5	▽▽
		下呂市	358	462.7	77.4	69.6	85.8	▽▽
		白川村	21	24.2	86.8	53.7	132.7	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

糖尿病有病者（予備群含む）（令和元年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	9846	9185.5	107.2	105.1	109.3	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	1583	1505.1	105.2	100.1	110.5	▲▲
		各務原市	3416	3375.3	101.2	97.8	104.7	▲
		山県市	656	648.4	101.2	93.6	109.2	▲
		瑞穂市	1230	1193.4	103.1	97.4	109.0	▲
		本巣市	863	868.9	99.3	92.8	106.2	▽
		岐南町	521	528.1	98.7	90.4	107.5	▽
		笠松町	490	480.2	102.0	93.2	111.5	▲
		北方町	396	378.8	104.6	94.5	115.4	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	3519	3443.5	102.2	98.8	105.6	▲
		海津市	929	864.8	107.4	100.6	114.6	▲▲
		養老町	785	731.5	107.3	99.9	115.1	▲
		垂井町	616	570.3	108.0	99.7	116.9	▲
		関ケ原町	220	174.4	126.1	110.0	143.9	▲▲
		神戸町	474	489.3	96.9	88.3	106.0	▽
		輪之内町	247	228.7	108.0	94.9	122.3	▲
		安八町	411	380.9	107.9	97.7	118.8	▲
		揖斐川町	568	581.7	97.6	89.8	106.0	▽
		大野町	528	533.5	99.0	90.7	107.8	▽
		池田町	575	554.5	103.7	95.4	112.5	▲
中濃圏域	関保健所	関市	1983	2050.0	96.7	92.5	101.1	▽
		美濃市	479	486.6	98.4	89.8	107.7	▽
		郡上市	1260	1224.2	102.9	97.3	108.8	▲
	可茂保健所	美濃加茂市	1100	1220.0	90.2	84.9	95.7	▽▽
		可児市	2334	2337.9	99.8	95.8	104.0	▽
		坂祝町	236	260.3	90.7	79.5	103.0	▽
		富加町	136	151.3	89.9	75.4	106.3	▽
		川辺町	257	275.6	93.3	82.2	105.4	▽
		七宗町	81	106.0	76.4	60.7	95.0	▽▽
		八百津町	256	294.4	87.0	76.6	98.3	▽▽
		白川町	194	219.5	88.4	76.4	101.7	▽
		東白川村	56	52.2	107.3	81.1	139.3	▲
		御嵩町	468	494.8	94.6	86.2	103.5	▽
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	2766	2830.3	97.7	94.1	101.4	▽
		瑞浪市	860	885.6	97.1	90.7	103.8	▽
		土岐市	1321	1378.4	95.8	90.7	101.1	▽
	恵那保健所	中津川市	1896	2000.8	94.8	90.5	99.1	▽▽
		恵那市	1394	1299.0	107.3	101.8	113.1	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	1909	2378.6	80.3	76.7	83.9	▽▽
		飛騨市	650	765.0	85.0	78.6	91.8	▽▽
		下呂市	838	917.8	91.3	85.2	97.7	▽▽
		白川村	44	45.9	95.8	69.6	128.6	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○脂質異常症有病者の概況

県内の状況を地域別でみると、男性及び女性ともに、該当者が有意に多い市町村は少なく、県全体としては該当比が 100 付近に分布しており、大きな差が比較的少ない状況です。これらの傾向は、前回までの報告書の結果とも概ね一致しています。

＊脂質異常症有病者
中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満、または LDL コレステロール 140mg/dl 以上、もしくはコレステロールを下げる薬を服用する者

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和3年度　脂質異常症有病者）



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　脂質異常症有病者）



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和元年度　脂質異常症有病者）



脂質異常症有病者（令和3年度（男性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和3年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和3年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	22982	22517.1	102.1	100.7	103.4	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	3586	3493.9	102.6	99.3	106.1	▲
		各務原市	7648	7572.5	101.0	98.7	103.3	▲
		山県市	1525	1493.2	102.1	97.1	107.4	▲
		瑞穂市	2833	2813.5	100.7	97.0	104.5	▲
		本巣市	1833	1916.2	95.7	91.3	100.1	▽
		岐南町	1239	1233.4	100.5	94.9	106.2	▲
		笠松町	1201	1160.3	103.5	97.7	109.5	▲
		北方町	944	932.6	101.2	94.9	107.9	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	7916	7955.4	99.5	97.3	101.7	▽
		海津市	1903	1850.1	102.9	98.3	107.6	▲
		養老町	1626	1658.2	98.1	93.4	102.9	▽
		垂井町	1376	1359.3	101.2	96.0	106.7	▲
		関ケ原町	405	406.4	99.7	90.2	109.9	▽
		神戸町	1180	1177.8	100.2	94.6	106.1	▲
		輪之内町	549	559.6	98.1	90.1	106.7	▽
		安八町	852	853.2	99.9	93.3	106.8	▽
		揖斐川町	1302	1342.6	97.0	91.8	102.4	▽
		大野町	1264	1238.9	102.0	96.5	107.8	▲
		池田町	1182	1229.1	96.2	90.8	101.8	▽
中濃圏域	関保健所	関市	4698	4508.3	104.2	101.2	107.2	▲▲
		美濃市	1146	1087.7	105.4	99.3	111.6	▲
		郡上市	2870	2952.6	97.2	93.7	100.8	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	2676	2677.0	100.0	96.2	103.8	▽
		可児市	5271	5167.1	102.0	99.3	104.8	▲
		坂祝町	443	446.5	99.2	90.2	108.9	▽
		富加町	373	338.8	110.1	99.2	121.9	▲
		川辺町	546	561.9	97.2	89.2	105.7	▽
		七宗町	243	268.0	90.7	79.6	102.8	▽
		八百津町	676	661.1	102.3	94.7	110.3	▲
		白川町	446	477.8	93.3	84.9	102.4	▽
		東白川村	134	145.4	92.2	77.2	109.2	▽
		御嵩町	1022	1059.9	96.4	90.6	102.5	▽
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	6517	6475.6	100.6	98.2	103.1	▲
		瑞浪市	2073	2127.1	97.5	93.3	101.7	▽
		土岐市	3254	3299.5	98.6	95.3	102.1	▽
	恵那保健所	中津川市	4507	4462.7	101.0	98.1	104.0	▲
		恵那市	2939	2949.2	99.7	96.1	103.3	▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	5286	5768.0	91.6	89.2	94.1	▽▽
		飛騨市	1682	1823.3	92.3	87.9	96.8	▽▽
		下呂市	2116	2226.2	95.0	91.0	99.2	▽▽
		白川村	100	117.3	85.3	69.4	103.7	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和3年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	29731	29357.4	101.3	100.1	102.4	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	5145	4981.7	103.3	100.5	106.1	▲▲
		各務原市	10873	10861.9	100.1	98.2	102.0	▲
		山県市	1824	1848.3	98.7	94.2	103.3	▽
		瑞穂市	3965	3994.6	99.3	96.2	102.4	▽
		本巣市	2599	2572.0	101.1	97.2	105.0	▲
		岐南町	1833	1777.0	103.1	98.5	108.0	▲
		笠松町	1630	1575.9	103.4	98.5	108.6	▲
		北方町	1248	1232.1	101.3	95.7	107.1	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	11362	11275.3	100.8	98.9	102.6	▲
		海津市	2539	2569.9	98.8	95.0	102.7	▽
		養老町	2057	2143.8	96.0	91.8	100.2	▽
		垂井町	1844	1844.6	100.0	95.5	104.6	▽
		関ケ原町	489	475.4	102.9	93.9	112.4	▲
		神戸町	1731	1759.6	98.4	93.8	103.1	▽
		輪之内町	717	749.2	95.7	88.8	103.0	▽
		安八町	1258	1251.9	100.5	95.0	106.2	▲
		揖斐川町	1501	1529.9	98.1	93.2	103.2	▽
		大野町	1659	1630.0	101.8	96.9	106.8	▲
		池田町	1726	1740.2	99.2	94.6	104.0	▽
中濃圏域	関保健所	関市	6228	6198.5	100.5	98.0	103.0	▲
		美濃市	1373	1390.8	98.7	93.6	104.1	▽
		郡上市	3566	3548.5	100.5	97.2	103.8	▲
	可茂保健所	美濃加茂市	3971	3955.1	100.4	97.3	103.6	▲
		可児市	7347	7395.9	99.3	97.1	101.6	▽
		坂祝町	583	599.5	97.2	89.5	105.5	▽
		富加町	416	425.1	97.9	88.7	107.7	▽
		川辺町	826	812.7	101.6	94.8	108.8	▲
		七宗町	259	282.5	91.7	80.9	103.6	▽
		八百津町	826	840.5	98.3	91.7	105.2	▽
		白川町	540	587.6	91.9	84.3	100.0	▽▽
		東白川村	133	152.4	87.3	73.1	103.4	▽
		御嵩町	1554	1532.3	101.4	96.4	106.6	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	8470	8399.4	100.8	98.7	103.0	▲
		瑞浪市	2781	2806.8	99.1	95.4	102.8	▽
		土岐市	4598	4636.2	99.2	96.3	102.1	▽
	恵那保健所	中津川市	6066	6110.9	99.3	96.8	101.8	▽
		恵那市	3810	3828.4	99.5	96.4	102.7	▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	6934	7217.5	96.1	93.8	98.4	▽▽
		飛騨市	2075	2178.6	95.2	91.2	99.4	▽▽
		下呂市	2549	2576.7	98.9	95.1	102.8	▽
		白川村	147	136.2	107.9	91.2	126.9	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和2年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

脂質異常症有病者（令和2年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和2年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	22606	22007.6	102.7	101.4	104.1	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	3333	3229.6	103.2	99.7	106.8	▲
		各務原市	7373	7301.5	101.0	98.7	103.3	▲
		山県市	1476	1450.8	101.7	96.6	107.1	▲
		瑞穂市	2753	2725.4	101.0	97.3	104.9	▲
		本巣市	1801	1901.5	94.7	90.4	99.2	▽▽
		岐南町	1109	1149.5	96.5	90.9	102.3	▽
		笠松町	1125	1140.4	98.7	93.0	104.6	▽
		北方町	917	884.5	103.7	97.1	110.6	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	7286	7389.9	98.6	96.3	100.9	▽
		海津市	1906	1823.7	104.5	99.9	109.3	▲
		養老町	1574	1603.2	98.2	93.4	103.2	▽
		垂井町	1249	1253.9	99.6	94.2	105.3	▽
		関ケ原町	409	410.3	99.7	90.3	109.8	▽
		神戸町	1147	1159.2	98.9	93.3	104.8	▽
		輪之内町	552	539.7	102.3	93.9	111.2	▲
		安八町	820	830.3	98.8	92.1	105.8	▽
		揖斐川町	1293	1329.1	97.3	92.1	102.7	▽
		大野町	1217	1211.1	100.5	94.9	106.3	▲
		池田町	1193	1218.8	97.9	92.4	103.6	▽
中濃圏域	関保健所	関市	4390	4251.5	103.3	100.2	106.4	▲▲
		美濃市	1075	1030.7	104.3	98.2	110.7	▲
		郡上市	2824	2854.4	98.9	95.3	102.7	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	2439	2489.5	98.0	94.1	101.9	▽
		可児市	4850	4794.5	101.2	98.3	104.0	▲
		坂祝町	377	378.1	99.7	89.9	110.3	▽
		富加町	317	284.1	111.6	99.6	124.6	▲
		川辺町	519	540.9	95.9	87.9	104.6	▽
		七宗町	243	239.7	101.4	89.0	115.0	▲
		八百津町	627	637.3	98.4	90.8	106.4	▽
		白川町	481	501.7	95.9	87.5	104.8	▽
		東白川村	118	141.1	83.6	69.2	100.1	▽
		御嵩町	1035	1045.2	99.0	93.1	105.2	▽
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	6134	6085.6	100.8	98.3	103.4	▲
		瑞浪市	1935	2000.2	96.7	92.5	101.2	▽
		土岐市	3062	3089.2	99.1	95.6	102.7	▽
	恵那保健所	中津川市	4463	4369.4	102.1	99.2	105.2	▲
		恵那市	2869	2848.2	100.7	97.1	104.5	▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	4878	5405.8	90.2	87.7	92.8	▽▽
		飛騨市	1628	1758.0	92.6	88.2	97.2	▽▽
		下呂市	2110	2195.6	96.1	92.0	100.3	▽
		白川村	105	117.3	89.5	73.2	108.4	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和2年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	29438	29112.7	101.1	100.0	102.3	▲
	岐阜保健所	羽島市	4825	4754.5	101.5	98.6	104.4	▲
		各務原市	10642	10664.7	99.8	97.9	101.7	▽
		山県市	1862	1840.6	101.2	96.6	105.9	▲
		瑞穂市	3893	3947.7	98.6	95.5	101.8	▽
		本巣市	2558	2535.9	100.9	97.0	104.9	▲
		岐南町	1728	1694.8	102.0	97.2	106.9	▲
		笠松町	1571	1548.8	101.4	96.5	106.6	▲
		北方町	1221	1186.7	102.9	97.2	108.8	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	10840	10849.4	99.9	98.0	101.8	▽
		海津市	2548	2561.1	99.5	95.7	103.4	▽
		養老町	2024	2097.3	96.5	92.3	100.8	▽
		垂井町	1784	1825.1	97.7	93.3	102.4	▽
		関ケ原町	481	479.8	100.3	91.5	109.6	▲
		神戸町	1592	1608.2	99.0	94.2	104.0	▽
		輪之内町	671	719.4	93.3	86.3	100.6	▽
		安八町	1234	1222.2	101.0	95.4	106.8	▲
		揖斐川町	1505	1552.4	96.9	92.1	102.0	▽
		大野町	1581	1590.8	99.4	94.5	104.4	▽
		池田町	1695	1720.5	98.5	93.9	103.3	▽
中濃圏域	関保健所	関市	6254	6102.9	102.5	100.0	105.0	▲
		美濃市	1399	1384.6	101.0	95.8	106.5	▲
		郡上市	3578	3512.5	101.9	98.6	105.3	▲
	可茂保健所	美濃加茂市	3838	3810.5	100.7	97.6	104.0	▲
		可児市	7162	7156.2	100.1	97.8	102.4	▲
		坂祝町	668	660.4	101.2	93.6	109.1	▲
		富加町	389	380.0	102.4	92.4	113.1	▲
		川辺町	791	806.8	98.0	91.3	105.1	▽
		七宗町	275	268.6	102.4	90.7	115.2	▲
		八百津町	817	819.2	99.7	93.0	106.8	▽
		白川町	552	610.4	90.4	83.0	98.3	▽▽
		東白川村	124	154.3	80.4	66.9	95.8	▽▽
		御嵩町	1526	1479.9	103.1	98.0	108.4	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	8166	8110.1	100.7	98.5	102.9	▲
		瑞浪市	2736	2681.4	102.0	98.2	105.9	▲
		土岐市	4403	4396.4	100.2	97.2	103.2	▲
	恵那保健所	中津川市	6000	6029.8	99.5	97.0	102.1	▽
		恵那市	3755	3755.6	100.0	96.8	103.2	▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	6606	6959.2	94.9	92.6	97.2	▽▽
		飛騨市	2058	2164.3	95.1	91.0	99.3	▽▽
		下呂市	2521	2557.1	98.6	94.8	102.5	▽
		白川村	141	139.7	100.9	85.0	119.0	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和元年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和元年度（女性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和元年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	21475	20926.3	102.6	101.3	104.0	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	3376	3210.0	105.2	101.7	108.8	▲▲
		各務原市	7089	7002.1	101.2	98.9	103.6	▲
		山県市	1508	1421.6	106.1	100.8	111.6	▲▲
		瑞穂市	2581	2568.8	100.5	96.6	104.4	▲
		本巣市	1794	1868.8	96.0	91.6	100.5	▽
		岐南町	1140	1128.2	101.0	95.3	107.1	▲
		笠松町	1119	1087.6	102.9	96.9	109.1	▲
		北方町	909	873.5	104.1	97.4	111.1	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	6951	7137.4	97.4	95.1	99.7	▽▽
		海津市	1789	1770.5	101.0	96.4	105.8	▲
		養老町	1507	1550.5	97.2	92.3	102.2	▽
		垂井町	1214	1207.5	100.5	95.0	106.4	▲
		関ケ原町	450	424.4	106.0	96.5	116.3	▲
		神戸町	1081	1076.9	100.4	94.5	106.5	▲
		輪之内町	465	476.7	97.5	88.9	106.8	▽
		安八町	816	833.0	98.0	91.3	104.9	▽
		揖斐川町	1324	1364.8	97.0	91.9	102.4	▽
		大野町	1183	1171.8	101.0	95.3	106.9	▲
		池田町	1179	1215.3	97.0	91.6	102.7	▽
中濃圏域	関保健所	関市	4427	4217.4	105.0	101.9	108.1	▲▲
		美濃市	1081	1041.8	103.8	97.7	110.1	▲
		郡上市	2728	2771.6	98.4	94.8	102.2	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	2413	2391.0	100.9	96.9	105.0	▲
		可児市	4775	4856.7	98.3	95.5	101.1	▽
		坂祝町	477	467.8	102.0	93.0	111.5	▲
		富加町	339	301.9	112.3	100.6	124.9	▲▲
		川辺町	547	534.9	102.3	93.9	111.2	▲
		七宗町	237	246.4	96.2	84.3	109.2	▽
		八百津町	644	649.2	99.2	91.7	107.2	▽
		白川町	480	487.2	98.5	89.9	107.7	▽
		東白川村	118	140.9	83.8	69.3	100.3	▽
		御嵩町	1018	1006.2	101.2	95.0	107.6	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	6149	6202.7	99.1	96.7	101.6	▽
		瑞浪市	1966	1936.9	101.5	97.1	106.1	▲
		土岐市	2921	2987.6	97.8	94.3	101.4	▽
	恵那保健所	中津川市	4352	4352.7	100.0	97.0	103.0	▽
		恵那市	2844	2873.1	99.0	95.4	102.7	▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	5147	5579.8	92.2	89.7	94.8	▽▽
		飛騨市	1619	1727.3	93.7	89.2	98.4	▽▽
		下呂市	2080	2205.2	94.3	90.3	98.5	▽▽
		白川村	96	113.5	84.6	68.5	103.3	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

脂質異常症有病者（令和元年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	28319	27825.6	101.8	100.6	103.0	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	4713	4574.7	103.0	100.1	106.0	▲▲
		各務原市	10288	10320.8	99.7	97.8	101.6	▽
		山県市	1863	1815.3	102.6	98.0	107.4	▲
		瑞穂市	3673	3762.4	97.6	94.5	100.8	▽
		本巣市	2582	2565.3	100.7	96.8	104.6	▲
		岐南町	1755	1685.4	104.1	99.3	109.1	▲
		笠松町	1475	1468.8	100.4	95.4	105.7	▲
		北方町	1206	1172.9	102.8	97.1	108.8	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	10499	10632.7	98.7	96.9	100.7	▽
		海津市	2397	2478.3	96.7	92.9	100.7	▽
		養老町	2036	2062.4	98.7	94.5	103.1	▽
		垂井町	1719	1766.8	97.3	92.7	102.0	▽
		関ケ原町	491	479.8	102.3	93.5	111.8	▲
		神戸町	1371	1407.8	97.4	92.3	102.7	▽
		輪之内町	635	689.1	92.1	85.1	99.6	▽▽
		安八町	1143	1141.4	100.1	94.4	106.1	▲
		揖斐川町	1534	1592.6	96.3	91.6	101.3	▽
		大野町	1615	1573.6	102.6	97.7	107.8	▲
		池田町	1658	1687.3	98.3	93.6	103.1	▽
中濃圏域	関保健所	関市	6210	6056.0	102.5	100.0	105.1	▲▲
		美濃市	1399	1380.6	101.3	96.1	106.8	▲
		郡上市	3486	3404.9	102.4	99.0	105.8	▲
	可茂保健所	美濃加茂市	3933	3846.8	102.2	99.1	105.5	▲
		可児市	7092	7094.5	100.0	97.7	102.3	▽
		坂祝町	757	815.8	92.8	86.3	99.7	▽▽
		富加町	433	423.1	102.4	92.9	112.5	▲
		川辺町	781	790.5	98.8	92.0	106.0	▽
		七宗町	294	277.8	105.8	94.1	118.6	▲
		八百津町	803	803.8	99.9	93.1	107.1	▽
		白川町	507	558.2	90.8	83.1	99.1	▽▽
		東白川村	124	135.4	91.6	76.2	109.2	▽
		御嵩町	1470	1406.7	104.5	99.2	110.0	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	8205	8269.3	99.2	97.1	101.4	▽
		瑞浪市	2585	2631.0	98.3	94.5	102.1	▽
		土岐市	4058	4100.2	99.0	95.9	102.1	▽
	恵那保健所	中津川市	5798	5913.7	98.0	95.5	100.6	▽
		恵那市	3732	3734.0	99.9	96.8	103.2	▽
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	6792	6940.1	97.9	95.6	100.2	▽
		飛騨市	2013	2116.2	95.1	91.0	99.4	▽▽
		下呂市	2539	2572.9	98.7	94.9	102.6	▽
		白川村	121	129.5	93.4	77.5	111.6	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。

区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

○習慣的喫煙者の概況

県内の状況を地域別でみると、男性では、県北部から東部にかけて該当者が有意に多い市町村が多くみられます。

女性では、県北部、県東部及び岐阜圏域の一部に該当者の有意に多い地域がみられます。ただし女性の喫煙者の総数は男性と比較して少ないために、地域間差が比較的大きくなる傾向があり、その影響とも考えられます。

これらの傾向は、前回までの報告書の結果とも概ね一致しています。

＊現在、習慣的に喫煙している者
「合計 100 本以上、または 6 ヶ月以上吸っている者」であり、「最近 1 ヶ月間も吸っている者」

各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和3年度　習慣的喫煙者）



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和2年度　習慣的喫煙者）



各市町村の標準化該当比と95%信頼区間（令和元年度　習慣的喫煙者）



習慣的喫煙者（令和3年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

習慣的喫煙者（令和3年度（女性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

習慣的喫煙者（令和3年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	3569	3502.6	101.9	98.6	105.3	▲
	岐阜保健所	羽島市	537	535.3	100.3	92.0	109.2	▲
		各務原市	1008	1161.4	86.8	81.5	92.3	▽▽
		山県市	199	206.9	96.2	83.3	110.5	▽
		瑞穂市	442	453.5	97.5	88.6	107.0	▽
		本巣市	244	276.4	88.3	77.5	100.1	▽
		岐南町	259	198.2	130.7	115.2	147.6	▲▲
		笠松町	202	178.5	113.2	98.1	129.9	▲
		北方町	190	152.6	124.5	107.4	143.5	▲▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	1235	1295.2	95.3	90.1	100.8	▽
		海津市	192	251.3	76.4	66.0	88.0	▽▽
		養老町	220	228.4	96.3	84.0	109.9	▽
		垂井町	179	210.5	85.0	73.0	98.4	▽▽
		関ケ原町	32	56.0	57.2	39.1	80.7	▽▽
		神戸町	135	163.6	82.5	69.2	97.7	▽▽
		輪之内町	93	85.4	108.9	87.9	133.4	▲
		安八町	100	126.7	78.9	64.2	96.0	▽▽
		揖斐川町	157	168.3	93.3	79.3	109.1	▽
		大野町	188	181.4	103.6	89.3	119.5	▲
		池田町	155	193.6	80.1	67.9	93.7	▽▽
中濃圏域	関保健所	関市	639	665.0	96.1	88.8	103.8	▽
		美濃市	140	152.3	91.9	77.3	108.4	▽
		郡上市	371	406.2	91.3	82.3	101.1	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	472	449.8	104.9	95.7	114.9	▲
		可児市	822	823.3	99.8	93.1	106.9	▽
		坂祝町	83	63.8	130.0	103.6	161.2	▲▲
		富加町	50	49.4	101.2	75.1	133.4	▲
		川辺町	79	83.2	94.9	75.2	118.3	▽
		七宗町	36	31.4	114.8	80.4	158.9	▲
		八百津町	64	82.1	77.9	60.0	99.5	▽▽
		白川町	66	62.5	105.6	81.7	134.4	▲
		東白川村(※)	＜20	－	54.7	26.2	100.7	▽
		御嵩町	173	152.6	113.4	97.1	131.6	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	874	952.8	91.7	85.7	98.0	▽▽
		瑞浪市	306	321.9	95.0	84.7	106.3	▽
		土岐市	561	501.5	111.9	102.8	121.5	▲▲
	恵那保健所	中津川市	741	674.5	109.9	102.1	118.1	▲▲
		恵那市	486	423.2	114.8	104.9	125.5	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	1054	865.0	121.8	114.6	129.4	▲▲
		飛騨市	253	240.3	105.3	92.7	119.1	▲
		下呂市	335	309.0	108.4	97.1	120.7	▲
		白川村(※)	＜20	－	118.9	71.6	185.7	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い
（※）結果の公表によって特定の個人が第三者に識別されないよう、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が20人未満の場合は、該当者数及び期待該当者数は表示しません。

習慣的喫煙者（令和3年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	15276	16658.3	91.7	90.3	93.2	▽▽
	岐阜保健所	羽島市	2820	2808.4	100.4	96.7	104.2	▲
		各務原市	5691	6160.0	92.4	90.0	94.8	▽▽
		山県市	1031	999.4	103.2	97.0	109.7	▲
		瑞穂市	2264	2313.2	97.9	93.9	102.0	▽
		本巣市	1470	1435.7	102.4	97.2	107.8	▲
		岐南町	1081	1033.0	104.6	98.5	111.1	▲
		笠松町	830	890.6	93.2	87.0	99.8	▽▽
		北方町	741	711.4	104.2	96.8	111.9	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	6356	6468.4	98.3	95.9	100.7	▽
		海津市	1508	1407.7	107.1	101.8	112.7	▲▲
		養老町	1285	1158.3	110.9	105.0	117.2	▲▲
		垂井町	1077	1054.6	102.1	96.1	108.4	▲
		関ケ原町	262	251.6	104.1	91.9	117.5	▲
		神戸町	960	985.5	97.4	91.3	103.8	▽
		輪之内町	453	419.1	108.1	98.4	118.5	▲
		安八町	735	704.4	104.3	96.9	112.2	▲
		揖斐川町	844	809.4	104.3	97.4	111.6	▲
		大野町	968	917.2	105.5	99.0	112.4	▲
		池田町	1029	997.4	103.2	97.0	109.7	▲
中濃圏域	関保健所	関市	3444	3474.2	99.1	95.8	102.5	▽
		美濃市	736	759.4	96.9	90.0	104.2	▽
		郡上市	2083	1898.0	109.7	105.1	114.6	▲▲
	可茂保健所	美濃加茂市	2280	2285.6	99.8	95.7	103.9	▽
		可児市	4135	4219.4	98.0	95.0	101.0	▽
		坂祝町	355	326.8	108.6	97.6	120.5	▲
		富加町	247	230.9	107.0	94.0	121.2	▲
		川辺町	497	442.5	112.3	102.7	122.6	▲▲
		七宗町	147	141.2	104.1	87.9	122.3	▲
		八百津町	447	444.4	100.6	91.5	110.4	▲
		白川町	322	297.9	108.1	96.6	120.6	▲
		東白川村	92	79.6	115.6	93.2	141.7	▲
		御嵩町	938	845.2	111.0	104.0	118.3	▲▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	4263	4676.9	91.2	88.4	93.9	▽▽
		瑞浪市	1642	1583.7	103.7	98.7	108.8	▲
		土岐市	2731	2629.7	103.9	100.0	107.8	▲
	恵那保健所	中津川市	3904	3447.1	113.3	109.7	116.9	▲▲
		恵那市	2397	2104.5	113.9	109.4	118.6	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	4391	3996.3	109.9	106.6	113.2	▲▲
		飛騨市	1290	1152.4	111.9	105.9	118.2	▲▲
		下呂市	1589	1394.3	114.0	108.4	119.7	▲▲
		白川村	77	74.5	103.4	81.6	129.2	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

習慣的喫煙者（令和2年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

習慣的喫煙者（令和2年度（女性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

習慣的喫煙者（令和2年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	3497	3383.1	103.4	100.0	106.9	▲
	岐阜保健所	羽島市	472	494.2	95.5	87.1	104.5	▽
		各務原市	974	1114.7	87.4	82.0	93.0	▽▽
		山県市	180	197.7	91.1	78.2	105.4	▽
		瑞穂市	421	427.5	98.5	89.3	108.3	▽
		本巣市	238	270.0	88.2	77.3	100.1	▽
		岐南町	231	186.3	124.0	108.5	141.0	▲▲
		笠松町	202	174.0	116.1	100.6	133.2	▲▲
		北方町	185	148.7	124.4	107.2	143.7	▲▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	1201	1229.9	97.7	92.2	103.3	▽
		海津市	204	243.3	83.9	72.7	96.2	▽▽
		養老町	203	220.7	92.0	79.7	105.5	▽
		垂井町	169	202.0	83.7	71.5	97.3	▽▽
		関ケ原町	41	54.7	75.0	53.8	101.7	▽
		神戸町	129	154.9	83.3	69.5	98.9	▽▽
		輪之内町	91	84.5	107.7	86.7	132.2	▲
		安八町	102	123.4	82.6	67.4	100.3	▽
		揖斐川町	162	165.3	98.0	83.5	114.3	▽
		大野町	152	176.1	86.3	73.2	101.2	▽
		池田町	152	190.4	79.8	67.6	93.6	▽▽
中濃圏域	関保健所	関市	618	625.4	98.8	91.2	106.9	▽
		美濃市	132	143.7	91.9	76.9	109.0	▽
		郡上市	358	394.9	90.7	81.5	100.6	▽
	可茂保健所	美濃加茂市	427	415.9	102.7	93.2	112.9	▲
		可児市	761	767.9	99.1	92.2	106.4	▽
		坂祝町	72	54.5	132.2	103.4	166.4	▲▲
		富加町	46	42.8	107.5	78.7	143.4	▲
		川辺町	81	78.5	103.1	81.9	128.2	▲
		七宗町	30	28.7	104.7	70.6	149.4	▲
		八百津町	62	79.3	78.2	60.0	100.3	▽
		白川町	57	64.0	89.1	67.5	115.5	▽
		東白川村(※)	＜20	－	51.4	23.5	97.7	▽▽
		御嵩町	166	147.6	112.4	96.0	130.9	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	828	894.2	92.6	86.4	99.1	▽▽
		瑞浪市	300	304.2	98.6	87.8	110.4	▽
		土岐市	512	472.1	108.5	99.3	118.3	▲
	恵那保健所	中津川市	733	647.4	113.2	105.2	121.7	▲▲
		恵那市	422	399.0	105.8	95.9	116.3	▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	961	807.7	119.0	111.6	126.8	▲▲
		飛騨市	261	227.4	114.8	101.3	129.6	▲▲
		下呂市	321	307.1	104.5	93.4	116.6	▲
		白川村(※)	＜20	－	89.0	48.6	149.3	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い
（※）結果の公表によって特定の個人が第三者に識別されないよう、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が20人未満の場合は、該当者数及び期待該当者数は表示しません。

習慣的喫煙者（令和2年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	15109	16420.4	92.0	90.6	93.5	▽▽
	岐阜保健所	羽島市	2664	2687.3	99.1	95.4	103.0	▽
		各務原市	5604	6033.3	92.9	90.5	95.3	▽▽
		山県市	1013	985.0	102.8	96.6	109.4	▲
		瑞穂市	2211	2266.3	97.6	93.5	101.7	▽
		本巣市	1420	1409.0	100.8	95.6	106.2	▲
		岐南町	1023	987.5	103.6	97.3	110.1	▲
		笠松町	804	872.2	92.2	85.9	98.8	▽▽
		北方町	706	683.0	103.4	95.9	111.3	▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	6120	6249.0	97.9	95.5	100.4	▽
		海津市	1503	1389.4	108.2	102.8	113.8	▲▲
		養老町	1249	1131.3	110.4	104.4	116.7	▲▲
		垂井町	1074	1051.6	102.1	96.1	108.4	▲
		関ケ原町	260	252.0	103.2	91.0	116.5	▲
		神戸町	889	885.3	100.4	93.9	107.2	▲
		輪之内町	439	404.8	108.5	98.5	119.1	▲
		安八町	739	688.9	107.3	99.7	115.3	▲
		揖斐川町	857	815.1	105.1	98.2	112.4	▲
		大野町	915	885.0	103.4	96.8	110.3	▲
		池田町	982	981.0	100.1	93.9	106.6	▲
中濃圏域	関保健所	関市	3417	3410.1	100.2	96.9	103.6	▲
		美濃市	719	750.0	95.9	89.0	103.1	▽
		郡上市	2016	1880.0	107.2	102.6	112.0	▲▲
	可茂保健所	美濃加茂市	2197	2197.6	100.0	95.8	104.2	▽
		可児市	3968	4063.2	97.7	94.6	100.7	▽
		坂祝町	411	375.9	109.3	99.0	120.4	▲
		富加町	223	210.4	106.0	92.5	120.9	▲
		川辺町	500	436.8	114.5	104.7	125.0	▲▲
		七宗町	144	134.7	106.9	90.2	125.9	▲
		八百津町	441	431.1	102.3	93.0	112.3	▲
		白川町	337	305.8	110.2	98.7	122.6	▲
		東白川村	93	80.8	115.2	92.9	141.1	▲
		御嵩町	882	810.4	108.8	101.8	116.3	▲▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	4128	4509.8	91.5	88.8	94.4	▽▽
		瑞浪市	1567	1506.4	104.0	98.9	109.3	▲
		土岐市	2582	2481.7	104.0	100.1	108.1	▲▲
	恵那保健所	中津川市	3814	3384.5	112.7	109.1	116.3	▲▲
		恵那市	2366	2052.2	115.3	110.7	120.0	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	4206	3849.9	109.3	106.0	112.6	▲▲
		飛騨市	1280	1142.3	112.1	106.0	118.4	▲▲
		下呂市	1602	1384.8	115.7	110.1	121.5	▲▲
		白川村	77	75.2	102.3	80.8	127.9	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

習慣的喫煙者（令和元年度（男性））

区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

習慣的喫煙者（令和元年度（女性））



区分
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
- 今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
- 県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

習慣的喫煙者（令和元年度 女性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	3535	3414.2	103.5	100.2	107.0	▲▲
	岐阜保健所	羽島市	479	512.2	93.5	85.3	102.3	▽
		各務原市	984	1126.2	87.4	82.0	93.0	▽▽
		山県市	181	204.8	88.4	76.0	102.2	▽
		瑞穂市	426	424.8	100.3	91.0	110.3	▲
		本巣市	248	279.8	88.6	78.0	100.4	▽
		岐南町	227	189.5	119.8	104.7	136.4	▲▲
		笠松町	183	176.0	104.0	89.5	120.2	▲
		北方町	188	150.3	125.1	107.8	144.3	▲▲
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	1186	1221.6	97.1	91.6	102.8	▽
		海津市	196	252.0	77.8	67.3	89.5	▽▽
		養老町	220	221.8	99.2	86.5	113.2	▽
		垂井町	172	200.2	85.9	73.5	99.8	▽▽
		関ケ原町	37	59.5	62.2	43.8	85.7	▽▽
		神戸町	148	152.7	96.9	81.9	113.9	▽
		輪之内町	68	76.3	89.1	69.2	112.9	▽
		安八町	112	123.1	91.0	74.9	109.5	▽
		揖斐川町	164	176.4	93.0	79.3	108.3	▽
		大野町	158	176.6	89.5	76.1	104.6	▽
		池田町	173	195.2	88.6	75.9	102.9	▽
中濃圏域	関保健所	関市	628	648.2	96.9	89.4	104.8	▽
		美濃市	128	150.9	84.8	70.8	100.9	▽
		郡上市	349	398.5	87.6	78.6	97.3	▽▽
	可茂保健所	美濃加茂市	468	425.4	110.0	100.3	120.4	▲▲
		可児市	778	802.4	97.0	90.3	104.0	▽
		坂祝町	91	66.5	136.9	110.2	168.1	▲▲
		富加町	47	47.9	98.2	72.1	130.6	▽
		川辺町	83	84.3	98.5	78.5	122.1	▽
		七宗町	28	30.2	92.6	61.5	133.8	▽
		八百津町	82	86.6	94.7	75.3	117.5	▽
		白川町	62	65.0	95.4	73.1	122.3	▽
		東白川村(※)	＜20	－	52.8	24.1	100.2	▽
		御嵩町	163	149.3	109.2	93.1	127.3	▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	844	940.7	89.7	83.8	96.0	▽▽
		瑞浪市	302	304.9	99.1	88.2	110.9	▽
		土岐市	534	475.1	112.4	103.1	122.4	▲▲
	恵那保健所	中津川市	728	670.9	108.5	100.8	116.7	▲▲
		恵那市	498	424.8	117.2	107.2	128.0	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	1017	860.6	118.2	111.0	125.7	▲▲
		飛騨市	255	235.8	108.2	95.3	122.3	▲
		下呂市	356	316.9	112.3	101.0	124.6	▲▲
		白川村(※)	＜20	－	99.0	56.6	160.8	▽

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い
（※）結果の公表によって特定の個人が第三者に識別されないよう、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が20人未満の場合は、該当者数及び期待該当者数は表示しません。

習慣的喫煙者（令和元年度 男性）

圏域	保健所	市町村	該当者数	期待者数	標準化該当比	95%信頼区間 下限値	95%信頼区間 上限値	区分
岐阜圏域	岐阜市保健所	岐阜市	15333	16616.3	92.3	90.8	93.7	▽▽
	岐阜保健所	羽島市	2676	2731.5	98.0	94.3	101.8	▽
		各務原市	5765	6180.1	93.3	90.9	95.7	▽▽
		山県市	1030	1033.5	99.7	93.7	105.9	▽
		瑞穂市	2198	2292.2	95.9	91.9	100.0	▽▽
		本巣市	1517	1502.2	101.0	96.0	106.2	▲
		岐南町	1062	1031.0	103.0	96.9	109.4	▲
		笠松町	839	877.3	95.6	89.3	102.3	▽
		北方町	708	710.6	99.6	92.4	107.2	▽
西濃圏域	西濃保健所	大垣市	6359	6442.2	98.7	96.3	101.2	▽
		海津市	1557	1429.0	109.0	103.6	114.5	▲▲
		養老町	1290	1179.5	109.4	103.5	115.5	▲▲
		垂井町	1121	1071.3	104.6	98.6	110.9	▲
		関ケ原町	273	268.0	101.9	90.1	114.7	▲
		神戸町	823	807.4	101.9	95.1	109.1	▲
		輪之内町	436	409.7	106.4	96.7	116.9	▲
		安八町	717	673.8	106.4	98.8	114.5	▲
		揖斐川町	932	886.8	105.1	98.5	112.1	▲
		大野町	947	925.0	102.4	96.0	109.1	▲
		池田町	1047	1012.2	103.4	97.3	109.9	▲
中濃圏域	関保健所	関市	3544	3555.6	99.7	96.4	103.0	▽
		美濃市	753	793.3	94.9	88.3	101.9	▽
		郡上市	2066	1928.7	107.1	102.5	111.8	▲▲
	可茂保健所	美濃加茂市	2391	2357.2	101.4	97.4	105.6	▲
		可児市	4125	4237.5	97.3	94.4	100.4	▽
		坂祝町	561	495.7	113.2	104.0	122.9	▲▲
		富加町	251	239.8	104.7	92.1	118.4	▲
		川辺町	508	456.8	111.2	101.7	121.3	▲▲
		七宗町	160	149.2	107.2	91.3	125.2	▲
		八百津町	445	448.3	99.3	90.3	108.9	▽
		白川町	307	295.2	104.0	92.7	116.3	▲
		東白川村	77	72.6	106.0	83.7	132.5	▲
		御嵩町	881	809.0	108.9	101.8	116.3	▲▲
東濃圏域	東濃保健所	多治見市	4464	4833.3	92.4	89.7	95.1	▽▽
		瑞浪市	1651	1560.3	105.8	100.8	111.0	▲▲
		土岐市	2474	2428.2	101.9	97.9	106.0	▲
	恵那保健所	中津川市	3891	3480.7	111.8	108.3	115.4	▲▲
		恵那市	2448	2162.4	113.2	108.8	117.8	▲▲
飛騨圏域	飛騨保健所	高山市	4413	4044.3	109.1	105.9	112.4	▲▲
		飛騨市	1346	1186.0	113.5	107.5	119.7	▲▲
		下呂市	1687	1461.8	115.4	110.0	121.1	▲▲
		白川村	76	73.6	103.2	81.3	129.2	▲

期待者数は、岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。
標準化該当比は、実際の該当者数を期待者数で除し、これに100を乗じたものである。この値が100より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に100より小さい場合は、該当者の数が県全体（基準）よりも少ないことを示す。さらに標準化該当比の95%信頼区間を算出して、これらのデータを4段階に区分した。
区分：▽▽；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
▽；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
▲；今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
▲▲；県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

（２）　市町村別 標準化該当比の比較



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは平成２４年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない
○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
　　今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある
○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
　　県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。



期待者数は、当該年度における岐阜県全体での該当者出現率から算出した各市町村での予想該当者数である。標準化該当比は、実際の該当者数をこの期待者数で除し、これに 100 を乗じたものである。この値が 100 より大きい場合は、当該市町村における該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも多いことを示す。逆に 100 より小さい場合は、該当者の数が岐阜県全体（基準）よりも少ないことを示す。図中のエラーバーは標準化該当比の 95%信頼区間を示しており、本報告書では、この該当比と 95%信頼区間を基に、これらのデータを以下のように４段階に区分している。なお、「有意」とは、統計学的に信頼性が十分に高いことを表している。

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に少ない

○「標準化該当比<100」かつ「信頼区間の上限>=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が少ないが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限<=100」の時・・・
今回の結果では、県全体（基準）と比べて該当者の数が多いが、変動する可能性がある

○「標準化該当比>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・
県全体（基準）と比べて、該当者の数が有意に多い

同一地域における標準化該当比の経年変化



標準化該当比の経年変化をグラフ化した。ただし、基準となる岐阜県（全体）の該当者出現率が各年で変動した場合、その影響を受けて各市町村の標準化該当比も変動する可能性が考えられる。そのため本グラフでは令和元年度における岐阜県（全体）の該当者出現率を基に、各年度の標準化該当比を算出した。

4　医療保険者別集計

（1）国民健康保険

ア　健診受診者数及び検査項目別平均値

健診受診者数（国民健康保険）

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	人数	2,551	3,658	3,773	3,521	5,024	13,129	25,535	57,191
		割合（%）	4.5	6.4	6.6	6.2	8.8	23.0	44.7	100
	女性	人数	2,476	3,257	3,647	4,108	8,224	18,546	31,687	71,945
		割合（%）	3.4	4.5	5.1	5.7	11.4	25.8	44.0	100
	合計	人数	5,027	6,915	7,420	7,629	13,248	31,675	57,222	129,136
		割合（%）	3.9	5.4	5.8	5.9	10.3	24.5	44.3	100
令和2年度	男性	人数	2,524	3,413	3,275	3,301	4,894	13,251	24,906	55,564
		割合（%）	4.5	6.1	5.9	5.9	8.8	23.9	44.8	100
	女性	人数	2,310	2,963	3,099	3,909	8,035	18,901	30,258	69,475
		割合（%）	3.3	4.3	4.5	5.6	11.6	27.2	43.6	100
	合計	人数	4,834	6,376	6,374	7,210	12,929	32,152	55,164	125,039
		割合（%）	3.9	5.1	5.1	5.8	10.3	25.7	44.1	100
令和元年度	男性	人数	2,868	3,727	3,281	3,511	5,398	15,822	24,861	59,468
		割合（%）	4.8	6.3	5.5	5.9	9.1	26.6	41.8	100
	女性	人数	2,521	3,069	3,216	4,403	9,324	21,796	30,089	74,418
		割合（%）	3.4	4.1	4.3	5.9	12.5	29.3	40.4	100
	合計	人数	5,389	6,796	6,497	7,914	14,722	37,618	54,950	133,886
		割合（%）	4.0	5.1	4.9	5.9	11.0	28.1	41.0	100

検査項目別平均値（国民健康保険）

		令和3年度		令和2年度		令和元年度	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性
BMI	度数	57,186	71,941	55,562	69,471	59,466	74,417
	平均値（kg/m^2）	23.8	22.4	23.7	22.4	23.6	22.3
	標準偏差（kg/m^2）	3.4	3.6	3.3	3.6	3.3	3.5
腹囲	度数	57,179	71,932	55,558	69,467	59,457	74,399
	平均値（cm）	85.8	81.1	85.7	81.3	85.2	81.0
	標準偏差（cm）	9.2	10.0	9.1	9.9	9.0	9.8
収縮期血圧	度数	57,190	71,945	55,563	69,474	59,464	74,413
	平均値（mmHg）	130.2	128.7	130.4	128.7	129.0	126.8
	標準偏差（mmHg）	16.5	17.5	16.4	17.2	16.3	17.1
拡張期血圧	度数	57,189	71,943	55,563	69,473	59,462	74,410
	平均値（mmHg）	77.5	74.4	77.5	74.3	76.8	73.3
	標準偏差（mmHg）	11.1	10.7	11.0	10.6	11.0	10.5
中性脂肪	度数	57,179	71,942	55,558	69,474	59,460	74,416
	平均値（mg/dl）	137.9	111.3	138.4	112.1	136.3	111.4
	標準偏差（mg/dl）	99.1	66.4	98.3	66.2	97.0	66.6
HDL コレステロール	度数	57,182	71,935	55,557	69,470	59,461	74,415
	平均値（mg/dl）	57.8	68.8	57.8	68.8	57.6	67.8
	標準偏差（mg/dl）	15.6	16.9	15.9	16.9	15.5	16.5
LDL コレステロール	度数	57,123	71,894	55,508	69,432	59,374	74,351
	平均値（mg/dl）	117.8	125.1	118.8	126.7	118.3	126.3
	標準偏差（mg/dl）	30.6	30.5	30.5	30.8	30.0	30.2
GOT	度数	57,189	71,943	55,562	69,473	59,463	74,416
	平均値（IU/L）	25.4	23.1	25.3	23.1	25.0	22.9
	標準偏差（IU/L）	13.9	9.5	12.6	9.5	12.3	9.1
GPT	度数	57,189	71,942	55,562	69,474	59,464	74,416
	平均値（IU/L）	25.0	19.4	24.7	19.2	23.9	18.7
	標準偏差（IU/L）	17.6	12.3	17.0	12.9	16.0	11.5
γ-GTP	度数	57,162	71,937	55,543	69,464	59,449	74,413
	平均値（IU/L）	44.6	25.2	45.4	25.2	44.8	24.8
	標準偏差（IU/L）	55.6	26.2	55.4	25.1	55.3	24.6
空腹時血糖	度数	36,084	45,730	33,558	42,294	36,555	46,302
	平均値（mg/dl）	100.3	94.1	100.1	94.0	99.5	93.1
	標準偏差（mg/dl）	21.3	15.7	21.6	16.0	21.3	15.1
HbA1c	度数	56,693	71,321	55,086	68,917	58,990	73,831
	平均値（%）	5.8	5.7	5.8	5.7	5.8	5.7
	標準偏差（%）	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6

イ　検査項目別該当者割合

○メタボリックシンドローム該当者







メタボリックシンドローム該当者の割合（国民健康保険）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	361	664	873	1,021	1,553	4,388	8,719	17,579
			割合（%）	14.2	18.2	23.1	29.0	30.9	33.4	34.2	30.7
		予備群該当	人数	446	709	758	632	898	2,157	4,036	9,636
			割合（%）	17.5	19.4	20.1	17.9	17.9	16.4	15.8	16.9
		非該当	人数	1,744	2,285	2,141	1,868	2,572	6,580	12,774	29,964
			割合（%）	68.4	62.5	56.8	53.1	51.2	50.1	50.0	52.4
		合計	人数	2,551	3,658	3,772	3,521	5,023	13,125	25,529	57,179
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	44	113	191	300	780	2,184	4,246	7,858
			割合（%）	1.8	3.5	5.2	7.3	9.5	11.8	13.4	10.9
		予備群該当	人数	88	144	201	243	470	1,038	1,797	3,981
			割合（%）	3.6	4.4	5.5	5.9	5.7	5.6	5.7	5.5
		非該当	人数	2,343	3,000	3,255	3,565	6,971	15,317	25,642	60,093
			割合（%）	94.7	92.1	89.3	86.8	84.8	82.6	80.9	83.5
		合計	人数	2,475	3,257	3,647	4,108	8,221	18,539	31,685	71,932
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	345	660	804	955	1,528	4,420	8,219	16,931
			割合（%）	13.7	19.3	24.5	28.9	31.2	33.4	33.0	30.5
		予備群該当	人数	501	624	623	590	858	2,268	4,090	9,554
			割合（%）	19.8	18.3	19.0	17.9	17.5	17.1	16.4	17.2
		非該当	人数	1,678	2,128	1,848	1,756	2,508	6,561	12,594	29,073
			割合（%）	66.5	62.4	56.4	53.2	51.2	49.5	50.6	52.3
		合計	人数	2,524	3,412	3,275	3,301	4,894	13,249	24,903	55,558
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	44	93	175	291	759	2,207	3,926	7,495
			割合（%）	1.9	3.1	5.7	7.4	9.4	11.7	13.0	10.8
		予備群該当	人数	86	139	176	236	475	1,111	1,805	4,028
			割合（%）	3.7	4.7	5.7	6.0	5.9	5.9	6.0	5.8
		非該当	人数	2,179	2,731	2,746	3,382	6,801	15,581	24,524	57,944
			割合（%）	94.4	92.2	88.7	86.5	84.6	82.4	81.1	83.4
		合計	人数	2,309	2,963	3,097	3,909	8,035	18,899	30,255	69,467
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	395	637	725	900	1,547	4,935	7,776	16,915
			割合（%）	13.8	17.1	22.1	25.6	28.7	31.2	31.3	28.4
		予備群該当	人数	515	714	624	638	910	2,656	3,967	10,024
			割合（%）	18.0	19.2	19.0	18.2	16.9	16.8	16.0	16.9
		非該当	人数	1,957	2,376	1,930	1,973	2,940	8,229	13,113	32,518
			割合（%）	68.3	63.8	58.9	56.2	54.5	52.0	52.8	54.7
		合計	人数	2,867	3,727	3,279	3,511	5,397	15,820	24,856	59,457
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	40	100	166	301	837	2,254	3,786	7,484
			割合（%）	1.6	3.3	5.2	6.8	9.0	10.3	12.6	10.1
		予備群該当	人数	92	121	172	258	523	1,287	1,719	4,172
			割合（%）	3.7	3.9	5.4	5.9	5.6	5.9	5.7	5.6
		非該当	人数	2,387	2,847	2,875	3,844	7,964	18,249	24,577	62,743
			割合（%）	94.8	92.8	89.5	87.3	85.4	83.7	81.7	84.3
		合計	人数	2,519	3,068	3,213	4,403	9,324	21,790	30,082	74,399
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○肥満該当者


令和3年度（国民健康保険）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 合計
年齢
肥満該当者判定 ■腹囲が基準以上かつBMIが25以上 □腹囲のみ基準以上 □BMIのみ25以上


令和2年度（国民健康保険）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 合計
年齢
肥満該当者判定 ■腹囲が基準以上かつBMIが25以上 □腹囲のみ基準以上 □BMIのみ25以上


令和元年度（国民健康保険）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 合計
年齢
肥満該当者判定 ■腹囲が基準以上かつBMIが25以上 □腹囲のみ基準以上 □BMIのみ25以上

肥満該当者の割合(国民健康保険)

					年代別						合計
					40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	104	140	112	93	101	558	1,108
				割合(%)	4.1	3.8	3.0	2.6	2.0	1.4	1.9
			腹囲のみ基準以上	人数	252	468	553	618	1,011	10,066	12,968
				割合(%)	9.9	12.8	14.7	17.6	20.1	26.0	22.7
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	838	1,274	1,406	1,257	1,679	10,642	17,096
				割合(%)	32.9	34.8	37.3	35.7	33.4	27.5	29.9
		非該当		人数	1,356	1,775	1,701	1,553	2,230	17,388	26,003
				割合(%)	53.2	48.5	45.1	44.1	44.4	45.0	45.5
		合計		人数	2,550	3,657	3,772	3,521	5,021	38,654	57,175
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	204	276	300	256	546	3,451	5,033
				割合(%)	8.2	8.5	8.2	6.2	6.6	6.9	7.0
			腹囲のみ基準以上	人数	23	37	51	126	303	2,908	3,448
				割合(%)	0.9	1.1	1.4	3.1	3.7	5.8	4.8
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	222	359	439	534	1,112	6,970	9,636
				割合(%)	9.0	11.0	12.0	13.0	13.5	13.9	13.4
		非該当		人数	2,026	2,585	2,857	3,192	6,260	36,892	53,812
				割合(%)	81.9	79.4	78.3	77.7	76.1	73.5	74.8
		合計		人数	2,475	3,257	3,647	4,108	8,221	50,221	71,929
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	107	114	77	86	85	580	1,049
				割合(%)	4.2	3.3	2.4	2.6	1.7	1.5	1.9
			腹囲のみ基準以上	人数	300	436	496	578	1,052	9,916	12,778
				割合(%)	11.9	12.8	15.1	17.5	21.5	26.0	23.0
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	810	1,211	1,215	1,186	1,573	10,433	16,428
				割合(%)	32.1	35.5	37.1	35.9	32.1	27.3	29.6
		非該当		人数	1,306	1,651	1,487	1,451	2,184	17,222	25,301
				割合(%)	51.8	48.4	45.4	44.0	44.6	45.1	45.5
		合計		人数	2,523	3,412	3,275	3,301	4,894	38,151	55,556
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	183	245	249	248	582	3,431	4,938
				割合(%)	7.9	8.3	8.0	6.3	7.2	7.0	7.1
			腹囲のみ基準以上	人数	16	45	51	119	328	2,937	3,496
				割合(%)	0.7	1.5	1.6	3.0	4.1	6.0	5.0
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	196	302	408	501	1,065	6,769	9,241
				割合(%)	8.5	10.2	13.2	12.8	13.3	13.8	13.3
		非該当		人数	1,914	2,371	2,389	3,041	6,060	36,014	51,789
				割合(%)	82.9	80.0	77.1	77.8	75.4	73.3	74.6
		合計		人数	2,309	2,963	3,097	3,909	8,035	49,151	69,464
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	125	120	90	88	114	619	1,156
				割合(%)	4.4	3.2	2.7	2.5	2.1	1.5	1.9
			腹囲のみ基準以上	人数	349	481	490	599	1,120	10,397	13,436
				割合(%)	12.2	12.9	14.9	17.1	20.8	25.6	22.6
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	903	1,227	1,148	1,183	1,613	10,494	16,568
				割合(%)	31.5	32.9	35.0	33.7	29.9	25.8	27.9
		非該当		人数	1,490	1,899	1,551	1,641	2,550	19,166	28,297
				割合(%)	52.0	51.0	47.3	46.7	47.2	47.1	47.6
		合計		人数	2,867	3,727	3,279	3,511	5,397	40,676	59,457
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	213	261	253	297	632	3,547	5,203
				割合(%)	8.5	8.5	7.9	6.7	6.8	6.8	7.0
			腹囲のみ基準以上	人数	18	37	65	125	379	2,928	3,552
				割合(%)	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.6	4.8
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	224	294	389	554	1,200	6,858	9,519
				割合(%)	8.9	9.6	12.1	12.6	12.9	13.2	12.8
		非該当		人数	2,064	2,476	2,506	3,427	7,113	38,538	56,124
				割合(%)	81.9	80.7	78.0	77.8	76.3	74.3	75.4
		合計		人数	2,519	3,068	3,213	4,403	9,324	51,871	74,398
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第２版)」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、ここでは65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

○高血圧症有病者

令和3年度(国民健康保険)
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
15.3
17.7
16.9
25.6
15.1
36.0
15.5
46.2
13.4
54.5
12.9
59.7
11.8
64.9
13.1
55.1
8.4
7.3
10.5
13.4
12.1
22.7
13.8
29.8
14.3
37.6
15.0
47.9
14.1
58.4
13.9
46.1
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

令和2年度(国民健康保険)
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
15.7
18.7
16.8
27.2
16.5
35.7
15.3
45.2
14.6
53.4
12.6
59.8
11.8
64.7
13.2
55.3
7.7
7.6
10.3
13.1
12.6
22.4
13.1
30.3
14.2
38.0
15.0
48.4
14.1
57.7
13.8
46.2
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

令和元年度(国民健康保険)
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
15.8
17.6
15.7
25.4
14.4
34.1
14.5
43.6
14.3
50.4
12.6
56.9
11.4
62.3
12.8
52.6
7.1
6.8
9.5
11.9
11.8
20.3
12.2
28.3
13.8
35.2
14.2
45.0
13.1
55.2
13.1
43.2
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

高血圧症有病者の割合（国民健康保険）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	452	936	1,359	1,627	2,740	7,840	16,575	31,529
			割合（%）	17.7	25.6	36.0	46.2	54.5	59.7	64.9	55.1
		予備群該当	人数	390	618	569	545	675	1,690	3,014	7,501
			割合（%）	15.3	16.9	15.1	15.5	13.4	12.9	11.8	13.1
		非該当	人数	1,709	2,104	1,845	1,349	1,609	3,599	5,945	18,160
			割合（%）	67.0	57.5	48.9	38.3	32.0	27.4	23.3	31.8
		合計	人数	2,551	3,658	3,773	3,521	5,024	13,129	25,534	57,190
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	181	437	828	1,226	3,093	8,889	18,520	33,174
			割合（%）	7.3	13.4	22.7	29.8	37.6	47.9	58.4	46.1
		予備群該当	人数	207	342	440	565	1,174	2,790	4,470	9,988
			割合（%）	8.4	10.5	12.1	13.8	14.3	15.0	14.1	13.9
		非該当	人数	2,088	2,478	2,379	2,317	3,957	6,867	8,697	28,783
			割合（%）	84.3	76.1	65.2	56.4	48.1	37.0	27.4	40.0
		合計	人数	2,476	3,257	3,647	4,108	8,224	18,546	31,687	71,945
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	472	930	1,170	1,491	2,612	7,930	16,112	30,717
			割合（%）	18.7	27.2	35.7	45.2	53.4	59.8	64.7	55.3
		予備群該当	人数	397	574	542	505	715	1,674	2,935	7,342
			割合（%）	15.7	16.8	16.5	15.3	14.6	12.6	11.8	13.2
		非該当	人数	1,655	1,909	1,563	1,305	1,567	3,647	5,858	17,504
			割合（%）	65.6	55.9	47.7	39.5	32.0	27.5	23.5	31.5
		合計	人数	2,524	3,413	3,275	3,301	4,894	13,251	24,905	55,563
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	176	389	694	1,185	3,057	9,156	17,458	32,115
			割合（%）	7.6	13.1	22.4	30.3	38.0	48.4	57.7	46.2
		予備群該当	人数	177	306	391	511	1,142	2,827	4,268	9,622
			割合（%）	7.7	10.3	12.6	13.1	14.2	15.0	14.1	13.8
		非該当	人数	1,957	2,268	2,014	2,213	3,836	6,918	8,532	27,738
			割合（%）	84.7	76.5	65.0	56.6	47.7	36.6	28.2	39.9
		合計	人数	2,310	2,963	3,099	3,909	8,035	18,901	30,258	69,475
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	504	948	1,118	1,532	2,720	9,002	15,476	31,300
			割合（%）	17.6	25.4	34.1	43.6	50.4	56.9	62.3	52.6
		予備群該当	人数	454	587	471	509	770	1,987	2,823	7,601
			割合（%）	15.8	15.7	14.4	14.5	14.3	12.6	11.4	12.8
		非該当	人数	1,910	2,192	1,692	1,470	1,907	4,833	6,561	20,565
			割合（%）	66.6	58.8	51.6	41.9	35.3	30.5	26.4	34.6
		合計	人数	2,868	3,727	3,281	3,511	5,397	15,822	24,860	59,466
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	171	365	652	1,246	3,286	9,805	16,606	32,131
			割合（%）	6.8	11.9	20.3	28.3	35.2	45.0	55.2	43.2
		予備群該当	人数	179	290	378	537	1,283	3,104	3,956	9,727
			割合（%）	7.1	9.5	11.8	12.2	13.8	14.2	13.1	13.1
		非該当	人数	2,171	2,413	2,186	2,620	4,755	8,886	9,525	32,556
			割合（%）	86.1	78.7	68.0	59.5	51.0	40.8	31.7	43.7
		合計	人数	2,521	3,068	3,216	4,403	9,324	21,795	30,087	74,414
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○糖尿病有病者

令和3年度（国民健康保険）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
2.8
3.8
4.6
5.9
5.4
9.0
7.3
12.1
9.4
15.5
9.8
17.9
10.3
20.5
8.9
16.5
1.1
1.7
1.4
2.9
2.6
3.2
4.4
4.8
5.0
7.2
7.1
9.2
8.3
11.7
6.6
9.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

令和2年度（国民健康保険）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.0
4.1
3.5
6.1
5.3
9.3
7.5
11.6
8.4
15.5
9.5
18.0
10.0
20.2
8.6
16.5
1.1
1.5
1.5
2.2
2.5
3.6
4.3
5.0
5.6
7.0
6.9
9.2
8.1
11.6
6.5
9.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

令和元年度（国民健康保険）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
2.7
3.6
4.3
5.6
5.3
8.3
6.6
11.1
8.2
14.6
9.4
17.4
10.2
19.7
8.6
15.8
0.8
1.3
1.5
2.5
3.1
2.7
4.5
4.8
5.5
6.9
6.9
8.8
8.1
11.3
6.5
8.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

糖尿病有病者の割合（国民健康保険）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	97	217	338	426	778	2,351	5,227	9,434
			割合（%）	3.8	5.9	9.0	12.1	15.5	17.9	20.5	16.5
		予備群該当	人数	72	168	203	258	471	1,288	2,632	5,092
			割合（%）	2.8	4.6	5.4	7.3	9.4	9.8	10.3	8.9
		非該当	人数	2,380	3,268	3,226	2,833	3,769	9,471	17,648	42,595
			割合（%）	93.4	89.5	85.6	80.6	75.1	72.2	69.2	74.6
		合計	人数	2,549	3,653	3,767	3,517	5,018	13,110	25,507	57,121
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	42	95	118	197	595	1,705	3,700	6,452
			割合（%）	1.7	2.9	3.2	4.8	7.2	9.2	11.7	9.0
		予備群該当	人数	28	46	93	179	411	1,313	2,640	4,710
			割合（%）	1.1	1.4	2.6	4.4	5.0	7.1	8.3	6.6
		非該当	人数	2,401	3,111	3,431	3,722	7,210	15,504	25,294	60,673
			割合（%）	97.2	95.7	94.2	90.8	87.8	83.7	80.0	84.5
		合計	人数	2,471	3,252	3,642	4,098	8,216	18,522	31,634	71,835
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	102	208	304	381	759	2,385	5,016	9,155
			割合（%）	4.1	6.1	9.3	11.6	15.5	18.0	20.2	16.5
		予備群該当	人数	75	120	172	248	412	1,252	2,477	4,756
			割合（%）	3.0	3.5	5.3	7.5	8.4	9.5	10.0	8.6
		非該当	人数	2,338	3,081	2,793	2,664	3,714	9,596	17,380	41,566
			割合（%）	93.0	90.4	85.4	80.9	76.0	72.5	69.9	74.9
		合計	人数	2,515	3,409	3,269	3,293	4,885	13,233	24,873	55,477
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	34	64	113	195	565	1,742	3,517	6,230
			割合（%）	1.5	2.2	3.6	5.0	7.0	9.2	11.6	9.0
		予備群該当	人数	25	44	77	167	446	1,298	2,459	4,516
			割合（%）	1.1	1.5	2.5	4.3	5.6	6.9	8.1	6.5
		非該当	人数	2,246	2,850	2,906	3,535	7,012	15,840	24,260	58,649
			割合（%）	97.4	96.3	93.9	90.7	87.4	83.9	80.2	84.5
		合計	人数	2,305	2,958	3,096	3,897	8,023	18,880	30,236	69,395
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	104	207	273	390	787	2,756	4,881	9,398
			割合（%）	3.6	5.6	8.3	11.1	14.6	17.4	19.7	15.8
		予備群該当	人数	78	159	172	231	444	1,491	2,526	5,101
			割合（%）	2.7	4.3	5.3	6.6	8.2	9.4	10.2	8.6
		非該当	人数	2,683	3,349	2,831	2,885	4,156	11,562	17,430	44,896
			割合（%）	93.6	90.1	86.4	82.3	77.1	73.1	70.2	75.6
		合計	人数	2,865	3,715	3,276	3,506	5,387	15,809	24,837	59,395
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	33	78	87	209	647	1,917	3,397	6,368
			割合（%）	1.3	2.5	2.7	4.8	6.9	8.8	11.3	8.6
		予備群該当	人数	21	47	98	197	510	1,501	2,435	4,809
			割合（%）	0.8	1.5	3.1	4.5	5.5	6.9	8.1	6.5
		非該当	人数	2,463	2,936	3,028	3,994	8,154	18,358	24,234	63,167
			割合（%）	97.9	95.9	94.2	90.8	87.6	84.3	80.6	85.0
		合計	人数	2,517	3,061	3,213	4,400	9,311	21,776	30,066	74,344
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○脂質異常症有病者


令和3年度（国民健康保険）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
52.4
56.1
59.7
60.7
61.7
62.3
60.3
60.2
23.0
29.5
44.8
56.9
64.1
68.0
69.7
63.2
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当

令和2年度（国民健康保険）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
54.2
58.0
60.3
61.9
62.5
62.6
60.6
60.8
23.2
29.9
43.5
57.6
65.3
69.5
70.5
64.4
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和元年度（国民健康保険）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
50.7
55.9
57.6
60.7
59.7
60.8
58.7
58.9
20.1
28.9
43.0
57.6
63.2
67.0
68.8
62.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当

脂質異常症有病者の割合（国民健康保険）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	1,337	2,051	2,251	2,136	3,099	8,179	15,385	34,438
			割合（%）	52.4	56.1	59.7	60.7	61.7	62.3	60.3	60.2
		非該当	人数	1,214	1,607	1,521	1,385	1,923	4,945	10,136	22,731
			割合（%）	47.6	43.9	40.3	39.3	38.3	37.7	39.7	39.8
		合計	人数	2,551	3,658	3,772	3,521	5,022	13,124	25,521	57,169
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	569	959	1,635	2,338	5,270	12,609	22,069	45,449
			割合（%）	23.0	29.5	44.8	56.9	64.1	68.0	69.7	63.2
		非該当	人数	1,907	2,297	2,012	1,769	2,953	5,932	9,606	26,476
			割合（%）	77.0	70.5	55.2	43.1	35.9	32.0	30.3	36.8
		合計	人数	2,476	3,256	3,647	4,107	8,223	18,541	31,675	71,925
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	1,369	1,980	1,974	2,041	3,058	8,295	15,075	33,792
			割合（%）	54.2	58.0	60.3	61.9	62.5	62.6	60.6	60.8
		非該当	人数	1,155	1,432	1,298	1,258	1,834	4,953	9,816	21,746
			割合（%）	45.8	42.0	39.7	38.1	37.5	37.4	39.4	39.2
		合計	人数	2,524	3,412	3,272	3,299	4,892	13,248	24,891	55,538
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	535	886	1,349	2,253	5,241	13,143	21,341	44,748
			割合（%）	23.2	29.9	43.5	57.6	65.3	69.5	70.5	64.4
		非該当	人数	1,775	2,077	1,750	1,656	2,791	5,755	8,909	24,713
			割合（%）	76.8	70.1	56.5	42.4	34.7	30.5	29.5	35.6
		合計	人数	2,310	2,963	3,099	3,909	8,032	18,898	30,250	69,461
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	1,454	2,084	1,888	2,129	3,224	9,620	14,581	34,980
			割合（%）	50.7	55.9	57.6	60.7	59.7	60.8	58.7	58.9
		非該当	人数	1,414	1,643	1,392	1,381	2,173	6,194	10,260	24,457
			割合（%）	49.3	44.1	42.4	39.3	40.3	39.2	41.3	41.1
		合計	人数	2,868	3,727	3,280	3,510	5,397	15,814	24,841	59,437
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	506	885	1,384	2,537	5,890	14,604	20,689	46,495
			割合（%）	20.1	28.9	43.0	57.6	63.2	67.0	68.8	62.5
		非該当	人数	2,015	2,182	1,832	1,865	3,430	7,183	9,388	27,895
			割合（%）	79.9	71.1	57.0	42.4	36.8	33.0	31.2	37.5
		合計	人数	2,521	3,067	3,216	4,402	9,320	21,787	30,077	74,390
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○習慣的喫煙者


令和3年度(国民健康保険)
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
40.3
37.2
32.9
29.5
27.3
18.7
23.2
10.3
11.3
9.8
7.9
5.4
3.1
4.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者


令和2年度(国民健康保険)
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
39.3
37.7
34.1
29.1
27.6
18.5
23.0
11.5
11.8
9.4
7.6
5.1
3.0
4.4
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者


令和元年度(国民健康保険)
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
39.1
36.1
33.9
29.5
27.8
19.4
23.6
12.2
11.7
10.4
7.9
4.6
3.1
4.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者

習慣的喫煙者の割合（国民健康保険）

				年代別						合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	喫煙者	人数	1,027	1,361	1,240	1,039	1,370	7,241	13,278
			割合（%）	40.3	37.2	32.9	29.5	27.3	18.7	23.2
		非喫煙者	人数	1,524	2,297	2,533	2,482	3,654	31,423	43,913
			割合（%）	59.7	62.8	67.1	70.5	72.7	81.3	76.8
		合計	人数	2,551	3,658	3,773	3,521	5,024	38,664	57,191
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	256	367	359	325	447	1,539	3,293
			割合（%）	10.3	11.3	9.8	7.9	5.4	3.1	4.6
		非喫煙者	人数	2,220	2,890	3,288	3,783	7,777	48,694	68,652
			割合（%）	89.7	88.7	90.2	92.1	94.6	96.9	95.4
		合計	人数	2,476	3,257	3,647	4,108	8,224	50,233	71,945
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	喫煙者	人数	993	1,286	1,117	959	1,349	7,057	12,761
			割合（%）	39.3	37.7	34.1	29.1	27.6	18.5	23.0
		非喫煙者	人数	1,531	2,127	2,158	2,342	3,545	31,100	42,803
			割合（%）	60.7	62.3	65.9	70.9	72.4	81.5	77.0
		合計	人数	2,524	3,413	3,275	3,301	4,894	38,157	55,564
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	265	350	292	297	411	1,476	3,091
			割合（%）	11.5	11.8	9.4	7.6	5.1	3.0	4.4
		非喫煙者	人数	2,045	2,613	2,807	3,612	7,624	47,683	66,384
			割合（%）	88.5	88.2	90.6	92.4	94.9	97.0	95.6
		合計	人数	2,310	2,963	3,099	3,909	8,035	49,159	69,475
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	喫煙者	人数	1,120	1,346	1,110	1,034	1,503	7,902	14,015
			割合（%）	39.1	36.1	33.9	29.5	27.8	19.4	23.6
		非喫煙者	人数	1,748	2,381	2,169	2,477	3,895	32,773	45,443
			割合（%）	60.9	63.9	66.1	70.5	72.2	80.6	76.4
		合計	人数	2,868	3,727	3,279	3,511	5,398	40,675	59,458
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	308	360	335	350	428	1,603	3,384
			割合（%）	12.2	11.7	10.4	7.9	4.6	3.1	4.5
		非喫煙者	人数	2,213	2,709	2,881	4,053	8,895	50,278	71,029
			割合（%）	87.8	88.3	89.6	92.1	95.4	96.9	95.5
		合計	人数	2,521	3,069	3,216	4,403	9,323	51,881	74,413
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第２版）」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、ここでは65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

（２）協会けんぽ（全国健康保険協会岐阜支部）

ア　健診受診者及び検査項目別平均値

健診受診者数（協会けんぽ）

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	人数	21,684	26,633	24,384	19,531	17,454	11,621	5,967	127,274
		割合（%）	17.0	20.9	19.2	15.4	13.7	9.1	4.7	100
	女性	人数	14,574	19,100	18,951	16,767	14,434	8,103	4,249	96,178
		割合（%）	15.2	19.9	19.7	17.4	15.0	8.4	4.4	100
	合計	人数	36,258	45,733	43,335	36,298	31,888	19,724	10,216	223,452
		割合（%）	16.2	20.5	19.4	16.2	14.3	8.8	4.6	100
令和2年度	男性	人数	21,486	25,654	21,485	18,853	16,297	10,626	5,196	119,597
		割合（%）	18.0	21.5	18.0	15.8	13.6	8.9	4.3	100
	女性	人数	14,063	18,152	16,880	15,928	12,985	7,191	3,672	88,871
		割合（%）	15.8	20.4	19.0	17.9	14.6	8.1	4.1	100
	合計	人数	35,549	43,806	38,365	34,781	29,282	17,817	8,868	208,468
		割合（%）	17.1	21.0	18.4	16.7	14.1	8.6	4.3	100
令和元年度	男性	人数	21,966	25,037	20,003	18,159	15,929	10,447	4,686	116,227
		割合（%）	18.9	21.5	17.2	15.6	13.7	9.0	4.0	100
	女性	人数	13,986	17,450	16,236	15,487	12,622	7,058	3,272	86,111
		割合（%）	16.2	20.3	18.9	18.0	14.7	8.2	3.8	100
	合計	人数	35,952	42,487	36,239	33,646	28,551	17,505	7,958	202,338
		割合（%）	17.8	21.0	17.9	16.6	14.1	8.7	3.9	100

検査項目別平均値（協会けんぽ）

		令和3年度		令和2年度		令和元年度	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性
BMI	度数	127,274	96,176	119,597	88,870	116,227	86,110
	平均値（kg/m^2）	24.1	22.3	24.2	22.3	24.0	22.2
	標準偏差（kg/m^2）	3.7	3.9	3.7	3.9	3.6	3.8
腹囲	度数	127,270	96,174	119,595	88,866	116,226	86,109
	平均値（cm）	84.9	78.7	85.0	78.8	84.7	78.6
	標準偏差（cm）	10.0	10.2	9.9	10.1	9.7	9.9
収縮期血圧	度数	127,274	96,178	119,597	88,871	116,227	86,111
	平均値（mmHg）	128.2	122.2	128.5	122.2	127.3	120.8
	標準偏差（mmHg）	17.1	17.9	17.1	17.8	17.1	17.8
拡張期血圧	度数	127,267	96,176	119,592	88,871	116,225	86,110
	平均値（mmHg）	80.3	74.0	80.5	74.0	79.7	73.2
	標準偏差（mmHg）	11.7	11.5	11.7	11.4	11.8	11.6
中性脂肪	度数	127,233	96,160	119,552	88,852	116,190	86,095
	平均値（mg/dl）	130.7	91.9	134.3	92.2	131.9	91.3
	標準偏差（mg/dl）	102.3	60.7	106.5	61.3	105.2	58.5
HDL コレステロール	度数	127,249	96,164	119,577	88,857	116,199	86,096
	平均値（mg/dl）	58.8	72.3	58.7	72.3	58.7	71.9
	標準偏差（mg/dl）	15.7	17.2	15.7	17.4	15.6	17.0
LDL コレステロール	度数	127,203	96,071	119,569	88,855	116,190	86,093
	平均値（mg/dl）	126.0	125.8	126.8	126.4	125.7	125.1
	標準偏差（mg/dl）	32.1	31.7	32.2	31.9	31.8	31.3
GOT	度数	127,250	96,163	119,577	88,856	116,201	86,096
	平均値（IU/L）	24.6	21.2	24.8	21.1	24.4	21.0
	標準偏差（IU/L）	12.6	9.9	13.4	9.5	12.2	9.2
GPT	度数	127,251	96,158	119,576	88,857	116,201	86,095
	平均値（IU/L）	28.4	19.0	28.6	18.7	27.3	18.2
	標準偏差（IU/L）	20.0	14.1	20.4	13.1	19.2	12.5
γ-GTP	度数	127,209	96,157	119,532	88,852	116,157	86,091
	平均値（IU/L）	47.0	25.0	48.6	25.0	47.5	24.7
	標準偏差（IU/L）	55.1	27.9	57.7	27.6	54.1	26.5
空腹時血糖	度数	98,474	70,486	92,514	64,417	92,938	64,786
	平均値（mg/dl）	100.4	92.6	100.4	92.6	99.8	91.9
	標準偏差（mg/dl）	22.1	14.7	22.5	14.9	21.7	14.4
HbA1c	度数	97,342	74,373	91,105	68,937	86,719	65,869
	平均値（%）	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	5.6
	標準偏差（%）	0.8	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5

イ　検査項目別該当者割合

○メタボリックシンドローム該当者







メタボリックシンドローム該当者の割合（協会けんぽ）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	2,726	4,542	5,217	4,858	4,756	3,304	1,796	27,199
			割合（%）	12.6	17.1	21.4	24.9	27.2	28.4	30.1	21.4
		予備群該当	人数	3,708	4,834	4,491	3,468	2,930	1,899	927	22,257
			割合（%）	17.1	18.2	18.4	17.8	16.8	16.3	15.5	17.5
		非該当	人数	15,248	17,257	14,676	11,205	9,768	6,416	3,244	77,814
			割合（%）	70.3	64.8	60.2	57.4	56.0	55.2	54.4	61.1
		合計	人数	21,682	26,633	24,384	19,531	17,454	11,619	5,967	127,270
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	297	628	876	1,037	1,062	729	483	5,112
			割合（%）	2.0	3.3	4.6	6.2	7.4	9.0	11.4	5.3
		予備群該当	人数	556	891	1,066	916	788	490	278	4,985
			割合（%）	3.8	4.7	5.6	5.5	5.5	6.0	6.5	5.2
		非該当	人数	13,717	17,581	17,009	14,814	12,584	6,884	3,488	86,077
			割合（%）	94.1	92.0	89.8	88.4	87.2	85.0	82.1	89.5
		合計	人数	14,570	19,100	18,951	16,767	14,434	8,103	4,249	96,174
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	2,776	4,421	4,709	4,691	4,491	3,044	1,572	25,704
			割合（%）	12.9	17.2	21.9	24.9	27.6	28.6	30.3	21.5
		予備群該当	人数	3,736	4,772	4,031	3,442	2,678	1,695	851	21,205
			割合（%）	17.4	18.6	18.8	18.3	16.4	16.0	16.4	17.7
		非該当	人数	14,974	16,461	12,745	10,719	9,128	5,886	2,773	72,686
			割合（%）	69.7	64.2	59.3	56.9	56.0	55.4	53.4	60.8
		合計	人数	21,486	25,654	21,485	18,852	16,297	10,625	5,196	119,595
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	256	603	782	999	917	659	431	4,647
			割合（%）	1.8	3.3	4.6	6.3	7.1	9.2	11.7	5.2
		予備群該当	人数	527	839	926	871	740	431	221	4,555
			割合（%）	3.7	4.6	5.5	5.5	5.7	6.0	6.0	5.1
		非該当	人数	13,277	16,710	15,172	14,058	11,328	6,099	3,020	79,664
			割合（%）	94.4	92.1	89.9	88.3	87.2	84.8	82.2	89.6
		合計	人数	14,060	18,152	16,880	15,928	12,985	7,189	3,672	88,866
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	2,698	4,084	4,093	4,277	4,155	2,778	1,326	23,411
			割合（%）	12.3	16.3	20.5	23.6	26.1	26.6	28.3	20.1
		予備群該当	人数	3,758	4,520	3,690	3,215	2,630	1,729	778	20,320
			割合（%）	17.1	18.1	18.4	17.7	16.5	16.6	16.6	17.5
		非該当	人数	15,510	16,433	12,220	10,667	9,144	5,939	2,582	72,495
			割合（%）	70.6	65.6	61.1	58.7	57.4	56.9	55.1	62.4
		合計	人数	21,966	25,037	20,003	18,159	15,929	10,446	4,686	116,226
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	265	498	687	844	855	571	344	4,064
			割合（%）	1.9	2.9	4.2	5.4	6.8	8.1	10.5	4.7
		予備群該当	人数	471	786	820	780	671	403	167	4,098
			割合（%）	3.4	4.5	5.1	5.0	5.3	5.7	5.1	4.8
		非該当	人数	13,250	16,165	14,728	13,863	11,096	6,084	2,761	77,947
			割合（%）	94.7	92.6	90.7	89.5	87.9	86.2	84.4	90.5
		合計	人数	13,986	17,449	16,235	15,487	12,622	7,058	3,272	86,109
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○肥満該当者


令和3年度（協会けんぽ）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.5
9.4
31.4
3.7
10.8
33.9
3.1
12.4
35.5
2.7
15.0
33.8
2.3
17.4
31.4
2.0
20.5
28.2
3.0
13.8
32.6
9.2
0.5
9.4
10.0
0.7
10.5
9.3
1.4
12.0
8.1
1.8
12.5
7.8
2.4
12.5
7.5
3.8
13.6
8.8
1.7
11.7
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定 ■腹囲が基準以上かつBMIが25以上 □腹囲のみ基準以上 □BMIのみ25以上


令和2年度（協会けんぽ）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.9
9.6
31.6
3.6
10.9
34.5
3.3
12.8
35.9
2.7
15.7
33.7
2.4
17.8
31.2
1.9
20.3
28.7
3.1
13.9
32.9
9.3
0.6
8.9
9.7
0.7
10.7
9.4
1.4
11.7
8.2
1.7
12.5
8.2
2.3
12.4
7.8
4.1
13.7
8.9
1.6
11.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定 ■腹囲が基準以上かつBMIが25以上 □腹囲のみ基準以上 □BMIのみ25以上


令和元年度（協会けんぽ）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.7
9.8
30.8
3.3
11.0
33.4
3.0
13.0
34.3
2.6
15.7
31.9
2.2
17.9
29.9
1.9
20.5
27.2
2.9
14.0
31.6
9.2
0.4
8.4
9.2
0.6
10.1
9.0
1.1
11.4
7.9
1.5
11.5
8.0
2.2
11.8
8.6
3.6
12.4
8.7
1.4
10.8
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定 ■腹囲が基準以上かつBMIが25以上 □腹囲のみ基準以上 □BMIのみ25以上

肥満該当者の割合(協会けんぽ)

					年代別						合計
					40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	768	985	768	532	405	356	3,814
				割合(%)	3.5	3.7	3.1	2.7	2.3	2.0	3.0
			腹囲のみ基準以上	人数	2,048	2,870	3,023	2,930	3,032	3,607	17,510
				割合(%)	9.4	10.8	12.4	15.0	17.4	20.5	13.8
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	6,803	9,036	8,655	6,611	5,477	4,967	41,549
				割合(%)	31.4	33.9	35.5	33.8	31.4	28.2	32.6
		非該当		人数	12,063	13,742	11,938	9,458	8,540	8,656	64,397
				割合(%)	55.6	51.6	49.0	48.4	48.9	49.2	50.6
		合計		人数	21,682	26,633	24,384	19,531	17,454	17,586	127,270
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	1,339	1,909	1,761	1,351	1,128	932	8,420
				割合(%)	9.2	10.0	9.3	8.1	7.8	7.5	8.8
			腹囲のみ基準以上	人数	78	136	259	305	346	467	1,591
				割合(%)	0.5	0.7	1.4	1.8	2.4	3.8	1.7
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	1,374	2,005	2,266	2,098	1,799	1,684	11,226
				割合(%)	9.4	10.5	12.0	12.5	12.5	13.6	11.7
		非該当		人数	11,779	15,049	14,664	13,013	11,161	9,269	74,935
				割合(%)	80.8	78.8	77.4	77.6	77.3	75.0	77.9
		合計		人数	14,570	19,099	18,950	16,767	14,434	12,352	96,172
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	841	928	713	505	397	295	3,679
				割合(%)	3.9	3.6	3.3	2.7	2.4	1.9	3.1
			腹囲のみ基準以上	人数	2,057	2,798	2,740	2,963	2,902	3,204	16,664
				割合(%)	9.6	10.9	12.8	15.7	17.8	20.3	13.9
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	6,781	8,860	7,706	6,344	5,080	4,542	39,313
				割合(%)	31.6	34.5	35.9	33.7	31.2	28.7	32.9
		非該当		人数	11,807	13,068	10,326	9,040	7,918	7,780	59,939
				割合(%)	55.0	50.9	48.1	48.0	48.6	49.2	50.1
		合計		人数	21,486	25,654	21,485	18,852	16,297	15,821	119,595
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	1,310	1,763	1,579	1,299	1,070	852	7,873
				割合(%)	9.3	9.7	9.4	8.2	8.2	7.8	8.9
			腹囲のみ基準以上	人数	82	122	235	273	305	447	1,464
				割合(%)	0.6	0.7	1.4	1.7	2.3	4.1	1.6
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	1,258	1,938	1,978	1,987	1,616	1,488	10,265
				割合(%)	8.9	10.7	11.7	12.5	12.4	13.7	11.6
		非該当		人数	11,409	14,329	13,088	12,369	9,994	8,074	69,263
				割合(%)	81.2	78.9	77.5	77.7	77.0	74.3	77.9
		合計		人数	14,059	18,152	16,880	15,928	12,985	10,861	88,865
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	815	828	602	469	352	282	3,348
				割合(%)	3.7	3.3	3.0	2.6	2.2	1.9	2.9
			腹囲のみ基準以上	人数	2,147	2,765	2,606	2,856	2,859	3,096	16,329
				割合(%)	9.8	11.0	13.0	15.7	17.9	20.5	14.0
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	6,757	8,374	6,866	5,801	4,759	4,122	36,679
				割合(%)	30.8	33.4	34.3	31.9	29.9	27.2	31.6
		非該当		人数	12,247	13,070	9,929	9,033	7,959	7,632	59,870
				割合(%)	55.8	52.2	49.6	49.7	50.0	50.4	51.5
		合計		人数	21,966	25,037	20,003	18,159	15,929	15,132	116,226
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	1,291	1,611	1,458	1,216	1,014	888	7,478
				割合(%)	9.2	9.2	9.0	7.9	8.0	8.6	8.7
			腹囲のみ基準以上	人数	59	109	181	229	280	373	1,231
				割合(%)	0.4	0.6	1.1	1.5	2.2	3.6	1.4
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	1,174	1,758	1,850	1,775	1,490	1,285	9,332
				割合(%)	8.4	10.1	11.4	11.5	11.8	12.4	10.8
		非該当		人数	11,461	13,971	12,746	12,267	9,838	7,784	68,067
				割合(%)	82.0	80.1	78.5	79.2	77.9	75.4	79.0
		合計		人数	13,985	17,449	16,235	15,487	12,622	10,330	86,108
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第２版)」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、この年代は65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

○高血圧症有病者

令和3年度（協会けんぽ）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
16.8
19.2
17.0
28.5
16.0
37.9
15.6
47.7
14.1
55.2
12.4
61.3
12.0
65.9
15.5
40.1
8.9
8.9
11.9
15.3
13.2
23.1
13.6
28.9
14.5
36.6
14.8
46.9
14.3
56.6
12.7
25.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

令和2年度（協会けんぽ）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
16.6
19.3
17.3
28.4
17.0
37.7
15.3
47.1
14.7
54.9
13.3
60.7
12.8
65.4
15.9
39.5
9.0
8.2
11.2
15.4
13.1
22.8
13.7
28.8
14.6
37.0
14.5
47.1
15.2
56.5
12.6
25.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

令和元年度（協会けんぽ）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
16.4
18.6
16.4
26.4
16.5
36.0
15.4
45.0
14.3
52.9
13.0
58.4
12.8
62.8
15.5
37.5
8.3
8.0
10.8
14.2
12.6
21.4
13.8
26.4
14.2
35.5
14.2
44.6
14.5
52.7
12.2
23.8
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

高血圧症有病者の割合（協会けんぽ）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	4,174	7,595	9,244	9,310	9,635	7,124	3,931	51,013
			割合（%）	19.2	28.5	37.9	47.7	55.2	61.3	65.9	40.1
		予備群該当	人数	3,651	4,538	3,896	3,055	2,453	1,443	714	19,750
			割合（%）	16.8	17.0	16.0	15.6	14.1	12.4	12.0	15.5
		非該当	人数	13,859	14,500	11,244	7,166	5,366	3,054	1,322	56,511
			割合（%）	63.9	54.4	46.1	36.7	30.7	26.3	22.2	44.4
		合計	人数	21,684	26,633	24,384	19,531	17,454	11,621	5,967	127,274
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	1,298	2,929	4,384	4,851	5,286	3,803	2,406	24,957
			割合（%）	8.9	15.3	23.1	28.9	36.6	46.9	56.6	25.9
		予備群該当	人数	1,296	2,264	2,500	2,283	2,091	1,203	606	12,243
			割合（%）	8.9	11.9	13.2	13.6	14.5	14.8	14.3	12.7
		非該当	人数	11,980	13,907	12,067	9,633	7,057	3,097	1,237	58,978
			割合（%）	82.2	72.8	63.7	57.5	48.9	38.2	29.1	61.3
		合計	人数	14,574	19,100	18,951	16,767	14,434	8,103	4,249	96,178
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	4,137	7,277	8,100	8,879	8,942	6,450	3,398	47,183
			割合（%）	19.3	28.4	37.7	47.1	54.9	60.7	65.4	39.5
		予備群該当	人数	3,570	4,442	3,662	2,876	2,394	1,412	667	19,023
			割合（%）	16.6	17.3	17.0	15.3	14.7	13.3	12.8	15.9
		非該当	人数	13,779	13,935	9,723	7,098	4,961	2,764	1,131	53,391
			割合（%）	64.1	54.3	45.3	37.6	30.4	26.0	21.8	44.6
		合計	人数	21,486	25,654	21,485	18,853	16,297	10,626	5,196	119,597
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	1,160	2,801	3,841	4,583	4,802	3,385	2,074	22,646
			割合（%）	8.2	15.4	22.8	28.8	37.0	47.1	56.5	25.5
		予備群該当	人数	1,268	2,039	2,209	2,177	1,901	1,044	558	11,196
			割合（%）	9.0	11.2	13.1	13.7	14.6	14.5	15.2	12.6
		非該当	人数	11,635	13,312	10,830	9,168	6,282	2,762	1,040	55,029
			割合（%）	82.7	73.3	64.2	57.6	48.4	38.4	28.3	61.9
		合計	人数	14,063	18,152	16,880	15,928	12,985	7,191	3,672	88,871
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	4,081	6,608	7,201	8,167	8,431	6,101	2,943	43,532
			割合（%）	18.6	26.4	36.0	45.0	52.9	58.4	62.8	37.5
		予備群該当	人数	3,593	4,095	3,301	2,792	2,271	1,354	598	18,004
			割合（%）	16.4	16.4	16.5	15.4	14.3	13.0	12.8	15.5
		非該当	人数	14,292	14,334	9,501	7,200	5,227	2,992	1,145	54,691
			割合（%）	65.1	57.3	47.5	39.6	32.8	28.6	24.4	47.1
		合計	人数	21,966	25,037	20,003	18,159	15,929	10,447	4,686	116,227
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	1,118	2,482	3,467	4,091	4,481	3,147	1,723	20,509
			割合（%）	8.0	14.2	21.4	26.4	35.5	44.6	52.7	23.8
		予備群該当	人数	1,166	1,882	2,043	2,136	1,794	1,002	473	10,496
			割合（%）	8.3	10.8	12.6	13.8	14.2	14.2	14.5	12.2
		非該当	人数	11,702	13,086	10,726	9,260	6,347	2,909	1,076	55,106
			割合（%）	83.7	75.0	66.1	59.8	50.3	41.2	32.9	64.0
		合計	人数	13,986	17,450	16,236	15,487	12,622	7,058	3,272	86,111
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○糖尿病有病者


令和3年度（協会けんぽ）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.6
3.7
5.7
6.2
7.4
9.6
9.3
13.0
10.9
16.1
11.6
18.6
13.2
21.1
7.8
10.6
1.5
1.4
2.1
2.1
3.1
3.5
5.0
4.5
6.1
6.0
8.0
8.3
10.0
10.6
4.2
4.2
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当


令和2年度（協会けんぽ）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.7
3.8
5.5
6.2
7.3
9.6
9.8
12.8
10.8
16.1
12.2
18.5
12.8
21.1
7.8
10.5
1.4
1.4
2.3
2.2
3.3
3.4
4.9
4.6
6.6
6.0
8.0
8.9
9.3
11.1
4.2
4.2
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

令和元年度（協会けんぽ）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.6
3.5
5.4
5.9
7.5
9.1
9.3
12.3
10.7
15.3
12.2
17.9
13.0
20.2
7.6
9.9
1.4
1.9
1.9
2.1
3.5
3.0
4.6
4.4
6.2
6.0
7.6
8.4
10.3
10.1
4.0
3.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

糖尿病有病者の割合（協会けんぽ）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	800	1,630	2,330	2,517	2,794	2,144	1,252	13,467
			割合（%）	3.7	6.2	9.6	13.0	16.1	18.6	21.1	10.6
		予備群該当	人数	780	1,519	1,792	1,802	1,888	1,336	781	9,898
			割合（%）	3.6	5.7	7.4	9.3	10.9	11.6	13.2	7.8
		非該当	人数	19,983	23,347	20,125	15,098	12,687	8,054	3,894	103,188
			割合（%）	92.7	88.1	83.0	77.8	73.0	69.8	65.7	81.5
		合計	人数	21,563	26,496	24,247	19,417	17,369	11,534	5,927	126,553
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	205	394	654	743	856	667	446	3,965
			割合（%）	1.4	2.1	3.5	4.5	6.0	8.3	10.6	4.2
		予備群該当	人数	218	392	587	838	878	644	420	3,977
			割合（%）	1.5	2.1	3.1	5.0	6.1	8.0	10.0	4.2
		非該当	人数	14,076	18,194	17,605	15,061	12,591	6,707	3,325	87,559
			割合（%）	97.1	95.9	93.4	90.5	87.9	83.6	79.3	91.7
		合計	人数	14,499	18,980	18,846	16,642	14,325	8,018	4,191	95,501
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	809	1,587	2,044	2,390	2,604	1,953	1,089	12,476
			割合（%）	3.8	6.2	9.6	12.8	16.1	18.5	21.1	10.5
		予備群該当	人数	788	1,408	1,562	1,829	1,745	1,294	663	9,289
			割合（%）	3.7	5.5	7.3	9.8	10.8	12.2	12.8	7.8
		非該当	人数	19,768	22,524	17,760	14,523	11,874	7,325	3,414	97,188
			割合（%）	92.5	88.3	83.1	77.5	73.2	69.3	66.1	81.7
		合計	人数	21,365	25,519	21,366	18,742	16,223	10,572	5,166	118,953
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	180	393	577	726	769	632	403	3,680
			割合（%）	1.3	2.2	3.4	4.6	6.0	8.9	11.1	4.2
		予備群該当	人数	196	411	546	783	849	571	339	3,695
			割合（%）	1.4	2.3	3.3	4.9	6.6	8.0	9.3	4.2
		非該当	人数	13,594	17,234	15,667	14,316	11,276	5,930	2,896	80,913
			割合（%）	97.3	95.5	93.3	90.5	87.5	83.1	79.6	91.6
		合計	人数	13,970	18,038	16,790	15,825	12,894	7,133	3,638	88,288
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	770	1,478	1,809	2,220	2,432	1,858	940	11,507
			割合（%）	3.5	5.9	9.1	12.3	15.3	17.9	20.2	9.9
		予備群該当	人数	778	1,335	1,485	1,674	1,696	1,269	606	8,843
			割合（%）	3.6	5.4	7.5	9.3	10.7	12.2	13.0	7.6
		非該当	人数	20,290	22,129	16,614	14,192	11,741	7,263	3,119	95,348
			割合（%）	92.9	88.7	83.5	78.5	74.0	69.9	66.9	82.4
		合計	人数	21,838	24,942	19,908	18,086	15,869	10,390	4,665	115,698
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	166	366	483	670	750	591	329	3,355
			割合（%）	1.2	2.1	3.0	4.4	6.0	8.4	10.1	3.9
		予備群該当	人数	195	325	558	702	782	529	333	3,424
			割合（%）	1.4	1.9	3.5	4.6	6.2	7.6	10.3	4.0
		非該当	人数	13,512	16,654	15,097	14,019	11,003	5,881	2,585	78,751
			割合（%）	97.4	96.0	93.5	91.1	87.8	84.0	79.6	92.1
		合計	人数	13,873	17,345	16,138	15,391	12,535	7,001	3,247	85,530
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○脂質異常症有病者


令和3年度（協会けんぽ）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
50.3
54.9
57.1
57.8
56.9
56.2
54.1
55.3
21.0
29.4
44.2
54.9
60.8
62.4
63.8
44.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和2年度（協会けんぽ）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
50.9
55.7
58.2
58.1
57.9
56.3
54.1
56.0
21.1
29.3
44.1
55.6
61.7
63.2
65.3
44.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和元年度（協会けんぽ）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
49.1
54.1
55.9
56.5
56.0
54.3
52.1
54.0
19.7
27.7
42.0
53.3
59.4
61.4
64.2
42.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当

脂質異常症有病者の割合（協会けんぽ）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	10,898	14,617	13,917	11,287	9,926	6,531	3,228	70,404
			割合（%）	50.3	54.9	57.1	57.8	56.9	56.2	54.1	55.3
		非該当	人数	10,776	12,001	10,457	8,236	7,524	5,087	2,738	56,819
			割合（%）	49.7	45.1	42.9	42.2	43.1	43.8	45.9	44.7
		合計	人数	21,674	26,618	24,374	19,523	17,450	11,618	5,966	127,223
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	3,063	5,606	8,367	9,190	8,768	5,047	2,709	42,750
			割合（%）	21.0	29.4	44.2	54.9	60.8	62.4	63.8	44.5
		非該当	人数	11,500	13,475	10,571	7,558	5,645	3,042	1,537	53,328
			割合（%）	79.0	70.6	55.8	45.1	39.2	37.6	36.2	55.5
		合計	人数	14,563	19,081	18,938	16,748	14,413	8,089	4,246	96,078
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	10,945	14,281	12,501	10,957	9,427	5,985	2,810	66,906
			割合（%）	50.9	55.7	58.2	58.1	57.9	56.3	54.1	56.0
		非該当	人数	10,539	11,371	8,982	7,892	6,865	4,638	2,384	52,671
			割合（%）	49.1	44.3	41.8	41.9	42.1	43.7	45.9	44.0
		合計	人数	21,484	25,652	21,483	18,849	16,292	10,623	5,194	119,577
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	2,969	5,321	7,441	8,848	8,015	4,545	2,396	39,535
			割合（%）	21.1	29.3	44.1	55.6	61.7	63.2	65.3	44.5
		非該当	人数	11,092	12,828	9,437	7,079	4,967	2,645	1,274	49,322
			割合（%）	78.9	70.7	55.9	44.4	38.3	36.8	34.7	55.5
		合計	人数	14,061	18,149	16,878	15,927	12,982	7,190	3,670	88,857
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	10,772	13,539	11,171	10,263	8,918	5,669	2,440	62,772
			割合（%）	49.1	54.1	55.9	56.5	56.0	54.3	52.1	54.0
		非該当	人数	11,185	11,492	8,826	7,889	7,008	4,776	2,244	53,420
			割合（%）	50.9	45.9	44.1	43.5	44.0	45.7	47.9	46.0
		合計	人数	21,957	25,031	19,997	18,152	15,926	10,445	4,684	116,192
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	2,760	4,838	6,811	8,255	7,500	4,331	2,099	36,594
			割合（%）	19.7	27.7	42.0	53.3	59.4	61.4	64.2	42.5
		非該当	人数	11,219	12,607	9,423	7,226	5,121	2,723	1,171	49,490
			割合（%）	80.3	72.3	58.0	46.7	40.6	38.6	35.8	57.5
		合計	人数	13,979	17,445	16,234	15,481	12,621	7,054	3,270	86,084
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○習慣的喫煙者


令和3年度（協会けんぽ）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
41.1
40.3
39.2
37.7
33.4
26.3
36.9
11.3
12.7
11.4
9.5
8.0
6.0
10.1
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者


令和2年度（協会けんぽ）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
41.9
40.5
40.1
37.9
33.2
26.2
37.4
11.6
13.1
11.2
9.6
8.3
5.8
10.3
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者


令和元年度（協会けんぽ）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
42.5
41.8
40.7
38.7
33.6
26.7
38.2
12.2
13.8
11.4
9.7
8.0
5.8
10.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者

（３）健保組合

ア　健診受診者及び検査項目別平均値

健診受診者数（健保組合）

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	人数	11,686	13,930	13,564	11,196	7,866	2,912	1,075	62,229
		割合（%）	18.8	22.4	21.8	18.0	12.6	4.7	1.7	100
	女性	人数	7,258	9,117	9,490	7,352	4,791	1,688	831	40,527
		割合（%）	17.9	22.5	23.4	18.1	11.8	4.2	2.1	100
	合計	人数	18,944	23,047	23,054	18,548	12,657	4,600	1,906	102,756
		割合（%）	18.4	22.4	22.4	18.1	12.3	4.5	1.9	100
令和2年度	男性	人数	12,036	14,244	13,030	11,295	7,676	2,855	952	62,088
		割合（%）	19.4	22.9	21.0	18.2	12.4	4.6	1.5	100
	女性	人数	7,353	9,169	8,660	7,261	4,391	1,621	761	39,216
		割合（%）	18.8	23.4	22.1	18.5	11.2	4.1	1.9	100
	合計	人数	19,389	23,413	21,690	18,556	12,067	4,476	1,713	101,304
		割合（%）	19.1	23.1	21.4	18.3	11.9	4.4	1.7	100
令和元年度	男性	人数	12,693	14,681	12,989	11,200	7,719	2,947	960	63,189
		割合（%）	20.1	23.2	20.6	17.7	12.2	4.7	1.5	100
	女性	人数	7,748	9,547	8,564	7,213	4,363	1,688	697	39,820
		割合（%）	19.5	24.0	21.5	18.1	11.0	4.2	1.8	100
	合計	人数	20,441	24,228	21,553	18,413	12,082	4,635	1,657	103,009
		割合（%）	19.8	23.5	20.9	17.9	11.7	4.5	1.6	100

検査項目別平均値（健保組合）

		令和3年度		令和2年度		令和元年度	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性
BMI	度数	62,228	40,526	62,087	39,216	63,185	39,818
	平均値（kg/m^2）	24.0	22.1	24.1	22.2	24.0	22.1
	標準偏差（kg/m^2）	3.6	3.9	3.6	3.9	3.5	3.8
腹囲	度数	62,225	40,519	62,081	39,208	63,183	39,809
	平均値（cm）	84.5	78.0	84.6	78.1	84.4	78.0
	標準偏差（cm）	9.6	10.1	9.5	10.0	9.3	9.8
収縮期血圧	度数	62,229	40,525	62,080	39,213	63,185	39,817
	平均値（mmHg）	126.0	120.2	126.4	120.5	125.4	119.0
	標準偏差（mmHg）	16.1	17.6	16.2	17.6	16.1	17.5
拡張期血圧	度数	62,228	40,525	62,080	39,213	63,177	39,813
	平均値（mmHg）	79.5	73.1	79.8	73.4	79.1	72.5
	標準偏差（mmHg）	11.4	11.6	11.5	11.7	11.5	11.7
中性脂肪	度数	62,205	40,517	62,072	39,207	63,167	39,810
	平均値（mg/dl）	125.3	86.2	128.8	86.7	125.9	85.8
	標準偏差（mg/dl）	94.8	54.6	99.6	55.2	96.0	54.2
HDL コレステロール	度数	62,213	40,511	62,079	39,207	63,176	39,813
	平均値（mg/dl）	59.1	73.1	59.0	73.1	59.0	72.5
	標準偏差（mg/dl）	15.5	17.3	15.6	17.3	15.4	16.9
LDL コレステロール	度数	62,204	40,507	62,070	39,204	63,160	39,808
	平均値（mg/dl）	125.9	124.9	127.0	125.6	125.3	123.9
	標準偏差（mg/dl）	30.9	31.1	31.0	31.3	30.7	30.9
GOT	度数	62,215	40,518	62,078	39,210	63,176	39,813
	平均値（IU/L）	24.1	20.7	24.3	20.6	23.9	20.4
	標準偏差（IU/L）	11.5	9.1	11.7	8.8	12.4	10.1
GPT	度数	62,216	40,516	62,078	39,209	63,176	39,813
	平均値（IU/L）	28.3	18.3	28.6	18.2	27.2	17.7
	標準偏差（IU/L）	19.8	12.4	20.2	13.1	19.3	13.2
γ-GTP	度数	62,201	40,516	62,056	39,209	63,157	39,811
	平均値（IU/L）	44.9	24.2	46.2	24.1	45.4	23.8
	標準偏差（IU/L）	50.4	26.8	51.5	25.3	50.0	24.5
空腹時血糖	度数	49,779	33,511	49,488	32,677	50,377	33,139
	平均値（mg/dl）	99.7	92.7	99.6	92.6	99.0	91.9
	標準偏差（mg/dl）	19.2	13.7	19.4	14.0	19.0	13.6
HbA1c	度数	61,069	39,395	60,831	38,112	61,847	38,206
	平均値（%）	5.6	5.5	5.6	5.5	5.6	5.5
	標準偏差（%）	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5

イ　検査項目別該当者割合

○メタボリックシンドローム該当者







メタボリックシンドローム該当者の割合（健保組合）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	1,315	2,130	2,707	2,661	2,040	788	334	11,975
			割合（%）	11.3	15.3	20.0	23.8	25.9	27.1	31.1	19.2
		予備群該当	人数	1,808	2,359	2,367	1,908	1,272	456	160	10,330
			割合（%）	15.5	16.9	17.5	17.0	16.2	15.7	14.9	16.6
		非該当	人数	8,562	9,441	8,489	6,627	4,553	1,667	581	39,920
			割合（%）	73.3	67.8	62.6	59.2	57.9	57.3	54.0	64.2
		合計	人数	11,685	13,930	13,563	11,196	7,865	2,911	1,075	62,225
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	132	236	394	390	373	165	93	1,783
			割合（%）	1.8	2.6	4.2	5.3	7.8	9.8	11.2	4.4
		予備群該当	人数	228	370	434	423	245	87	52	1,839
			割合（%）	3.1	4.1	4.6	5.8	5.1	5.2	6.3	4.5
		非該当	人数	6,892	8,511	8,662	6,538	4,172	1,435	686	36,896
			割合（%）	95.0	93.4	91.3	88.9	87.1	85.1	82.6	91.1
		合計	人数	7,252	9,117	9,490	7,351	4,790	1,687	831	40,518
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	1,385	2,294	2,674	2,748	1,956	822	288	12,167
			割合（%）	11.5	16.1	20.5	24.3	25.5	28.8	30.3	19.6
		予備群該当	人数	1,903	2,416	2,266	1,866	1,252	442	147	10,292
			割合（%）	15.8	17.0	17.4	16.5	16.3	15.5	15.4	16.6
		非該当	人数	8,747	9,534	8,088	6,681	4,465	1,590	517	39,622
			割合（%）	72.7	66.9	62.1	59.2	58.2	55.7	54.3	63.8
		合計	人数	12,035	14,244	13,028	11,295	7,673	2,854	952	62,081
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	126	240	362	427	361	177	88	1,781
			割合（%）	1.7	2.6	4.2	5.9	8.2	10.9	11.6	4.5
		予備群該当	人数	244	370	423	356	230	91	42	1,756
			割合（%）	3.3	4.0	4.9	4.9	5.2	5.6	5.5	4.5
		非該当	人数	6,980	8,556	7,874	6,478	3,798	1,353	631	35,670
			割合（%）	95.0	93.3	90.9	89.2	86.5	83.5	82.9	91.0
		合計	人数	7,350	9,166	8,659	7,261	4,389	1,621	761	39,207
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	1,326	2,148	2,480	2,523	1,879	805	276	11,437
			割合（%）	10.4	14.6	19.1	22.5	24.3	27.3	28.8	18.1
		予備群該当	人数	1,964	2,454	2,265	1,837	1,264	458	166	10,408
			割合（%）	15.5	16.7	17.4	16.4	16.4	15.5	17.3	16.5
		非該当	人数	9,403	10,077	8,244	6,838	4,574	1,684	518	41,338
			割合（%）	74.1	68.6	63.5	61.1	59.3	57.1	54.0	65.4
		合計	人数	12,693	14,679	12,989	11,198	7,717	2,947	960	63,183
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	132	217	323	398	314	132	63	1,579
			割合（%）	1.7	2.3	3.8	5.5	7.2	7.8	9.0	4.0
		予備群該当	人数	254	361	409	352	244	93	41	1,754
			割合（%）	3.3	3.8	4.8	4.9	5.6	5.5	5.9	4.4
		非該当	人数	7,356	8,968	7,830	6,462	3,803	1,463	593	36,475
			割合（%）	95.0	93.9	91.5	89.6	87.2	86.7	85.1	91.6
		合計	人数	7,742	9,546	8,562	7,212	4,361	1,688	697	39,808
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○肥満該当者


令和3年度（健保組合）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.0
10.1
28.9
3.5
11.4
31.1
3.4
13.3
32.6
2.6
14.9
32.1
2.7
16.2
30.5
2.3
20.8
27.4
3.0
13.4
30.9
8.0
0.4
8.2
9.6
0.6
9.6
8.5
1.1
11.0
8.1
1.9
11.4
6.9
2.0
12.8
8.6
3.5
13.9
8.4
1.2
10.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上


令和2年度（健保組合）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.4
9.5
29.2
3.4
11.2
32.0
3.4
13.4
32.9
2.8
15.1
32.1
2.7
17.2
29.8
1.8
21.5
27.0
3.1
13.4
31.1
8.6
0.4
7.9
9.8
0.6
9.3
9.0
1.1
11.0
7.8
1.9
11.4
7.6
1.9
13.3
8.6
3.7
14.2
8.7
1.2
10.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上


令和元年度（健保組合）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
3.4
9.4
28.2
3.2
11.1
30.9
3.2
13.9
31.5
3.1
15.0
30.8
2.6
16.8
29.2
2.1
21.3
26.7
3.1
13.3
30.0
8.4
0.5
7.8
9.0
0.6
8.8
8.6
1.3
10.2
7.7
1.9
11.1
8.0
1.9
12.6
8.7
3.1
12.2
8.4
1.3
9.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上

肥満該当者の割合(健保組合)

					年代別						合計
					40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	348	488	460	289	210	91	1,886
				割合(%)	3.0	3.5	3.4	2.6	2.7	2.3	3.0
			腹囲のみ基準以上	人数	1,175	1,582	1,802	1,673	1,271	831	8,334
				割合(%)	10.1	11.4	13.3	14.9	16.2	20.8	13.4
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	3,375	4,334	4,418	3,595	2,398	1,094	19,214
				割合(%)	28.9	31.1	32.6	32.1	30.5	27.4	30.9
		非該当		人数	6,787	7,525	6,883	5,639	3,986	1,970	32,790
				割合(%)	58.1	54.0	50.7	50.4	50.7	49.4	52.7
		合計		人数	11,685	13,929	13,563	11,196	7,865	3,986	62,224
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	581	872	803	596	332	217	3,401
				割合(%)	8.0	9.6	8.5	8.1	6.9	8.6	8.4
			腹囲のみ基準以上	人数	27	53	104	137	96	89	506
				割合(%)	0.4	0.6	1.1	1.9	2.0	3.5	1.2
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	597	874	1,042	841	611	349	4,314
				割合(%)	8.2	9.6	11.0	11.4	12.8	13.9	10.6
		非該当		人数	6,047	7,317	7,541	5,777	3,752	1,863	32,297
				割合(%)	83.4	80.3	79.5	78.6	78.3	74.0	79.7
		合計		人数	7,252	9,116	9,490	7,351	4,791	2,518	40,518
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	414	481	447	318	209	70	1,939
				割合(%)	3.4	3.4	3.4	2.8	2.7	1.8	3.1
			腹囲のみ基準以上	人数	1,148	1,597	1,741	1,706	1,320	817	8,329
				割合(%)	9.5	11.2	13.4	15.1	17.2	21.5	13.4
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	3,510	4,558	4,280	3,625	2,283	1,029	19,285
				割合(%)	29.2	32.0	32.9	32.1	29.8	27.0	31.1
		非該当		人数	6,962	7,608	6,560	5,646	3,861	1,890	32,527
				割合(%)	57.9	53.4	50.4	50.0	50.3	49.7	52.4
		合計		人数	12,034	14,244	13,028	11,295	7,673	3,806	62,080
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	633	902	777	564	332	204	3,412
				割合(%)	8.6	9.8	9.0	7.8	7.6	8.6	8.7
			腹囲のみ基準以上	人数	27	53	92	139	82	87	480
				割合(%)	0.4	0.6	1.1	1.9	1.9	3.7	1.2
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	584	849	956	828	583	338	4,138
				割合(%)	7.9	9.3	11.0	11.4	13.3	14.2	10.6
		非該当		人数	6,106	7,362	6,834	5,730	3,393	1,753	31,178
				割合(%)	83.1	80.3	78.9	78.9	77.3	73.6	79.5
		合計		人数	7,350	9,166	8,659	7,261	4,390	2,382	39,208
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	428	468	419	352	204	81	1,952
				割合(%)	3.4	3.2	3.2	3.1	2.6	2.1	3.1
			腹囲のみ基準以上	人数	1,197	1,624	1,801	1,681	1,295	834	8,432
				割合(%)	9.4	11.1	13.9	15.0	16.8	21.3	13.3
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	3,577	4,540	4,095	3,444	2,256	1,044	18,956
				割合(%)	28.2	30.9	31.5	30.8	29.2	26.7	30.0
		非該当		人数	7,490	8,047	6,673	5,720	3,961	1,948	33,839
				割合(%)	59.0	54.8	51.4	51.1	51.3	49.9	53.6
		合計		人数	12,692	14,679	12,988	11,197	7,716	3,907	63,179
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	651	860	734	556	350	207	3,358
				割合(%)	8.4	9.0	8.6	7.7	8.0	8.7	8.4
			腹囲のみ基準以上	人数	37	57	109	138	84	75	500
				割合(%)	0.5	0.6	1.3	1.9	1.9	3.1	1.3
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	601	842	877	800	549	290	3,959
				割合(%)	7.8	8.8	10.2	11.1	12.6	12.2	9.9
		非該当		人数	6,453	7,786	6,841	5,718	3,379	1,813	31,990
				割合(%)	83.4	81.6	79.9	79.3	77.5	76.0	80.4
		合計		人数	7,742	9,545	8,561	7,212	4,362	2,385	39,807
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第２版)」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、ここでは65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

○高血圧症有病者

令和3年度（健保組合）
男性
女性
高血圧有症病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
15.2
17.3
15.7
25.9
15.9
35.9
14.3
45.6
13.1
54.4
12.5
56.4
10.8
64.3
14.9
35.7
7.9
7.6
10.5
13.4
11.9
20.9
13.4
28.4
13.4
36.6
15.4
47.1
12.6
59.4
11.5
21.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

令和2年度（健保組合）
男性
女性
高血圧有症病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
15.0
17.8
15.9
26.3
15.8
35.6
14.6
45.5
13.1
53.5
13.0
58.2
12.4
63.2
15.0
35.5
7.8
7.5
10.6
13.8
12.2
20.7
13.3
28.7
13.8
37.1
13.4
48.0
13.1
60.1
11.4
21.8
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

令和元年度（健保組合）
男性
女性
高血圧有症病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
14.1
16.4
15.2
24.5
14.6
34.4
14.4
43.7
13.9
50.8
13.1
55.5
10.7
63.1
14.4
33.5
7.1
7.2
9.5
12.4
11.5
19.9
11.9
26.5
13.0
35.0
12.6
43.4
13.8
55.4
10.5
20.1
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

高血圧症有病者の割合（健保組合）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	2,019	3,603	4,863	5,106	4,283	1,642	691	22,207
			割合（%）	17.3	25.9	35.9	45.6	54.4	56.4	64.3	35.7
		予備群該当	人数	1,777	2,190	2,162	1,603	1,030	364	116	9,242
			割合（%）	15.2	15.7	15.9	14.3	13.1	12.5	10.8	14.9
		非該当	人数	7,890	8,137	6,539	4,487	2,553	906	268	30,780
			割合（%）	67.5	58.4	48.2	40.1	32.5	31.1	24.9	49.5
		合計	人数	11,686	13,930	13,564	11,196	7,866	2,912	1,075	62,229
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	548	1,225	1,981	2,088	1,754	795	494	8,885
			割合（%）	7.6	13.4	20.9	28.4	36.6	47.1	59.4	21.9
		予備群該当	人数	572	958	1,133	984	641	260	105	4,653
			割合（%）	7.9	10.5	11.9	13.4	13.4	15.4	12.6	11.5
		非該当	人数	6,138	6,934	6,376	4,280	2,394	633	232	26,987
			割合（%）	84.6	76.1	67.2	58.2	50.0	37.5	27.9	66.6
		合計	人数	7,258	9,117	9,490	7,352	4,789	1,688	831	40,525
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	2,147	3,741	4,637	5,137	4,109	1,661	602	22,034
			割合（%）	17.8	26.3	35.6	45.5	53.5	58.2	63.2	35.5
		予備群該当	人数	1,809	2,270	2,062	1,647	1,009	371	118	9,286
			割合（%）	15.0	15.9	15.8	14.6	13.1	13.0	12.4	15.0
		非該当	人数	8,078	8,232	6,331	4,509	2,558	822	232	30,762
			割合（%）	67.1	57.8	48.6	39.9	33.3	28.8	24.4	49.6
		合計	人数	12,034	14,243	13,030	11,293	7,676	2,854	952	62,082
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	553	1,267	1,794	2,085	1,627	778	457	8,561
			割合（%）	7.5	13.8	20.7	28.7	37.1	48.0	60.1	21.8
		予備群該当	人数	574	968	1,057	967	604	218	100	4,488
			割合（%）	7.8	10.6	12.2	13.3	13.8	13.4	13.1	11.4
		非該当	人数	6,226	6,933	5,808	4,209	2,159	625	204	26,164
			割合（%）	84.7	75.6	67.1	58.0	49.2	38.6	26.8	66.7
		合計	人数	7,353	9,168	8,659	7,261	4,390	1,621	761	39,213
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	2,078	3,591	4,464	4,897	3,922	1,635	606	21,193
			割合（%）	16.4	24.5	34.4	43.7	50.8	55.5	63.1	33.5
		予備群該当	人数	1,794	2,229	1,900	1,611	1,074	387	103	9,098
			割合（%）	14.1	15.2	14.6	14.4	13.9	13.1	10.7	14.4
		非該当	人数	8,819	8,861	6,624	4,692	2,723	925	251	32,895
			割合（%）	69.5	60.4	51.0	41.9	35.3	31.4	26.1	52.1
		合計	人数	12,691	14,681	12,988	11,200	7,719	2,947	960	63,186
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	557	1,187	1,707	1,912	1,526	732	386	8,007
			割合（%）	7.2	12.4	19.9	26.5	35.0	43.4	55.4	20.1
		予備群該当	人数	548	906	985	861	566	212	96	4,174
			割合（%）	7.1	9.5	11.5	11.9	13.0	12.6	13.8	10.5
		非該当	人数	6,641	7,454	5,872	4,440	2,270	744	215	27,636
			割合（%）	85.7	78.1	68.6	61.6	52.0	44.1	30.8	69.4
		合計	人数	7,746	9,547	8,564	7,213	4,362	1,688	697	39,817
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○糖尿病有病者


令和3年度（健保組合）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.6
3.2
5.9
5.5
7.7
8.7
9.9
11.9
11.4
15.1
12.9
17.1
12.8
21.2
7.7
8.9
1.3
1.9
1.8
3.2
2.9
5.5
4.7
6.8
6.5
9.3
8.6
9.4
13.2
3.8
3.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

令和2年度（健保組合）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.9
3.1
5.5
5.9
7.8
8.2
10.3
12.0
11.1
14.6
12.3
17.1
13.1
20.7
7.7
8.8
1.5
1.3
1.9
1.8
3.0
3.0
5.4
4.7
7.1
7.0
9.2
9.3
8.3
13.2
3.7
3.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

令和元年度（健保組合）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.4
3.0
5.5
5.5
7.8
8.0
9.4
12.1
11.1
14.1
12.3
16.7
12.2
20.5
7.4
8.5
1.5
1.9
1.8
1.7
3.1
2.8
4.5
4.5
6.0
6.4
7.7
9.7
10.4
11.8
3.4
3.4
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

糖尿病有病者の割合（健保組合）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	368	772	1,177	1,334	1,185	499	228	5,563
			割合（%）	3.2	5.5	8.7	11.9	15.1	17.1	21.2	8.9
		予備群該当	人数	418	818	1,045	1,103	895	376	137	4,792
			割合（%）	3.6	5.9	7.7	9.9	11.4	12.9	12.8	7.7
		非該当	人数	10,894	12,328	11,317	8,745	5,777	2,035	709	51,805
			割合（%）	93.3	88.6	83.6	78.2	73.5	69.9	66.0	83.3
		合計	人数	11,680	13,918	13,539	11,182	7,857	2,910	1,074	62,160
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	85	163	279	347	310	144	109	1,437
			割合（%）	1.2	1.8	2.9	4.7	6.5	8.6	13.2	3.6
		予備群該当	人数	91	172	300	404	324	156	78	1,525
			割合（%）	1.3	1.9	3.2	5.5	6.8	9.3	9.4	3.8
		非該当	人数	7,063	8,762	8,881	6,583	4,143	1,380	641	37,453
			割合（%）	97.6	96.3	93.9	89.8	86.7	82.1	77.4	92.7
		合計	人数	7,239	9,097	9,460	7,334	4,777	1,680	828	40,415
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	378	836	1,065	1,350	1,116	486	197	5,428
			割合（%）	3.1	5.9	8.2	12.0	14.6	17.1	20.7	8.8
		予備群該当	人数	468	786	1,020	1,160	849	350	124	4,757
			割合（%）	3.9	5.5	7.8	10.3	11.1	12.3	13.1	7.7
		非該当	人数	11,176	12,603	10,928	8,771	5,697	2,014	629	51,818
			割合（%）	93.0	88.6	84.0	77.8	74.4	70.7	66.2	83.6
		合計	人数	12,022	14,225	13,013	11,281	7,662	2,850	950	62,003
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	97	167	262	338	306	151	100	1,421
			割合（%）	1.3	1.8	3.0	4.7	7.0	9.3	13.2	3.6
		予備群該当	人数	113	178	262	390	312	149	63	1,467
			割合（%）	1.5	1.9	3.0	5.4	7.1	9.2	8.3	3.7
		非該当	人数	7,127	8,806	8,112	6,526	3,762	1,316	593	36,242
			割合（%）	97.1	96.2	93.9	90.0	85.9	81.4	78.4	92.6
		合計	人数	7,337	9,151	8,636	7,254	4,380	1,616	756	39,130
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	383	798	1,040	1,345	1,085	491	197	5,339
			割合（%）	3.0	5.5	8.0	12.1	14.1	16.7	20.5	8.5
		予備群該当	人数	429	808	1,007	1,050	855	362	117	4,628
			割合（%）	3.4	5.5	7.8	9.4	11.1	12.3	12.2	7.4
		非該当	人数	11,821	12,996	10,877	8,753	5,752	2,087	646	52,932
			割合（%）	93.6	89.0	84.2	78.5	74.8	71.0	67.3	84.2
		合計	人数	12,633	14,602	12,924	11,148	7,692	2,940	960	62,899
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	89	159	237	321	278	163	82	1,329
			割合（%）	1.2	1.7	2.8	4.5	6.4	9.7	11.8	3.4
		予備群該当	人数	115	174	267	325	259	129	72	1,341
			割合（%）	1.5	1.8	3.1	4.5	6.0	7.7	10.4	3.4
		非該当	人数	7,511	9,177	8,023	6,529	3,802	1,388	540	36,970
			割合（%）	97.4	96.5	94.1	91.0	87.6	82.6	77.8	93.3
		合計	人数	7,715	9,510	8,527	7,175	4,339	1,680	694	39,640
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○脂質異常症有病者


令和3年度（健保組合）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
47.8
52.9
56.0
57.3
57.4
58.6
60.1
54.4
21.3
27.4
42.6
55.1
61.0
65.9
69.0
41.3
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和2年度（健保組合）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
48.6
54.3
57.7
58.7
58.0
58.7
58.6
55.4
20.8
28.4
42.5
56.4
62.6
66.3
71.6
41.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和元年度（健保組合）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
46.3
51.6
54.8
56.4
55.7
57.9
56.9
52.9
18.9
26.2
40.4
55.0
59.6
65.9
67.5
39.1
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当

脂質異常症有病者の割合（健保組合）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	5,586	7,374	7,587	6,417	4,517	1,706	645	33,832
			割合（%）	47.8	52.9	56.0	57.3	57.4	58.6	60.1	54.4
		非該当	人数	6,097	6,554	5,970	4,777	3,347	1,205	428	28,378
			割合（%）	52.2	47.1	44.0	42.7	42.6	41.4	39.9	45.6
		合計	人数	11,683	13,928	13,557	11,194	7,864	2,911	1,073	62,210
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	1,543	2,500	4,038	4,046	2,920	1,112	573	16,732
			割合（%）	21.3	27.4	42.6	55.1	61.0	65.9	69.0	41.3
		非該当	人数	5,712	6,614	5,448	3,301	1,868	576	258	23,777
			割合（%）	78.7	72.6	57.4	44.9	39.0	34.1	31.0	58.7
		合計	人数	7,255	9,114	9,486	7,347	4,788	1,688	831	40,509
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	5,854	7,735	7,514	6,632	4,448	1,675	557	34,415
			割合（%）	48.6	54.3	57.7	58.7	58.0	58.7	58.6	55.4
		非該当	人数	6,179	6,506	5,516	4,659	3,227	1,178	394	27,659
			割合（%）	51.4	45.7	42.3	41.3	42.0	41.3	41.4	44.6
		合計	人数	12,033	14,241	13,030	11,291	7,675	2,853	951	62,074
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	1,532	2,603	3,677	4,093	2,747	1,073	545	16,270
			割合（%）	20.8	28.4	42.5	56.4	62.6	66.3	71.6	41.5
		非該当	人数	5,820	6,563	4,980	3,167	1,643	545	216	22,934
			割合（%）	79.2	71.6	57.5	43.6	37.4	33.7	28.4	58.5
		合計	人数	7,352	9,166	8,657	7,260	4,390	1,618	761	39,204
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	5,867	7,557	7,107	6,304	4,286	1,703	546	33,370
			割合（%）	46.3	51.6	54.8	56.4	55.7	57.9	56.9	52.9
		非該当	人数	6,802	7,086	5,861	4,873	3,414	1,239	413	29,688
			割合（%）	53.7	48.4	45.2	43.6	44.3	42.1	43.1	47.1
		合計	人数	12,669	14,643	12,968	11,177	7,700	2,942	959	63,058
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	1,462	2,494	3,458	3,969	2,600	1,113	470	15,566
			割合（%）	18.9	26.2	40.4	55.0	59.6	65.9	67.5	39
		非該当	人数	6,274	7,042	5,095	3,241	1,760	575	226	24,213
			割合（%）	81.1	73.8	59.6	45.0	40.4	34.1	32.5	60.9
		合計	人数	7,736	9,536	8,553	7,210	4,360	1,688	696	39,779
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○習慣的喫煙者


令和3年度（健保組合）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
35.6
34.1
32.0
29.4
28.0
20.6
31.5
9.1
10.0
9.0
7.5
6.7
5.6
8.5
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者


令和2年度（健保組合）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
36.5
35.0
32.3
31.1
28.5
21.2
32.4
9.8
10.7
8.5
8.0
6.9
5.7
8.8
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者


令和元年度（健保組合）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
37.7
36.3
33.2
32.5
29.0
21.3
33.5
10.1
10.4
8.7
8.2
7.0
5.5
8.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者

習慣的喫煙者の割合（健保組合）

				年代別						合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	喫煙者	人数	4,155	4,756	4,339	3,295	2,203	822	19,570
			割合（%）	35.6	34.1	32.0	29.4	28.0	20.6	31.5
		非喫煙者	人数	7,531	9,173	9,225	7,899	5,663	3,164	42,655
			割合（%）	64.4	65.9	68.0	70.6	72.0	79.4	68.5
		合計	人数	11,686	13,929	13,564	11,194	7,866	3,986	62,225
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	657	910	858	552	321	140	3,438
			割合（%）	9.1	10.0	9.0	7.5	6.7	5.6	8.5
		非喫煙者	人数	6,599	8,206	8,632	6,800	4,470	2,379	37,086
			割合（%）	90.9	90.0	91.0	92.5	93.3	94.4	91.5
		合計	人数	7,256	9,116	9,490	7,352	4,791	2,519	40,524
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	喫煙者	人数	4,393	4,979	4,213	3,507	2,187	807	20,086
			割合（%）	36.5	35.0	32.3	31.1	28.5	21.2	32.4
		非喫煙者	人数	7,641	9,263	8,817	7,787	5,489	3,000	41,997
			割合（%）	63.5	65.0	67.7	68.9	71.5	78.8	67.6
		合計	人数	12,034	14,242	13,030	11,294	7,676	3,807	62,083
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	717	985	740	582	303	135	3,462
			割合（%）	9.8	10.7	8.5	8.0	6.9	5.7	8.8
		非喫煙者	人数	6,636	8,184	7,919	6,679	4,088	2,247	35,753
			割合（%）	90.2	89.3	91.5	92.0	93.1	94.3	91.2
		合計	人数	7,353	9,169	8,659	7,261	4,391	2,382	39,215
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	喫煙者	人数	4,782	5,327	4,312	3,633	2,238	831	21,123
			割合（%）	37.7	36.3	33.2	32.5	29.0	21.3	33.5
		非喫煙者	人数	7,897	9,336	8,659	7,555	5,472	3,071	41,990
			割合（%）	62.3	63.7	66.8	67.5	71.0	78.7	66.5
		合計	人数	12,679	14,663	12,971	11,188	7,710	3,902	63,113
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	782	991	744	594	306	130	3,547
			割合（%）	10.1	10.4	8.7	8.2	7.0	5.5	8.9
		非喫煙者	人数	6,960	8,552	7,812	6,616	4,056	2,254	36,250
			割合（%）	89.9	89.6	91.3	91.8	93.0	94.5	91.1
		合計	人数	7,742	9,543	8,556	7,210	4,362	2,384	39,797
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第２版）」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、ここでは65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

（４）共済組合

ア　健診受診者及び検査項目別平均値

健診受診者数（共済組合）

			年代別							合計
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	人数	3,833	5,128	5,119	4,731	2,868	620	169	22,468
		割合（%）	17.1	22.8	22.8	21.1	12.8	2.8	0.8	100
	女性	人数	3,613	4,744	4,656	3,898	1,882	394	255	19,442
		割合（%）	18.6	24.4	24.0	20.1	9.7	2.0	1.3	100
	合計	人数	7,446	9,872	9,775	8,629	4,750	1,014	424	41,910
		割合（%）	17.8	23.6	23.3	20.6	11.3	2.4	1.0	100
令和2年度	男性	人数	3,977	5,321	4,946	4,860	2,728	532	145	22,509
		割合（%）	17.7	23.6	22.0	21.6	12.1	2.4	0.6	100
	女性	人数	3,576	4,795	4,224	3,720	1,738	331	248	18,632
		割合（%）	19.2	25.7	22.7	20.0	9.3	1.8	1.3	100
	合計	人数	7,553	10,116	9,170	8,580	4,466	863	393	41,141
		割合（%）	18.4	24.6	22.3	20.9	10.9	2.1	1.0	100
令和元年度	男性	人数	4,763	5,895	5,221	5,480	2,534	414	107	24,414
		割合（%）	19.5	24.2	21.4	22.5	10.4	1.7	0.4	100
	女性	人数	3,938	4,814	4,200	3,798	1,457	278	272	18,757
		割合（%）	21.0	25.7	22.4	20.3	7.8	1.5	1.5	100
	合計	人数	8,701	10,709	9,421	9,278	3,991	692	379	43,171
		割合（%）	20.2	24.8	21.8	21.5	9.2	1.6	0.9	100

検査項目別平均値（共済組合）

		令和3年度		令和2年度		令和元年度	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性
BMI	度数	22,468	19,442	22,509	18,632	24,414	18,756
	平均値（kg/m^2）	24.0	22.1	24.0	22.1	24.1	22.1
	標準偏差（kg/m^2）	3.5	3.8	3.5	3.8	3.4	3.7
腹囲	度数	22,466	19,424	22,509	18,615	24,410	18,753
	平均値（cm）	84.0	77.9	84.1	78.0	84.3	78.0
	標準偏差（cm）	9.3	9.9	9.2	9.9	9.1	9.7
収縮期血圧	度数	22,467	19,433	22,508	18,623	24,414	18,756
	平均値（mmHg）	123.7	116.7	124.2	117.1	123.3	115.5
	標準偏差（mmHg）	15.8	16.6	15.6	16.3	15.7	16.2
拡張期血圧	度数	22,466	19,432	22,507	18,622	24,412	18,756
	平均値（mmHg）	78.5	71.3	78.8	71.5	78.0	70.4
	標準偏差（mmHg）	11.4	11.4	11.4	11.3	11.6	11.3
中性脂肪	度数	22,465	19,439	22,505	18,631	24,412	18,754
	平均値（mg/dl）	121.6	84.2	123.2	82.8	124.0	83.3
	標準偏差（mg/dl）	87.5	52.0	92.4	51.8	90.7	53.0
HDL コレステロール	度数	22,467	19,441	22,506	18,631	24,413	18,754
	平均値（mg/dl）	59.0	72.5	58.8	72.4	58.4	71.9
	標準偏差（mg/dl）	15.2	16.6	15.1	16.6	14.7	16.3
LDL コレステロール	度数	22,466	19,439	22,505	18,630	24,412	18,753
	平均値（mg/dl）	125.6	123.3	126.8	123.6	126.0	122.0
	標準偏差（mg/dl）	30.7	30.5	30.9	30.7	30.2	30.4
GOT	度数	22,466	19,441	22,507	18,631	24,413	18,746
	平均値（IU/L）	24.2	20.6	24.2	20.4	23.9	20.4
	標準偏差（IU/L）	11.4	8.4	11.5	8.3	11.1	9.1
GPT	度数	22,466	19,441	22,507	18,631	24,413	18,746
	平均値（IU/L）	28.1	18.3	28.3	18.0	27.4	17.9
	標準偏差（IU/L）	19.4	12.8	19.8	12.9	19.6	13.9
γ-GTP	度数	22,458	19,441	22,501	18,631	24,407	18,745
	平均値（IU/L）	43.4	23.1	43.9	22.6	43.7	22.8
	標準偏差（IU/L）	48.8	24.5	48.0	24.1	47.1	24.1
空腹時血糖	度数	19,727	16,506	19,633	15,536	21,619	15,769
	平均値（mg/dl）	99.0	92.3	99.5	92.6	98.8	91.8
	標準偏差（mg/dl）	18.3	13.1	18.9	12.9	18.2	12.6
HbA1c	度数	21,037	18,408	20,982	17,590	22,838	17,668
	平均値（%）	5.6	5.5	5.7	5.6	5.6	5.5
	標準偏差（%）	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5

イ　検査項目別該当者割合

○メタボリックシンドローム該当者







メタボリックシンドローム該当者の割合（共済組合）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	337	718	919	1,000	726	163	57	3,920
			割合（%）	8.8	14.0	18.0	21.1	25.3	26.3	33.7	17.4
		予備群該当	人数	478	761	841	742	437	89	29	3,377
			割合（%）	12.5	14.8	16.4	15.7	15.2	14.4	17.2	15.0
		非該当	人数	3,017	3,648	3,359	2,989	1,705	368	83	15,169
			割合（%）	78.7	71.2	65.6	63.2	59.4	59.4	49.1	67.5
		合計	人数	3,832	5,127	5,119	4,731	2,868	620	169	22,466
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	36	104	169	229	138	36	32	744
			割合（%）	1.0	2.2	3.6	5.9	7.3	9.1	12.5	3.8
		予備群該当	人数	120	175	239	203	88	23	12	860
			割合（%）	3.3	3.7	5.1	5.2	4.7	5.8	4.7	4.4
		非該当	人数	3,448	4,460	4,248	3,464	1,654	335	211	17,820
			割合（%）	95.7	94.1	91.2	88.9	88.0	85.0	82.7	91.7
		合計	人数	3,604	4,739	4,656	3,896	1,880	394	255	19,424
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	355	743	932	1,020	695	168	44	3,957
			割合（%）	8.9	14.0	18.8	21.0	25.5	31.6	30.3	17.6
		予備群該当	人数	524	820	809	740	386	67	19	3,365
			割合（%）	13.2	15.4	16.4	15.2	14.1	12.6	13.1	14.9
		非該当	人数	3,098	3,758	3,205	3,100	1,647	297	82	15,187
			割合（%）	77.9	70.6	64.8	63.8	60.4	55.8	56.6	67.5
		合計	人数	3,977	5,321	4,946	4,860	2,728	532	145	22,509
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	43	118	153	189	131	31	33	698
			割合（%）	1.2	2.5	3.6	5.1	7.6	9.4	13.3	3.7
		予備群該当	人数	98	165	200	207	80	24	12	786
			割合（%）	2.7	3.4	4.7	5.6	4.6	7.3	4.8	4.2
		非該当	人数	3,429	4,510	3,871	3,319	1,524	275	203	17,131
			割合（%）	96.1	94.1	91.6	89.3	87.8	83.3	81.9	92.0
		合計	人数	3,570	4,793	4,224	3,715	1,735	330	248	18,615
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	447	785	931	1,167	637	125	28	4,120
			割合（%）	9.4	13.3	17.8	21.3	25.1	30.3	26.4	16.9
		予備群該当	人数	670	928	874	881	390	71	22	3,836
			割合（%）	14.1	15.7	16.7	16.1	15.4	17.2	20.8	15.7
		非該当	人数	3,646	4,181	3,416	3,431	1,507	217	56	16,454
			割合（%）	76.5	70.9	65.4	62.6	59.5	52.5	52.8	67.4
		合計	人数	4,763	5,894	5,221	5,479	2,534	413	106	24,410
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	50	100	163	183	102	22	41	661
			割合（%）	1.3	2.1	3.9	4.8	7.0	7.9	15.1	3.5
		予備群該当	人数	106	160	197	183	77	13	15	751
			割合（%）	2.7	3.3	4.7	4.8	5.3	4.7	5.5	4.0
		非該当	人数	3,780	4,554	3,839	3,430	1,278	243	216	17,340
			割合（%）	96.0	94.6	91.4	90.4	87.7	87.4	79.4	92.5
		合計	人数	3,936	4,814	4,199	3,796	1,457	278	272	18,752
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○肥満該当者


令和3年度（共済組合）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
4.4
8.0
24.4
4.5
9.2
29.1
4.5
11.6
31.0
3.1
13.3
30.7
2.8
15.9
30.2
3.2
18.0
28.0
3.9
11.6
29.2
8.0
0.4
7.0
8.5
0.6
8.4
8.5
1.2
11.2
7.8
2.4
12.1
6.5
2.4
11.9
7.7
3.4
13.4
8.1
1.3
10.1
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上


令和2年度（共済組合）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
4.2
7.9
26.0
4.8
9.9
28.9
3.5
11.5
32.2
3.4
13.7
29.7
3.3
16.0
28.4
3.1
19.2
28.4
3.9
11.7
29.2
7.8
0.6
6.8
8.7
0.5
8.9
9.1
0.9
11.2
7.8
1.9
11.9
7.4
2.4
12.2
7.3
3.3
15.1
8.3
1.1
10.1
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上


令和元年度（共済組合）
男性
女性
肥満該当者割合（%）
60
50
40
30
20
10
0
4.2
8.0
26.9
4.3
10.0
29.5
3.5
11.9
32.5
3.0
14.3
30.6
3.0
16.8
29.7
2.3
20.8
31.0
3.6
11.9
30.0
7.1
0.5
7.1
8.9
0.7
8.9
8.7
1.3
11.2
7.4
1.6
11.2
8.0
2.6
12.5
4.7
3.8
13.6
8.0
1.2
9.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
肥満該当者判定
腹囲が基準以上かつBMIが25以上
腹囲のみ基準以上
BMIのみ25以上

肥満該当者の割合(共済組合)

					年代別						合計
					40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	170	233	228	145	80	25	881
				割合(%)	4.4	4.5	4.5	3.1	2.8	3.2	3.9
			腹囲のみ基準以上	人数	308	474	594	628	455	142	2,601
				割合(%)	8.0	9.2	11.6	13.3	15.9	18.0	11.6
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	934	1,493	1,589	1,453	867	221	6,557
				割合(%)	24.4	29.1	31.0	30.7	30.2	28.0	29.2
		非該当		人数	2,420	2,927	2,708	2,505	1,466	401	12,427
				割合(%)	63.2	57.1	52.9	52.9	51.1	50.8	55.3
		合計		人数	3,832	5,127	5,119	4,731	2,868	789	22,466
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	289	401	398	305	123	50	1,566
				割合(%)	8.0	8.5	8.5	7.8	6.5	7.7	8.1
			腹囲のみ基準以上	人数	14	27	55	93	46	22	257
				割合(%)	0.4	0.6	1.2	2.4	2.4	3.4	1.3
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	253	398	523	473	224	87	1,958
				割合(%)	7.0	8.4	11.2	12.1	11.9	13.4	10.1
		非該当		人数	3,048	3,913	3,680	3,025	1,487	490	15,643
				割合(%)	84.6	82.6	79.0	77.6	79.1	75.5	80.5
		合計		人数	3,604	4,739	4,656	3,896	1,880	649	19,424
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	166	258	173	165	89	21	872
				割合(%)	4.2	4.8	3.5	3.4	3.3	3.1	3.9
			腹囲のみ基準以上	人数	313	527	570	667	437	130	2,644
				割合(%)	7.9	9.9	11.5	13.7	16.0	19.2	11.7
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	1,034	1,539	1,591	1,445	776	192	6,577
				割合(%)	26.0	28.9	32.2	29.7	28.4	28.4	29.2
		非該当		人数	2,464	2,997	2,612	2,583	1,426	334	12,416
				割合(%)	62.0	56.3	52.8	53.1	52.3	49.3	55.2
		合計		人数	3,977	5,321	4,946	4,860	2,728	677	22,509
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	280	415	386	288	129	42	1,540
				割合(%)	7.8	8.7	9.1	7.8	7.4	7.3	8.3
			腹囲のみ基準以上	人数	21	24	36	70	42	19	212
				割合(%)	0.6	0.5	0.9	1.9	2.4	3.3	1.1
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	242	426	472	442	211	87	1,880
				割合(%)	6.8	8.9	11.2	11.9	12.2	15.1	10.1
		非該当		人数	3,027	3,928	3,330	2,915	1,353	430	14,983
				割合(%)	84.8	82.0	78.8	78.5	78.0	74.4	80.5
		合計		人数	3,570	4,793	4,224	3,715	1,735	578	18,615
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	200	256	181	164	75	12	888
				割合(%)	4.2	4.3	3.5	3.0	3.0	2.3	3.6
			腹囲のみ基準以上	人数	379	592	619	783	426	108	2,907
				割合(%)	8.0	10.0	11.9	14.3	16.8	20.8	11.9
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	1,283	1,739	1,697	1,679	753	161	7,312
				割合(%)	26.9	29.5	32.5	30.6	29.7	31.0	30.0
		非該当		人数	2,901	3,307	2,724	2,853	1,280	238	13,303
				割合(%)	60.9	56.1	52.2	52.1	50.5	45.9	54.5
		合計		人数	4,763	5,894	5,221	5,479	2,534	519	24,410
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	肥満該当	BMIのみ25以上	人数	278	427	365	280	116	26	1,492
				割合(%)	7.1	8.9	8.7	7.4	8.0	4.7	8.0
			腹囲のみ基準以上	人数	18	32	53	60	38	21	222
				割合(%)	0.5	0.7	1.3	1.6	2.6	3.8	1.2
			腹囲基準以上かつBMIが25以上	人数	278	428	472	426	182	75	1,861
				割合(%)	7.1	8.9	11.2	11.2	12.5	13.6	9.9
		非該当		人数	3,362	3,926	3,310	3,030	1,121	428	15,177
				割合(%)	85.4	81.6	78.8	79.8	76.9	77.8	80.9
		合計		人数	3,936	4,813	4,200	3,796	1,457	550	18,752
				割合(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、ここでは65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

○高血圧症有病者


令和3年度（共済組合）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
14.6
13.8
23.9
15.7
32.2
13.2
40.2
13.4
51.3
11.8
55.2
13.7
71.0
14.2
32.3
13.8
5.5
6.3
11.3
8.5
17.2
9.9
25.0
11.2
31.8
12.0
41.6
14.5
59.2
18.4
17.6
9.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

令和2年度（共済組合）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
15.2
13.5
24.4
14.5
32.7
14.7
40.0
13.9
49.6
12.4
57.5
14.1
69.0
10.3
32.1
13.9
5.6
6.1
10.9
8.9
16.9
10.8
25.3
11.2
31.3
12.8
45.3
16.9
59.3
14.5
17.3
9.8
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当


令和元年度（共済組合）
男性
女性
高血圧症有病者割合（%）
100
80
60
40
20
0
14.9
12.9
22.6
13.7
31.1
13.9
40.1
12.5
48.7
12.9
55.8
13.3
60.7
10.3
30.3
13.2
5.0
6.4
9.5
7.9
16.1
9.9
23.2
10.5
28.1
10.8
43.2
16.2
52.6
16.9
15.4
9.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
高血圧症有病者判定
基準該当
予備群該当

高血圧症有病者の割合（共済組合）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	560	1,226	1,646	1,901	1,471	342	120	7,266
			割合（%）	14.6	23.9	32.2	40.2	51.3	55.2	71.0	32.3
		予備群該当	人数	529	803	677	636	338	85	24	3,092
			割合（%）	13.8	15.7	13.2	13.4	11.8	13.7	14.2	13.8
		非該当	人数	2,744	3,099	2,796	2,194	1,059	193	25	12,110
			割合（%）	71.6	60.4	54.6	46.4	36.9	31.1	14.8	53.9
		合計	人数	3,833	5,128	5,119	4,731	2,868	620	169	22,468
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	200	538	800	975	599	164	151	3,427
			割合（%）	5.5	11.3	17.2	25.0	31.8	41.6	59.2	17.6
		予備群該当	人数	226	403	462	435	226	57	47	1,856
			割合（%）	6.3	8.5	9.9	11.2	12.0	14.5	18.4	9.6
		非該当	人数	3,187	3,802	3,391	2,484	1,057	173	57	14,151
			割合（%）	88.2	80.2	72.9	63.8	56.2	43.9	22.4	72.8
		合計	人数	3,613	4,743	4,653	3,894	1,882	394	255	19,434
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	605	1,300	1,617	1,946	1,353	306	100	7,227
			割合（%）	15.2	24.4	32.7	40.0	49.6	57.5	69.0	32.1
		予備群該当	人数	537	770	728	674	338	75	15	3,137
			割合（%）	13.5	14.5	14.7	13.9	12.4	14.1	10.3	13.9
		非該当	人数	2,835	3,251	2,601	2,240	1,037	151	30	12,145
			割合（%）	71.3	61.1	52.6	46.1	38.0	28.4	20.7	54.0
		合計	人数	3,977	5,321	4,946	4,860	2,728	532	145	22,509
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	200	524	715	941	544	150	147	3,221
			割合（%）	5.6	10.9	16.9	25.3	31.3	45.3	59.3	17.3
		予備群該当	人数	219	425	454	416	223	56	36	1,829
			割合（%）	6.1	8.9	10.8	11.2	12.8	16.9	14.5	9.8
		非該当	人数	3,157	3,844	3,052	2,361	970	125	65	13,574
			割合（%）	88.3	80.2	72.3	63.5	55.8	37.8	26.2	72.9
		合計	人数	3,576	4,793	4,221	3,718	1,737	331	248	18,624
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	712	1,333	1,625	2,200	1,233	231	65	7,399
			割合（%）	14.9	22.6	31.1	40.1	48.7	55.8	60.7	30.3
		予備群該当	人数	613	809	727	686	326	55	11	3,227
			割合（%）	12.9	13.7	13.9	12.5	12.9	13.3	10.3	13.2
		非該当	人数	3,438	3,753	2,869	2,594	975	128	31	13,788
			割合（%）	72.2	63.7	55.0	47.3	38.5	30.9	29.0	56.5
		合計	人数	4,763	5,895	5,221	5,480	2,534	414	107	24,414
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	197	456	674	880	410	120	143	2,880
			割合（%）	5.0	9.5	16.1	23.2	28.1	43.2	52.6	15.4
		予備群該当	人数	251	379	417	397	157	45	46	1,692
			割合（%）	6.4	7.9	9.9	10.5	10.8	16.2	16.9	9.0
		非該当	人数	3,490	3,979	3,108	2,521	890	113	83	14,184
			割合（%）	88.6	82.7	74.0	66.4	61.1	40.6	30.5	75.6
		合計	人数	3,938	4,814	4,199	3,798	1,457	278	272	18,756
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○糖尿病有病者

令和3年度（共済組合）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
2.7
2.1
5.5
4.0
7.3
8.1
9.6
10.8
10.9
14.0
13.0
15.9
17.8
17.8
7.3
7.7
0.9
0.9
2.1
1.8
3.1
2.5
4.7
4.6
7.2
5.8
8.0
9.5
11.1
8.7
3.4
3.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

令和2年度（共済組合）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.1
2.3
5.2
4.4
8.3
7.9
9.8
10.4
11.8
14.1
13.3
17.0
15.3
18.8
7.6
7.6
1.2
1.2
2.1
1.7
2.8
2.5
5.3
4.4
7.8
6.2
9.2
9.2
7.0
8.6
3.4
2.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当


令和元年度（共済組合）
男性
女性
糖尿病有病者割合（%）
50
40
30
20
10
0
3.6
2.4
5.0
4.5
8.0
7.5
9.8
11.1
11.6
13.5
11.5
15.2
12.1
21.5
7.3
7.4
1.1
1.1
2.0
1.5
3.1
2.6
4.7
4.2
5.7
6.1
8.8
7.0
8.2
12.4
3.1
2.7
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
糖尿病有病者判定
基準該当
予備群該当

糖尿病有病者の割合（共済組合）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	81	203	413	511	401	98	30	1,737
			割合（%）	2.1	4.0	8.1	10.8	14.0	15.9	17.8	7.7
		予備群該当	人数	104	283	371	456	312	80	30	1,636
			割合（%）	2.7	5.5	7.3	9.6	10.9	13.0	17.8	7.3
		非該当	人数	3,637	4,636	4,329	3,759	2,147	439	109	19,056
			割合（%）	95.2	90.5	84.7	79.5	75.1	71.2	64.5	85.0
		合計	人数	3,822	5,122	5,113	4,726	2,860	617	169	22,429
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	24	83	116	180	108	37	22	570
			割合（%）	0.7	1.8	2.5	4.6	5.8	9.5	8.7	3.0
		予備群該当	人数	34	99	144	182	134	31	28	652
			割合（%）	0.9	2.1	3.1	4.7	7.2	8.0	11.1	3.4
		非該当	人数	3,529	4,536	4,374	3,518	1,619	320	202	18,098
			割合（%）	98.4	96.1	94.4	90.7	87.0	82.5	80.2	93.7
		合計	人数	3,587	4,718	4,634	3,880	1,861	388	252	19,320
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	基準該当	人数	90	234	391	504	383	90	27	1,719
			割合（%）	2.3	4.4	7.9	10.4	14.1	17.0	18.8	7.6
		予備群該当	人数	123	275	408	477	322	70	22	1,697
			割合（%）	3.1	5.2	8.3	9.8	11.8	13.3	15.3	7.6
		非該当	人数	3,756	4,805	4,143	3,875	2,017	368	95	19,059
			割合（%）	94.6	90.4	83.8	79.8	74.1	69.7	66.0	84.8
		合計	人数	3,969	5,314	4,942	4,856	2,722	528	144	22,475
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	21	83	104	162	107	30	21	528
			割合（%）	0.6	1.7	2.5	4.4	6.2	9.2	8.6	2.9
		予備群該当	人数	44	102	116	194	135	30	17	638
			割合（%）	1.2	2.1	2.8	5.3	7.8	9.2	7.0	3.4
		非該当	人数	3,487	4,580	3,980	3,335	1,485	266	206	17,339
			割合（%）	98.2	96.1	94.8	90.4	86.0	81.6	84.4	93.7
		合計	人数	3,552	4,765	4,200	3,691	1,727	326	244	18,505
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	基準該当	人数	113	263	391	609	343	62	23	1,804
			割合（%）	2.4	4.5	7.5	11.1	13.5	15.2	21.5	7.4
		予備群該当	人数	170	295	416	536	294	47	13	1,771
			割合（%）	3.6	5.0	8.0	9.8	11.6	11.5	12.1	7.3
		非該当	人数	4,470	5,335	4,410	4,327	1,895	300	71	20,808
			割合（%）	94.0	90.5	84.5	79.1	74.8	73.3	66.4	85.3
		合計	人数	4,753	5,893	5,217	5,472	2,532	409	107	24,383
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	基準該当	人数	27	72	108	159	88	19	33	506
			割合（%）	0.7	1.5	2.6	4.2	6.1	7.0	12.4	2.7
		予備群該当	人数	44	94	131	178	83	24	22	576
			割合（%）	1.1	2.0	3.1	4.7	5.7	8.8	8.2	3.1
		非該当	人数	3,845	4,631	3,926	3,437	1,278	230	212	17,559
			割合（%）	98.2	96.5	94.3	91.1	88.2	84.2	79.4	94.2
		合計	人数	3,916	4,797	4,165	3,774	1,449	273	267	18,641
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

○脂質異常症有病者


令和3年度（共済組合）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
43.8
52.8
55.7
57.4
59.5
55.6
60.9
53.9
18.4
25.1
40.5
54.3
61.2
62.4
69.8
38.2
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和2年度（共済組合）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
45.8
53.6
56.4
58.6
59.8
57.4
62.1
54.8
17.8
26.2
41.1
54.2
60.2
63.7
68.1
37.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当


令和元年度（共済組合）
男性
女性
脂質異常症有病者割合（%）
80
60
40
20
0
45.5
51.3
55.3
57.3
58.2
58.2
43.0
53.2
16.7
24.5
39.6
52.9
60.5
66.9
65.8
36.0
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
合計
年齢
脂質異常症有病者判定
基準該当

脂質異常症有病者の割合（共済組合）

				年代別							合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
令和3年度	男性	基準該当	人数	1,677	2,709	2,852	2,717	1,706	345	103	12,109
			割合（%）	43.8	52.8	55.7	57.4	59.5	55.6	60.9	54
		非該当	人数	2,154	2,419	2,267	2,013	1,162	275	66	10,356
			割合（%）	56.2	47.2	44.3	42.6	40.5	44.4	39.1	46
		合計	人数	3,831	5,128	5,119	4,730	2,868	620	169	22,465
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
	女性	基準該当	人数	664	1,192	1,885	2,117	1,151	246	178	7,433
			割合（%）	18.4	25.1	40.5	54.3	61.2	62.4	69.8	38
		非該当	人数	2,949	3,549	2,771	1,780	731	148	77	12,005
			割合（%）	81.6	74.9	59.5	45.7	38.8	37.6	30.2	62
		合計	人数	3,613	4,741	4,656	3,897	1,882	394	255	19,438
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
令和2年度	男性	基準該当	人数	1,820	2,854	2,791	2,849	1,630	305	90	12,339
			割合（%）	45.8	53.6	56.4	58.6	59.8	57.4	62.1	55
		非該当	人数	2,157	2,467	2,154	2,010	1,098	226	55	10,167
			割合（%）	54.2	46.4	43.6	41.4	40.2	42.6	37.9	45
		合計	人数	3,977	5,321	4,945	4,859	2,728	531	145	22,506
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
	女性	基準該当	人数	636	1,254	1,735	2,015	1,045	211	169	7,065
			割合（%）	17.8	26.2	41.1	54.2	60.2	63.7	68.1	38
		非該当	人数	2,937	3,541	2,487	1,705	692	120	79	11,561
			割合（%）	82.2	73.8	58.9	45.8	39.8	36.3	31.9	62
		合計	人数	3,573	4,795	4,222	3,720	1,737	331	248	18,626
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
令和元年度	男性	基準該当	人数	2,167	3,027	2,885	3,140	1,476	241	46	12,982
			割合（%）	45.5	51.3	55.3	57.3	58.2	58.2	43.0	53
		非該当	人数	2,596	2,868	2,336	2,339	1,058	173	61	11,431
			割合（%）	54.5	48.7	44.7	42.7	41.8	41.8	57.0	47
		合計	人数	4,763	5,895	5,221	5,479	2,534	414	107	24,413
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100
	女性	基準該当	人数	658	1,178	1,661	2,009	882	186	179	6,753
			割合（%）	16.7	24.5	39.6	52.9	60.5	66.9	65.8	36
		非該当	人数	3,280	3,635	2,535	1,789	575	92	93	11,999
			割合（%）	83.3	75.5	60.4	47.1	39.5	33.1	34.2	64
		合計	人数	3,938	4,813	4,196	3,798	1,457	278	272	18,752
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100

○習慣的喫煙者


令和3年度（共済組合）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
22.3
23.2
22.7
20.7
18.2
14.7
21.5
2.8
3.5
2.2
2.5
2.1
2.3
2.7
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者


令和2年度（共済組合）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
22.9
24.0
23.5
21.4
18.3
15.4
22.2
3.2
3.1
2.2
2.4
2.0
1.7
2.6
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者


令和元年度（共済組合）
男性
女性
習慣的喫煙者割合（%）
60
40
20
0
24.4
24.7
24.2
22.3
19.0
15.2
23.2
3.6
3.1
2.5
2.9
2.3
2.2
2.9
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-74
合計
年齢
習慣的喫煙者の割合
喫煙者

習慣的喫煙者の割合（共済組合）

				年代別						合計
				40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	※65-74歳	
令和3年度	男性	喫煙者	人数	855	1,192	1,162	978	521	116	4,824
			割合（%）	22.3	23.2	22.7	20.7	18.2	14.7	21.5
		非喫煙者	人数	2,977	3,936	3,957	3,753	2,346	672	17,641
			割合（%）	77.7	76.8	77.3	79.3	81.8	85.3	78.5
		合計	人数	3,832	5,128	5,119	4,731	2,867	788	22,465
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	102	165	104	99	39	15	524
			割合（%）	2.8	3.5	2.2	2.5	2.1	2.3	2.7
		非喫煙者	人数	3,511	4,578	4,552	3,798	1,843	634	18,916
			割合（%）	97.2	96.5	97.8	97.5	97.9	97.7	97.3
		合計	人数	3,613	4,743	4,656	3,897	1,882	649	19,440
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和2年度	男性	喫煙者	人数	909	1,276	1,160	1,041	500	104	4,990
			割合（%）	22.9	24.0	23.5	21.4	18.3	15.4	22.2
		非喫煙者	人数	3,068	4,045	3,786	3,819	2,228	573	17,519
			割合（%）	77.1	76.0	76.5	78.6	81.7	84.6	77.8
		合計	人数	3,977	5,321	4,946	4,860	2,728	677	22,509
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	113	149	93	90	34	10	489
			割合（%）	3.2	3.1	2.2	2.4	2.0	1.7	2.6
		非喫煙者	人数	3,460	4,645	4,129	3,628	1,703	569	18,134
			割合（%）	96.8	96.9	97.8	97.6	98.0	98.3	97.4
		合計	人数	3,573	4,794	4,222	3,718	1,737	579	18,623
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
令和元年度	男性	喫煙者	人数	1,163	1,456	1,262	1,223	481	79	5,664
			割合（%）	24.4	24.7	24.2	22.3	19.0	15.2	23.2
		非喫煙者	人数	3,600	4,439	3,959	4,256	2,053	442	18,749
			割合（%）	75.6	75.3	75.8	77.7	81.0	84.8	76.8
		合計	人数	4,763	5,895	5,221	5,479	2,534	521	24,413
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	女性	喫煙者	人数	142	150	104	111	33	12	552
			割合（%）	3.6	3.1	2.5	2.9	2.3	2.2	2.9
		非喫煙者	人数	3,796	4,664	4,094	3,687	1,424	538	18,203
			割合（%）	96.4	96.9	97.5	97.1	97.7	97.8	97.1
		合計	人数	3,938	4,814	4,198	3,798	1,457	550	18,755
			割合（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が10人未満の集計単位とならないよう、ここでは65歳から74歳までの集計結果を表示しています。

Ⅲ　詳細情報

1　岐阜県全体

（1）　特定健診の状況

1－1　保健指導区分(令和3年度)

	男性						女性					
	情報提供		動機づけ支援		積極的支援		情報提供		動機づけ支援		積極的支援	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	40,322	76.9	4,411	8.4	7,727	14.7	42,795	92.4	2,207	4.8	1,338	2.9
羽島市	6,780	76.2	754	8.5	1,359	15.3	6,468	90.5	427	6.0	256	3.6
各務原市	14,963	77.0	1,704	8.8	2,760	14.2	14,353	92.3	771	5.0	424	2.7
山県市	2,588	79.0	248	7.6	439	13.4	2,679	92.3	144	5.0	80	2.8
瑞穂市	5,534	77.0	584	8.1	1,067	14.9	5,430	91.6	315	5.3	184	3.1
本巣市	3,463	75.4	405	8.8	723	15.8	3,477	91.3	220	5.8	113	3.0
岐南町	2,399	75.0	289	9.0	512	16.0	2,358	91.1	143	5.5	87	3.4
笠松町	2,165	76.9	239	8.5	412	14.6	2,151	90.5	150	6.3	76	3.2
北方町	1,692	76.5	180	8.1	339	15.3	1,813	92.2	95	4.8	58	3.0
大垣市	15,374	76.1	1,675	8.3	3,148	15.6	15,258	91.2	934	5.6	543	3.2
海津市	3,538	77.5	370	8.1	660	14.5	3,281	92.0	172	4.8	114	3.2
養老町	2,870	75.6	342	9.0	587	15.5	2,853	88.7	221	6.9	142	4.4
垂井町	2,520	76.3	265	8.0	518	15.7	2,530	90.5	170	6.1	97	3.5
関ケ原町	652	77.8	63	7.5	123	14.7	710	90.0	50	6.3	29	3.7
神戸町	2,397	76.3	303	9.7	440	14.0	2,101	90.9	136	5.9	75	3.2
輪之内町	1,025	76.6	102	7.6	211	15.8	1,037	90.4	57	5.0	53	4.6
安八町	1,672	74.8	214	9.6	348	15.6	1,555	90.3	100	5.8	68	4.0
揖斐川町	2,052	75.9	252	9.3	398	14.7	2,256	90.0	156	6.2	95	3.8
大野町	2,193	75.4	243	8.4	471	16.2	2,242	90.3	146	5.9	94	3.8
池田町	2,334	75.0	258	8.3	521	16.7	2,317	91.2	133	5.2	90	3.5
関市	8,594	77.7	891	8.1	1,581	14.3	8,343	92.3	445	4.9	253	2.8
美濃市	1,978	80.1	181	7.3	311	12.6	1,945	91.8	116	5.5	58	2.7
郡上市	4,880	77.8	459	7.3	933	14.9	5,241	91.8	284	5.0	186	3.3
美濃加茂市	5,455	76.8	539	7.6	1,105	15.6	5,243	91.4	314	5.5	182	3.2
可児市	10,081	76.1	1,093	8.3	2,073	15.7	9,708	90.2	644	6.0	415	3.9
坂祝町	846	78.9	74	6.9	152	14.2	809	91.4	49	5.5	27	3.1
富加町	611	80.7	51	6.7	95	12.6	630	93.1	※47, 6.9%			
川辺町	1,141	79.1	109	7.6	193	13.4	1,034	92.0	50	4.5	40	3.6
七宗町	415	84.0	30	6.1	49	9.9	454	93.8	※30, 6.2%			
八百津町	1,167	78.6	123	8.3	194	13.1	1,118	91.5	64	5.2	40	3.3
白川町	835	81.2	69	6.7	125	12.2	832	92.9	36	4.0	28	3.1
東白川村	223	83.2	※45, 16.8%				246	92.1	※21 7.9%			
御嵩町	2,098	76.8	216	7.9	419	15.3	1,898	90.4	117	5.6	85	4.1
多治見市	11,815	79.0	1,152	7.7	1,984	13.3	11,966	92.5	621	4.8	344	2.7
瑞浪市	3,937	78.5	364	7.3	714	14.2	3,942	91.6	223	5.2	138	3.2
土岐市	6,500	78.5	642	7.8	1,140	13.8	6,144	91.4	350	5.2	230	3.4
中津川市	8,657	79.2	747	6.8	1,523	13.9	8,332	92.1	450	5.0	261	2.9
恵那市	5,449	79.9	433	6.4	940	13.8	5,381	91.6	300	5.1	195	3.3
高山市	10,440	81.2	825	6.4	1,587	12.4	10,887	93.2	535	4.6	266	2.3
飛騨市	3,178	82.5	242	6.3	433	11.2	3,267	93.9	151	4.3	63	1.8
下呂市	3,705	81.2	262	5.7	595	13.0	4,062	94.2	153	3.6	96	2.2
白川村	186	76.9	21	8.7	35	14.5	204	89.9	※23, 10.1%			

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、動機づけ支援と積極的支援の合計値を表示しています。

１－２　保健指導区分(令和2年度)

	男性						女性					
	情報提供		動機づけ支援		積極的支援		情報提供		動機づけ支援		積極的支援	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	38,859	75.7	4,481	8.7	7,979	15.6	41,069	91.8	2,252	5.0	1,412	3.2
羽島市	6,323	75.4	720	8.6	1,347	16.1	5,946	90.8	378	5.8	226	3.5
各務原市	14,328	76.1	1,635	8.7	2,861	15.2	13,580	91.6	814	5.5	438	3.0
山県市	2,517	78.3	254	7.9	445	13.8	2,555	92.2	137	4.9	80	2.9
瑞穂市	5,346	76.4	582	8.3	1,070	15.3	5,182	92.2	276	4.9	163	2.9
本巣市	3,369	75.4	389	8.7	710	15.9	3,413	91.5	196	5.3	120	3.2
岐南町	2,267	75.2	268	8.9	479	15.9	2,217	92.2	115	4.8	72	3.0
笠松町	2,060	75.4	236	8.6	436	16.0	2,110	91.3	130	5.6	72	3.1
北方町	1,581	75.2	177	8.4	344	16.4	1,746	92.8	80	4.3	55	2.9
大垣市	14,426	75.2	1,660	8.7	3,104	16.2	14,096	90.5	898	5.8	574	3.7
海津市	3,391	75.6	385	8.6	710	15.8	3,157	91.2	176	5.1	128	3.7
養老町	2,758	75.1	324	8.8	591	16.1	2,742	89.0	201	6.5	137	4.5
垂井町	2,445	75.7	255	7.9	530	16.4	2,361	90.8	143	5.5	97	3.7
関ケ原町	651	78.1	61	7.3	122	14.6	699	90.0	41	5.3	37	4.8
神戸町	2,197	77.6	235	8.3	401	14.2	1,988	89.5	153	6.9	81	3.7
輪之内町	960	75.5	105	8.3	206	16.2	1,011	91.0	58	5.2	42	3.8
安八町	1,602	74.4	195	9.1	356	16.5	1,499	90.1	97	5.8	67	4.0
揖斐川町	2,098	77.5	210	7.8	400	14.8	2,243	91.4	136	5.5	75	3.1
大野町	2,082	74.4	221	7.9	494	17.7	2,167	90.6	135	5.6	91	3.8
池田町	2,268	74.7	248	8.2	521	17.2	2,238	89.8	169	6.8	85	3.4
関市	8,276	77.0	835	7.8	1,642	15.3	7,790	92.2	406	4.8	256	3.0
美濃市	1,903	78.4	185	7.6	340	14.0	1,838	92.5	93	4.7	56	2.8
郡上市	4,771	77.8	441	7.2	924	15.1	5,039	91.8	272	5.0	176	3.2
美濃加茂市	5,054	74.9	538	8.0	1,153	17.1	4,849	92.1	269	5.1	146	2.8
可児市	9,477	75.0	1,110	8.8	2,049	16.2	8,997	90.6	581	5.9	351	3.5
坂祝町	882	75.3	97	8.3	193	16.5	675	90.9	39	5.3	29	3.9
富加町	523	77.7	49	7.3	101	15.0	531	93.2	※39 6.8%			
川辺町	1,102	78.1	104	7.4	206	14.6	987	92.9	44	4.1	31	2.9
七宗町	363	78.1	41	8.8	61	13.1	404	93.7	※27, 6.3%			
八百津町	1,112	77.9	119	8.3	196	13.7	1,078	92.2	58	5.0	33	2.8
白川町	861	81.5	77	7.3	118	11.2	865	93.8	34	3.7	23	2.5
東白川村	226	84.3	※42, 15.7%				243	-	＜20	-	＜20	-
御嵩町	1,967	75.6	234	9.0	402	15.4	1,839	90.5	115	5.7	79	3.9
多治見市	11,170	78.3	1,136	8.0	1,955	13.7	11,165	92.4	599	5.0	318	2.6
瑞浪市	3,675	77.8	339	7.2	711	15.1	3,688	91.7	229	5.7	103	2.6
土岐市	6,037	77.9	600	7.8	1,109	14.3	5,710	91.3	311	5.0	233	3.7
中津川市	8,401	79.0	735	6.9	1,494	14.1	7,989	91.8	455	5.2	257	3.0
恵那市	5,188	78.8	438	6.7	961	14.6	5,045	91.2	295	5.3	190	3.4
高山市	9,850	80.5	801	6.5	1,590	13.0	10,130	93.5	469	4.3	240	2.2
飛騨市	3,090	81.7	251	6.6	441	11.7	3,119	94.4	115	3.5	69	2.1
下呂市	3,602	80.5	282	6.3	591	13.2	3,939	93.0	171	4.0	125	3.0
白川村	177	72.2	30	12.2	38	15.5	196	88.7	※25, 11.3%			

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、動機づけ支援と積極的支援の合計値を表示しています。またこの合計値も20人未満の場合は、それぞれの集計値をマスクしています。

１－３　保健指導区分(令和元年度)

	男性						女性					
	情報提供		動機づけ支援		積極的支援		情報提供		動機づけ支援		積極的支援	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	38,778	76.2	4,381	8.6	7,703	15.1	40,905	92.3	2,125	4.8	1,282	2.9
羽島市	6,354	75.9	744	8.9	1,276	15.2	6,084	90.3	388	5.8	263	3.9
各務原市	14,447	76.5	1,697	9.0	2,742	14.5	13,574	91.9	753	5.1	438	3.0
山県市	2,572	78.2	249	7.6	468	14.2	2,600	91.9	137	4.8	92	3.3
瑞穂市	5,320	76.8	578	8.4	1,028	14.8	5,074	92.4	262	4.8	157	2.9
本巣市	3,581	76.5	400	8.5	703	15.0	3,515	92.4	189	5.0	101	2.7
岐南町	2,362	76.1	270	8.7	474	15.3	2,244	92.2	112	4.6	77	3.2
笠松町	2,072	77.1	222	8.3	394	14.7	2,085	90.9	134	5.8	75	3.3
北方町	1,641	76.2	190	8.8	323	15.0	1,755	92.6	90	4.8	50	2.6
大垣市	14,711	75.5	1,666	8.6	3,115	16.0	14,089	91.1	869	5.6	500	3.2
海津市	3,485	77.4	363	8.1	652	14.5	3,234	92.5	168	4.8	96	2.7
養老町	2,828	75.6	312	8.3	603	16.1	2,768	90.1	187	6.1	118	3.8
垂井町	2,427	74.8	281	8.7	535	16.5	2,336	90.7	145	5.6	96	3.7
関ケ原町	670	77.4	75	8.7	121	14.0	748	89.8	52	6.2	33	4.0
神戸町	1,990	77.6	220	8.6	353	13.8	1,943	90.4	116	5.4	90	4.2
輪之内町	946	75.0	112	8.9	204	16.2	927	92.0	52	5.2	29	2.9
安八町	1,570	75.2	182	8.7	335	16.1	1,550	91.7	84	5.0	57	3.4
揖斐川町	2,233	77.6	242	8.4	404	14.0	2,369	91.2	140	5.4	89	3.4
大野町	2,162	75.4	251	8.8	454	15.8	2,181	91.2	122	5.1	88	3.7
池田町	2,330	75.5	255	8.3	501	16.2	2,348	92.0	142	5.6	62	2.4
関市	8,551	77.5	875	7.9	1,613	14.6	8,004	92.3	400	4.6	268	3.1
美濃市	1,978	78.9	194	7.7	336	13.4	1,916	92.4	102	4.9	55	2.7
郡上市	4,846	78.7	391	6.4	920	14.9	5,077	92.2	278	5.1	151	2.7
美濃加茂市	5,408	76.6	550	7.8	1,104	15.6	4,868	92.1	275	5.2	143	2.7
可児市	9,951	76.6	1,052	8.1	1,988	15.3	9,453	91.4	550	5.3	340	3.3
坂祝町	1,178	78.1	107	7.1	224	14.8	854	91.9	41	4.4	34	3.7
富加町	635	82.6	54	7.0	80	10.4	589	93.5	※41, 6.5%			
川辺町	1,124	78.4	106	7.4	203	14.2	1,027	92.9	49	4.4	30	2.7
七宗町	402	80.9	39	7.9	56	11.3	426	93.8	※28, 6.2%			
八百津町	1,149	79.3	95	6.6	205	14.2	1,140	91.6	55	4.4	49	3.9
白川町	809	81.1	63	6.3	125	12.5	875	94.0	27	2.9	29	3.1
東白川村	200	82.6	※42, 17.4%				240	-	＜20	-	＜20	-
御嵩町	1,959	76.6	201	7.9	396	15.5	1,836	90.6	119	5.9	71	3.5
多治見市	11,995	79.6	1,183	7.9	1,889	12.5	11,804	93.2	562	4.4	300	2.4
瑞浪市	3,764	78.4	343	7.2	692	14.4	3,683	92.0	208	5.2	114	2.9
土岐市	5,877	78.6	574	7.7	1,024	13.7	5,683	91.2	340	5.5	211	3.4
中津川市	8,511	78.8	807	7.5	1,480	13.7	8,296	92.6	429	4.8	232	2.6
恵那市	5,388	79.3	456	6.7	947	13.9	5,320	91.9	309	5.3	163	2.8
高山市	10,140	80.2	884	7.0	1,619	12.8	10,831	94.1	471	4.1	214	1.9
飛騨市	3,153	82.3	246	6.4	434	11.3	3,172	94.0	135	4.0	68	2.0
下呂市	3,813	81.9	265	5.7	579	12.4	4,110	94.0	159	3.6	105	2.4
白川村	174	73.7	23	9.8	39	16.5	200	88.5	※26, 11.5%			

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、動機づけ支援と積極的支援の合計値を表示しています。またこの合計値も20人未満の場合は、それぞれの集計値をマスクしています。

２－１　メタボリックシンドローム区分(令和3年度)

	男性						女性					
	非該当		予備群該当		基準該当		非該当		予備群該当		基準該当	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	30,906	58.9	9,114	17.4	12,440	23.7	40,960	88.4	2,239	4.8	3,142	6.8
羽島市	5,120	57.6	1,550	17.4	2,223	25.0	6,106	85.4	410	5.7	635	8.9
各務原市	11,621	59.8	3,433	17.7	4,372	22.5	13,642	87.7	787	5.1	1,120	7.2
山県市	1,887	57.6	591	18.1	797	24.3	2,488	85.7	180	6.2	234	8.1
瑞穂市	4,438	61.8	1,213	16.9	1,534	21.4	5,170	87.2	325	5.5	434	7.3
本巣市	2,684	58.5	820	17.9	1,087	23.7	3,304	86.7	224	5.9	282	7.4
岐南町	1,891	59.1	605	18.9	704	22.0	2,310	89.3	139	5.4	139	5.4
笠松町	1,622	57.6	538	19.1	656	23.3	2,046	86.1	139	5.9	192	8.1
北方町	1,322	59.8	384	17.4	505	22.8	1,740	88.5	96	4.9	130	6.6
大垣市	12,041	59.6	3,607	17.9	4,550	22.5	14,633	87.4	954	5.7	1,149	6.9
海津市	2,594	56.8	790	17.3	1,184	25.9	3,064	85.9	210	5.9	293	8.2
養老町	2,121	55.8	707	18.6	971	25.6	2,698	83.9	227	7.1	291	9.1
垂井町	1,944	58.9	577	17.5	782	23.7	2,422	86.6	168	6.0	207	7.4
関ケ原町	490	58.5	133	15.9	215	25.7	669	84.8	42	5.3	78	9.9
神戸町	1,867	59.4	555	17.7	719	22.9	1,973	85.3	144	6.2	195	8.4
輪之内町	767	57.3	222	16.6	349	26.1	988	86.1	63	5.5	96	8.4
安八町	1,295	58.0	405	18.1	534	23.9	1,450	84.2	123	7.1	150	8.7
揖斐川町	1,475	54.6	507	18.8	719	26.6	2,126	84.8	153	6.1	228	9.1
大野町	1,679	57.8	528	18.2	700	24.1	2,148	86.5	153	6.2	181	7.3
池田町	1,858	59.7	538	17.3	717	23.0	2,223	87.5	134	5.3	183	7.2
関市	6,621	59.8	1,920	17.4	2,526	22.8	7,997	88.5	456	5.0	588	6.5
美濃市	1,552	62.8	396	16.0	523	21.2	1,886	89.0	91	4.3	142	6.7
郡上市	3,805	60.7	1,041	16.6	1,426	22.7	5,038	88.2	290	5.1	384	6.7
美濃加茂市	4,325	60.9	1,203	17.0	1,571	22.1	5,069	88.3	310	5.4	361	6.3
可児市	8,191	61.8	2,181	16.5	2,876	21.7	9,404	87.3	642	6.0	721	6.7
坂祝町	627	58.5	174	16.2	271	25.3	756	85.4	69	7.8	60	6.8
富加町	454	60.0	137	18.1	166	21.9	593	87.5	36	5.3	49	7.2
川辺町	887	61.5	225	15.6	331	22.9	992	88.3	57	5.1	75	6.7
七宗町	316	64.0	85	17.2	93	18.8	432	89.3	※52, 10.7%			
八百津町	870	58.6	272	18.3	342	23.1	1,067	87.3	67	5.5	88	7.2
白川町	696	67.6	150	14.6	183	17.8	803	89.6	40	4.5	53	5.9
東白川村	163	60.8	48	17.9	57	21.3	223	83.5	21	7.9	23	8.6
御嵩町	1,652	60.5	457	16.7	624	22.8	1,825	86.9	129	6.1	146	7.0
多治見市	9,240	61.8	2,432	16.3	3,279	21.9	11,555	89.4	531	4.1	845	6.5
瑞浪市	3,173	63.3	805	16.1	1,037	20.7	3,867	89.9	188	4.4	248	5.8
土岐市	5,281	63.8	1,333	16.1	1,668	20.1	5,979	88.9	314	4.7	431	6.4
中津川市	6,808	62.3	1,733	15.9	2,386	21.8	8,055	89.1	437	4.8	551	6.1
恵那市	4,282	62.8	986	14.5	1,554	22.8	5,268	89.7	258	4.4	350	6.0
高山市	8,629	67.1	1,949	15.2	2,274	17.7	10,704	91.6	473	4.1	511	4.4
飛騨市	2,575	66.8	548	14.2	730	19.0	3,127	89.8	145	4.2	209	6.0
下呂市	2,963	65.0	654	14.3	945	20.7	3,890	90.2	165	3.8	256	5.9
白川村	135	55.8	54	22.3	53	21.9	196	86.3	※31, 13.7%			

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、予備群該当と基準該当の合計値を表示しています。

２－２　メタボリックシンドローム区分(令和2年度)

	男性						女性			
	非該当		予備群該当		基準該当		非該当		※基準該当（予備群含む）	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	30,011	58.5	9,123	17.8	12,186	23.8	39,220	87.7	5,514	12.3
羽島市	4,825	57.5	1,485	17.7	2,080	24.8	5,627	85.9	923	14.1
各務原市	11,221	59.6	3,312	17.6	4,291	22.8	12,928	87.2	1,906	12.9
山県市	1,819	56.6	563	17.5	834	25.9	2,351	84.8	421	15.2
瑞穂市	4,300	61.5	1,186	17.0	1,512	21.6	4,941	87.9	680	12.1
本巣市	2,615	58.5	797	17.8	1,056	23.6	3,268	87.6	461	12.4
岐南町	1,797	59.6	554	18.4	663	22.0	2,140	89.0	264	11.0
笠松町	1,554	56.9	530	19.4	648	23.7	1,990	86.1	322	13.9
北方町	1,218	57.9	360	17.1	524	24.9	1,666	88.6	215	11.4
大垣市	11,536	60.1	3,364	17.5	4,290	22.4	13,678	87.8	1,893	12.2
海津市	2,508	55.9	827	18.4	1,151	25.7	2,927	84.6	534	15.4
養老町	2,087	56.8	643	17.5	943	25.7	2,579	83.7	501	16.3
垂井町	1,930	59.8	565	17.5	735	22.8	2,283	87.8	318	12.2
関ケ原町	494	59.2	139	16.7	201	24.1	663	85.3	114	14.7
神戸町	1,677	59.2	497	17.5	659	23.3	1,874	84.3	348	15.7
輪之内町	737	58.0	238	18.7	296	23.3	967	87.0	144	13.0
安八町	1,245	57.8	390	18.1	518	24.1	1,404	84.4	259	15.6
揖斐川町	1,553	57.4	478	17.7	677	25.0	2,119	86.4	335	13.7
大野町	1,612	57.6	499	17.8	686	24.5	2,079	86.9	314	13.1
池田町	1,793	59.0	502	16.5	743	24.5	2,182	87.6	310	12.4
関市	6,362	59.2	1,874	17.4	2,516	23.4	7,461	88.3	990	11.7
美濃市	1,480	61.0	413	17.0	535	22.0	1,785	89.8	202	10.2
郡上市	3,778	61.6	962	15.7	1,398	22.8	4,854	88.5	633	11.5
美濃加茂市	4,033	59.8	1,231	18.3	1,481	22.0	4,706	89.4	558	10.6
可児市	7,672	60.7	2,178	17.2	2,786	22.1	8,734	88.0	1,195	12.0
坂祝町	692	59.0	213	18.2	267	22.8	629	84.7	114	15.3
富加町	379	56.3	120	17.8	174	25.9	486	85.3	84	14.7
川辺町	872	61.8	241	17.1	299	21.2	923	86.9	139	13.1
七宗町	265	57.0	96	20.7	104	22.4	385	89.3	46	10.7
八百津町	855	59.9	260	18.2	312	21.9	999	85.5	170	14.5
白川町	696	65.9	158	15.0	202	19.1	838	90.9	84	9.1
東白川村	168	62.7	48	17.9	52	19.4	209	81.0	49	19.0
御嵩町	1,551	59.6	466	17.9	586	22.5	1,768	87.0	265	13.0
多治見市	8,831	61.9	2,287	16.0	3,143	22.0	10,811	89.5	1,272	10.5
瑞浪市	2,937	62.2	748	15.8	1,040	22.0	3,616	90.0	404	10.1
土岐市	4,931	63.7	1,209	15.6	1,605	20.7	5,572	89.1	682	10.9
中津川市	6,625	62.3	1,703	16.0	2,302	21.7	7,755	89.1	946	10.9
恵那市	4,130	62.7	982	14.9	1,475	22.4	4,958	89.7	572	10.3
高山市	8,180	66.8	1,890	15.4	2,171	17.7	10,027	92.5	812	7.5
飛騨市	2,517	66.6	556	14.7	709	18.8	2,991	90.6	312	9.5
下呂市	2,955	66.0	673	15.0	847	18.9	3,829	90.4	407	9.6
白川村	127	51.8	56	22.9	62	25.3	187	84.6	34	15.3

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、予備群該当と基準該当の合計値を表示しています。

２－３　メタボリックシンドローム区分(令和元年度)

	男性						女性					
	非該当		予備群該当		基準該当		非該当		予備群該当		基準該当	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	30,493	59.9	8,927	17.5	11,474	22.5	39,363	88.8	2,055	4.6	2,905	6.6
羽島市	4,964	59.3	1,481	17.7	1,932	23.1	5,783	85.8	358	5.3	598	8.9
各務原市	11,651	61.5	3,330	17.6	3,962	20.9	12,976	87.8	801	5.4	1,006	6.8
山県市	1,921	58.4	570	17.3	798	24.3	2,423	85.7	171	6.0	235	8.3
瑞穂市	4,371	63.1	1,168	16.9	1,388	20.0	4,830	87.9	290	5.3	374	6.8
本巣市	2,830	60.4	785	16.8	1,070	22.8	3,369	88.5	183	4.8	253	6.7
岐南町	1,867	60.1	546	17.6	695	22.4	2,190	89.9	113	4.6	132	5.4
笠松町	1,587	59.0	501	18.6	603	22.4	1,975	86.1	138	6.0	181	7.9
北方町	1,273	59.1	384	17.8	498	23.1	1,653	87.1	103	5.4	141	7.4
大垣市	11,887	61.0	3,496	17.9	4,113	21.1	13,701	88.6	843	5.5	917	5.9
海津市	2,644	58.7	806	17.9	1,054	23.4	3,039	86.9	205	5.9	255	7.3
養老町	2,150	57.4	693	18.5	900	24.0	2,614	85.1	195	6.4	264	8.6
垂井町	1,940	59.8	593	18.3	710	21.9	2,272	88.2	122	4.7	183	7.1
関ケ原町	523	60.4	141	16.3	202	23.3	728	87.3	42	5.0	64	7.7
神戸町	1,551	60.5	461	18.0	552	21.5	1,819	84.6	146	6.8	184	8.6
輪之内町	728	57.7	237	18.8	296	23.5	882	87.5	52	5.2	74	7.3
安八町	1,217	58.3	399	19.1	471	22.6	1,451	85.8	108	6.4	132	7.8
揖斐川町	1,708	59.3	532	18.5	641	22.3	2,258	86.9	140	5.4	202	7.8
大野町	1,720	60.0	519	18.1	630	22.0	2,119	88.6	117	4.9	157	6.6
池田町	1,889	61.2	525	17.0	673	21.8	2,276	89.2	136	5.3	141	5.5
関市	6,729	60.9	1,913	17.3	2,416	21.9	7,665	88.4	424	4.9	584	6.7
美濃市	1,599	63.7	412	16.4	499	19.9	1,854	89.4	86	4.1	135	6.5
郡上市	3,901	63.3	909	14.8	1,350	21.9	4,942	89.8	255	4.6	308	5.6
美濃加茂市	4,394	62.2	1,227	17.4	1,449	20.5	4,741	89.7	261	4.9	285	5.4
可児市	8,230	63.3	2,163	16.6	2,612	20.1	9,236	89.3	559	5.4	549	5.3
坂祝町	966	63.9	254	16.8	291	19.3	805	86.7	55	5.9	69	7.4
富加町	492	64.0	111	14.4	166	21.6	552	87.6	39	6.2	39	6.2
川辺町	919	64.0	235	16.4	283	19.7	981	88.6	67	6.1	59	5.3
七宗町	298	59.7	99	19.8	102	20.4	409	90.1	※45, 9.9%			
八百津町	908	62.5	248	17.1	296	20.4	1,066	85.6	83	6.7	96	7.7
白川町	667	66.8	158	15.8	173	17.3	840	90.2	36	3.9	55	5.9
東白川村	137	56.6	43	17.8	62	25.6	212	81.9	24	9.3	23	8.9
御嵩町	1,567	61.2	435	17.0	560	21.9	1,796	88.7	109	5.4	121	6.0
多治見市	9,549	63.3	2,393	15.9	3,135	20.8	11,355	89.6	521	4.1	794	6.3
瑞浪市	3,084	64.2	749	15.6	974	20.3	3,605	89.9	200	5.0	206	5.1
土岐市	4,832	64.6	1,177	15.7	1,472	19.7	5,578	89.4	304	4.9	356	5.7
中津川市	6,875	63.7	1,679	15.6	2,245	20.8	8,067	90.0	385	4.3	508	5.7
恵那市	4,314	63.5	1,039	15.3	1,440	21.2	5,178	89.4	269	4.6	348	6.0
高山市	8,603	68.0	1,973	15.6	2,071	16.4	10,686	92.8	434	3.8	396	3.4
飛騨市	2,606	68.0	548	14.3	679	17.7	3,069	90.9	127	3.8	179	5.3
下呂市	3,090	66.3	679	14.6	891	19.1	3,944	90.2	190	4.3	241	5.5
白川村	131	55.5	50	21.2	55	23.3	203	89.8	※23, 10.2%			

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第２版」（令和５年10月　厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、予備群該当と基準該当の合計値を表示しています。

3－1　BMI(令和3年度)

	男性										女性									
	低体重 BMI<18.5		普通体重 18.5≦BMI<25		肥満度１度 25≦BMI<30		肥満度２度 30≦BMI<35		肥満度３度～4度 35≦BMI		低体重 BMI<18.5		普通体重 18.5≦BMI<25		肥満度１度 25≦BMI<30		肥満度２度 30≦BMI<35		肥満度３度～4度 35≦BMI	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	1,581	3.0	32,540	62.0	15,073	28.7	2,707	5.2	564	1.1	6,163	13.3	31,405	67.8	6,940	15.0	1,489	3.2	350	0.8
羽島市	276	3.1	5,323	59.9	2,670	30.0	531	6.0	93	1.0	871	12.2	4,660	65.1	1,241	17.3	314	4.4	67	0.9
各務原市	582	3.0	12,106	62.3	5,576	28.7	960	4.9	206	1.1	1,844	11.9	10,579	68.0	2,500	16.1	497	3.2	128	0.8
山県市	118	3.6	2,021	61.7	946	28.9	157	4.8	34	1.0	338	11.6	1,953	67.3	487	16.8	105	3.6	20	0.7
瑞穂市	229	3.2	4,456	62.0	2,042	28.4	377	5.2	81	1.1	750	12.6	3,931	66.3	972	16.4	199	3.4	78	1.3
本巣市	154	3.4	2,778	60.5	1,373	29.9	242	5.3	44	1.0	419	11.0	2,589	67.9	651	17.1	127	3.3	25	0.7
岐南町	102	3.2	1,911	59.7	964	30.1	181	5.7	42	1.3	333	12.9	1,768	68.3	383	14.8	79	3.1	25	1.0
笠松町	110	3.9	1,699	60.3	807	28.7	163	5.8	37	1.3	318	13.4	1,543	64.9	386	16.2	107	4.5	23	1.0
北方町	71	3.2	1,353	61.2	626	28.3	125	5.7	36	1.6	240	12.2	1,356	69.0	286	14.5	70	3.6	<20	-
大垣市	668	3.3	12,352	61.1	5,818	28.8	1,126	5.6	237	1.2	2,087	12.5	11,165	66.7	2,693	16.1	632	3.8	164	1.0
海津市	163	3.6	2,750	60.2	1,323	29.0	263	5.8	69	1.5	379	10.6	2,356	66.0	665	18.6	125	3.5	42	1.2
養老町	122	3.2	2,253	59.3	1,177	31.0	210	5.5	37	1.0	363	11.3	2,070	64.3	586	18.2	150	4.7	48	1.5
垂井町	110	3.3	2,030	61.5	901	27.3	215	6.5	47	1.4	292	10.4	1,848	66.0	525	18.8	100	3.6	33	1.2
関ケ原町	34	4.1	519	61.9	234	27.9	46	5.5	<20	-	78	9.9	520	65.9	164	20.8	21	2.7	<20	-
神戸町	84	2.7	1,928	61.4	919	29.3	183	5.8	27	0.9	256	11.1	1,563	67.6	385	16.7	79	3.4	29	1.3
輪之内町	32	2.4	779	58.2	426	31.8	88	6.6	<20	-	129	11.2	727	63.4	235	20.5	45	3.9	<20	-
安八町	62	2.8	1,346	60.3	681	30.5	118	5.3	27	1.2	201	11.7	1,147	66.6	283	16.4	77	4.5	<20	-
揖斐川町	83	3.1	1,607	59.5	834	30.9	151	5.6	26	1.0	247	9.9	1,672	66.7	484	19.3	78	3.1	26	1.0
大野町	107	3.7	1,702	58.5	904	31.1	158	5.4	36	1.2	308	12.4	1,626	65.5	432	17.4	94	3.8	22	0.9
池田町	98	3.1	1,899	61.0	906	29.1	174	5.6	36	1.2	276	10.9	1,692	66.6	436	17.2	111	4.4	25	1.0
関市	346	3.1	6,935	62.7	3,127	28.3	544	4.9	116	1.0	1,051	11.6	6,188	68.4	1,421	15.7	319	3.5	66	0.7
美濃市	81	3.3	1,607	65.0	669	27.1	96	3.9	<20	-	266	12.5	1,448	68.3	325	15.3	72	3.4	<20	-
郡上市	170	2.7	3,917	62.5	1,839	29.3	278	4.4	68	1.1	586	10.3	3,968	69.5	952	16.7	172	3.0	34	0.6
美濃加茂市	235	3.3	4,476	63.0	1,967	27.7	349	4.9	73	1.0	699	12.2	3,899	67.9	901	15.7	195	3.4	46	0.8
可児市	440	3.3	8,376	63.2	3,652	27.6	646	4.9	136	1.0	1,408	13.1	7,163	66.5	1,740	16.2	371	3.4	86	0.8
坂祝町	31	2.9	682	63.6	298	27.8	53	4.9	<20	-	116	13.1	583	65.8	139	15.7	38	4.3	<20	-
富加町	28	3.7	477	63.0	196	25.9	50	6.6	<20	-	65	9.6	470	69.3	116	17.1	24	3.5	<20	-
川辺町	43	3.0	929	64.4	393	27.2	64	4.4	<20	-	150	13.3	762	67.8	180	16.0	27	2.4	<20	-
七宗町	29	5.9	318	64.4	124	25.1	22	4.5	<20	-	68	14.0	321	66.3	86	17.8	<20	-	<20	-
八百津町	59	4.0	952	64.2	395	26.6	64	4.3	<20	-	157	12.8	832	68.1	185	15.1	46	3.8	<20	-
白川町	33	3.2	709	68.9	244	23.7	38	3.7	<20	-	117	13.1	629	70.2	124	13.8	23	2.6	<20	-
東白川村	<20	-	173	64.6	73	27.2	<20	-	<20	-	22	8.2	194	72.7	40	15.0	<20	-	<20	-
御嵩町	102	3.7	1,678	61.4	778	28.5	145	5.3	31	1.1	264	12.6	1,386	66.0	354	16.9	71	3.4	25	1.2
多治見市	502	3.4	9,605	64.2	4,037	27.0	669	4.5	137	0.9	1,723	13.3	8,834	68.3	1,888	14.6	395	3.1	95	0.7
瑞浪市	179	3.6	3,228	64.4	1,340	26.7	220	4.4	48	1.0	571	13.3	2,949	68.5	635	14.8	114	2.6	36	0.8
土岐市	314	3.8	5,374	64.9	2,153	26.0	364	4.4	77	0.9	880	13.1	4,473	66.5	1,059	15.8	254	3.8	57	0.8
中津川市	372	3.4	7,052	64.5	2,938	26.9	467	4.3	97	0.9	1,134	12.5	6,172	68.2	1,415	15.6	259	2.9	64	0.7
恵那市	247	3.6	4,517	66.2	1,728	25.3	269	3.9	61	0.9	753	12.8	3,993	67.9	924	15.7	164	2.8	45	0.8
高山市	417	3.2	8,291	64.5	3,471	27.0	553	4.3	120	0.9	1,590	13.6	8,021	68.6	1,710	14.6	299	2.6	70	0.6
飛騨市	128	3.3	2,508	65.1	1,045	27.1	146	3.8	26	0.7	473	13.6	2,343	67.3	527	15.1	114	3.3	25	0.7
下呂市	183	4.0	3,032	66.5	1,169	25.6	148	3.2	30	0.7	615	14.3	2,960	68.6	573	13.3	136	3.2	28	0.6
白川村	<20	-	121	50.0	93	38.4	21	8.7	<20	-	20	8.8	151	66.5	44	19.4	<20	-	<20	-

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が20人未満の場合は値をマスクしています。

3－2　BMI(令和2年度)

	男性										女性									
	低体重 BMI<18.5		普通体重 18.5≦BMI<25		肥満度１度 25≦BMI<30		肥満度２度 30≦BMI<35		肥満度３度～4度 35≦BMI		低体重 BMI<18.5		普通体重 18.5≦BMI<25		肥満度１度 25≦BMI<30		肥満度２度 30≦BMI<35		肥満度３度～4度 35≦BMI	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	1,436	2.8	31,821	62.0	14,895	29.0	2,629	5.1	539	1.1	5,598	12.5	30,422	68.0	6,904	15.4	1,462	3.3	357	0.8
羽島市	263	3.1	4,992	59.5	2,563	30.5	482	5.7	90	1.1	730	11.1	4,348	66.4	1,144	17.5	268	4.1	61	0.9
各務原市	533	2.8	11,776	62.6	5,375	28.6	931	4.9	211	1.1	1,693	11.4	10,092	68.0	2,448	16.5	475	3.2	128	0.9
山県市	109	3.4	1,977	61.5	943	29.3	157	4.9	30	0.9	305	11.0	1,870	67.4	489	17.6	93	3.4	16	0.6
瑞穂市	193	2.8	4,402	62.9	1,967	28.1	369	5.3	68	1.0	717	12.8	3,716	66.1	952	16.9	180	3.2	58	1.0
本巣市	129	2.9	2,732	61.1	1,335	29.9	229	5.1	43	1.0	411	11.0	2,523	67.7	648	17.4	114	3.1	33	0.9
岐南町	89	3.0	1,790	59.4	948	31.5	150	5.0	37	1.2	281	11.7	1,649	68.6	373	15.5	81	3.4	20	0.8
笠松町	91	3.3	1,666	61.0	794	29.1	147	5.4	34	1.2	296	12.8	1,510	65.3	387	16.7	93	4.0	26	1.1
北方町	59	2.8	1,269	60.4	627	29.8	120	5.7	27	1.3	229	12.2	1,311	69.7	257	13.7	72	3.8	<20	-
大垣市	581	3.0	11,718	61.1	5,617	29.3	1,063	5.5	213	1.1	1,871	12.0	10,476	67.3	2,498	16.0	579	3.7	150	1.0
海津市	141	3.1	2,642	58.9	1,390	31.0	247	5.5	65	1.4	343	9.9	2,248	65.0	701	20.3	130	3.8	39	1.1
養老町	105	2.9	2,199	59.9	1,129	30.7	205	5.6	36	1.0	334	10.8	1,988	64.5	588	19.1	132	4.3	38	1.2
垂井町	99	3.1	1,982	61.4	903	28.0	202	6.3	44	1.4	244	9.4	1,774	68.2	452	17.4	109	4.2	22	0.8
関ケ原町	28	3.4	523	62.7	228	27.3	49	5.9	<20	-	80	10.3	519	66.8	148	19.0	25	3.2	<20	-
神戸町	86	3.0	1,727	61.0	832	29.4	160	5.6	28	1.0	222	10.0	1,496	67.3	408	18.4	74	3.3	23	1.0
輪之内町	42	3.3	730	57.4	401	31.5	81	6.4	<20	-	112	10.1	724	65.2	218	19.6	43	3.9	<20	-
安八町	60	2.8	1,291	60.0	650	30.2	123	5.7	29	1.3	195	11.7	1,103	66.3	283	17.0	68	4.1	<20	-
揖斐川町	88	3.2	1,642	60.6	802	29.6	139	5.1	37	1.4	246	10.0	1,652	67.3	444	18.1	94	3.8	<20	-
大野町	100	3.6	1,665	59.5	867	31.0	136	4.9	29	1.0	274	11.4	1,610	67.3	399	16.7	90	3.8	21	0.9
池田町	95	3.1	1,854	61.0	874	28.8	175	5.8	40	1.3	278	11.2	1,634	65.6	457	18.3	98	3.9	25	1.0
関市	338	3.1	6,697	62.3	3,095	28.8	510	4.7	114	1.1	938	11.1	5,786	68.4	1,361	16.1	304	3.6	64	0.8
美濃市	73	3.0	1,551	63.9	684	28.2	98	4.0	22	0.9	239	12.0	1,396	70.2	291	14.6	49	2.5	<20	-
郡上市	173	2.8	3,881	63.2	1,744	28.4	280	4.6	61	1.0	544	9.9	3,854	70.2	907	16.5	155	2.8	28	0.5
美濃加茂市	231	3.4	4,254	63.1	1,867	27.7	330	4.9	63	0.9	641	12.2	3,623	68.8	791	15.0	163	3.1	47	0.9
可児市	428	3.4	7,964	63.0	3,547	28.1	587	4.6	112	0.9	1,257	12.7	6,709	67.6	1,557	15.7	330	3.3	77	0.8
坂祝町	29	2.5	721	61.5	348	29.7	62	5.3	<20	-	75	10.1	502	67.6	131	17.6	30	4.0	<20	-
富加町	<20	-	397	59.0	204	30.3	49	7.3	<20	-	41	7.2	406	71.2	102	17.9	<20	-	<20	-
川辺町	43	3.0	920	65.2	387	27.4	53	3.8	<20	-	141	13.3	728	68.5	154	14.5	32	3.0	<20	-
七宗町	<20	-	293	63.0	127	27.3	23	4.9	<20	-	49	11.4	299	69.4	75	17.4	<20	-	<20	-
八百津町	59	4.1	928	65.0	370	25.9	59	4.1	<20	-	139	11.9	798	68.3	191	16.3	39	3.3	<20	-
白川町	35	3.3	742	70.3	245	23.2	28	2.7	<20	-	112	12.1	653	70.8	133	14.4	22	2.4	<20	-
東白川村	<20	-	180	67.2	67	25.0	<20	-	<20	-	20	7.8	186	72.1	46	17.8	<20	-	<20	-
御嵩町	95	3.6	1,613	62.0	725	27.9	138	5.3	32	1.2	217	10.7	1,388	68.3	341	16.8	65	3.2	22	1.1
多治見市	478	3.4	9,186	64.4	3,858	27.1	625	4.4	112	0.8	1,524	12.6	8,389	69.4	1,748	14.5	339	2.8	85	0.7
瑞浪市	152	3.2	3,040	64.3	1,287	27.2	198	4.2	48	1.0	494	12.3	2,785	69.3	590	14.7	120	3.0	30	0.7
土岐市	277	3.6	5,059	65.3	2,002	25.8	345	4.5	64	0.8	788	12.6	4,197	67.1	983	15.7	236	3.8	50	0.8
中津川市	370	3.5	6,907	65.0	2,824	26.6	442	4.2	88	0.8	1,045	12.0	5,977	68.7	1,363	15.7	261	3.0	56	0.6
恵那市	238	3.6	4,317	65.5	1,725	26.2	258	3.9	49	0.7	641	11.6	3,826	69.2	862	15.6	165	3.0	37	0.7
高山市	390	3.2	7,978	65.2	3,248	26.5	531	4.3	94	0.8	1,498	13.8	7,507	69.3	1,509	13.9	270	2.5	56	0.5
飛騨市	116	3.1	2,411	63.7	1,083	28.6	154	4.1	<20	-	424	12.8	2,268	68.7	497	15.0	91	2.8	23	0.7
下呂市	173	3.9	2,982	66.6	1,131	25.3	154	3.4	35	0.8	565	13.3	2,937	69.3	583	13.8	127	3.0	25	0.6
白川村	<20	-	122	49.8	98	40.0	20	8.2	<20	-	<20	-	150	67.3	36	16.1	<20	-	<20	-

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が20人未満の場合は値をマスクしています。

3－3　BMI(令和元年度)

	男性										女性									
	低体重 BMI<18.5		普通体重 18.5≦BMI<25		肥満度１度 25≦BMI<30		肥満度２度 30≦BMI<35		肥満度３度～4度 35≦BMI		低体重 BMI<18.5		普通体重 18.5≦BMI<25		肥満度１度 25≦BMI<30		肥満度２度 30≦BMI<35		肥満度３度～4度 35≦BMI	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	1,435	2.8	32,272	63.4	14,302	28.1	2,424	4.8	462	0.9	5,613	12.7	30,511	68.8	6,571	14.8	1,316	3.0	318	0.7
羽島市	274	3.3	5,129	61.2	2,473	29.5	409	4.9	92	1.1	752	11.2	4,464	66.2	1,213	18.0	258	3.8	52	0.8
各務原市	602	3.2	11,982	63.2	5,320	28.1	852	4.5	190	1.0	1,689	11.4	10,191	68.9	2,349	15.9	447	3.0	108	0.7
山県市	109	3.3	2,086	63.4	938	28.5	127	3.9	29	0.9	312	11.0	1,921	67.9	480	17.0	96	3.4	20	0.7
瑞穂市	208	3.0	4,413	63.7	1,903	27.5	333	4.8	70	1.0	656	11.9	3,743	68.1	868	15.8	165	3.0	64	1.2
本巣市	153	3.3	2,901	61.9	1,381	29.5	202	4.3	48	1.0	413	10.9	2,634	69.2	620	16.3	113	3.0	25	0.7
岐南町	95	3.1	1,854	59.7	966	31.1	160	5.1	33	1.1	287	11.8	1,701	69.9	359	14.7	74	3.0	14	0.6
笠松町	102	3.8	1,661	61.7	764	28.4	133	4.9	31	1.2	301	13.1	1,494	65.1	381	16.6	94	4.1	26	1.1
北方町	61	2.8	1,340	62.2	603	28.0	125	5.8	26	1.2	210	11.1	1,327	69.9	281	14.8	66	3.5	<20	-
大垣市	629	3.2	12,127	62.2	5,524	28.3	1,023	5.2	194	1.0	1,855	12.0	10,472	67.7	2,495	16.1	509	3.3	133	0.9
海津市	150	3.3	2,719	60.4	1,341	29.8	233	5.2	61	1.4	333	9.5	2,387	68.2	630	18.0	117	3.3	33	0.9
養老町	108	2.9	2,259	60.4	1,146	30.6	208	5.6	22	0.6	318	10.3	2,046	66.6	541	17.6	134	4.4	34	1.1
垂井町	105	3.2	1,993	61.5	923	28.5	175	5.4	47	1.4	245	9.5	1,768	68.6	456	17.7	83	3.2	25	1.0
関ケ原町	35	4.0	551	63.6	228	26.3	45	5.2	<20	-	82	9.8	573	68.8	147	17.6	26	3.1	<20	-
神戸町	81	3.2	1,638	63.9	702	27.4	122	4.8	21	0.8	211	9.8	1,461	68.0	367	17.1	92	4.3	<20	-
輪之内町	32	2.5	754	59.7	386	30.6	77	6.1	<20	-	111	11.0	669	66.4	184	18.3	31	3.1	<20	-
安八町	58	2.8	1,273	61.0	624	29.9	107	5.1	25	1.2	181	10.7	1,159	68.5	277	16.4	65	3.8	<20	-
揖斐川町	94	3.3	1,738	60.3	871	30.2	142	4.9	36	1.2	268	10.3	1,730	66.6	498	19.2	86	3.3	<20	-
大野町	103	3.6	1,740	60.6	864	30.1	138	4.8	25	0.9	268	11.2	1,626	67.9	398	16.6	74	3.1	27	1.1
池田町	85	2.8	1,936	62.7	873	28.3	158	5.1	35	1.1	304	11.9	1,712	67.1	430	16.8	82	3.2	25	1.0
関市	351	3.2	7,011	63.4	3,096	28.0	506	4.6	93	0.8	978	11.3	5,993	69.1	1,364	15.7	277	3.2	63	0.7
美濃市	83	3.3	1,613	64.3	699	27.8	96	3.8	<20	-	243	11.7	1,447	69.7	328	15.8	44	2.1	<20	-
郡上市	193	3.1	3,931	63.8	1,732	28.1	244	4.0	61	1.0	545	9.9	3,891	70.7	886	16.1	157	2.9	27	0.5
美濃加茂市	238	3.4	4,508	63.7	1,954	27.6	297	4.2	75	1.1	620	11.7	3,680	69.6	789	14.9	156	3.0	42	0.8
可児市	403	3.1	8,390	64.5	3,556	27.3	559	4.3	97	0.7	1,216	11.8	7,143	69.0	1,592	15.4	318	3.1	76	0.7
坂祝町	43	2.8	979	64.7	405	26.8	67	4.4	<20	-	99	10.7	639	68.8	149	16.0	33	3.6	<20	-
富加町	22	2.9	485	63.1	216	28.1	37	4.8	<20	-	55	8.7	455	72.2	97	15.4	22	3.5	<20	-
川辺町	47	3.3	930	64.7	394	27.4	52	3.6	<20	-	145	13.1	758	68.5	164	14.8	38	3.4	<20	-
七宗町	26	5.2	315	63.1	132	26.5	24	4.8	<20	-	63	13.9	318	70.0	67	14.8	<20	-	<20	-
八百津町	64	4.4	953	65.6	365	25.1	59	4.1	<20	-	153	12.3	843	67.7	203	16.3	42	3.4	<20	-
白川町	31	3.1	717	71.8	218	21.8	26	2.6	<20	-	116	12.5	664	71.3	123	13.2	22	2.4	<20	-
東白川村	<20	-	159	65.7	63	26.0	<20	-	<20	-	<20	-	180	69.5	53	20.5	<20	-	<20	-
御嵩町	90	3.5	1,640	64.0	697	27.2	114	4.4	21	0.8	226	11.2	1,402	69.2	321	15.8	56	2.8	21	1.0
多治見市	543	3.6	9,888	65.6	3,894	25.8	645	4.3	108	0.7	1,602	12.6	8,882	70.0	1,766	13.9	348	2.7	83	0.7
瑞浪市	181	3.8	3,146	65.4	1,231	25.6	203	4.2	46	1.0	475	11.8	2,826	70.5	574	14.3	102	2.5	34	0.8
土岐市	293	3.9	4,948	66.1	1,904	25.5	283	3.8	53	0.7	762	12.2	4,250	68.1	958	15.4	219	3.5	49	0.8
中津川市	370	3.4	7,185	66.5	2,755	25.5	400	3.7	90	0.8	1,111	12.4	6,186	69.0	1,336	14.9	270	3.0	58	0.6
恵那市	254	3.7	4,564	67.2	1,684	24.8	250	3.7	41	0.6	685	11.8	4,023	69.4	900	15.5	154	2.7	33	0.6
高山市	417	3.3	8,396	66.4	3,236	25.6	504	4.0	97	0.8	1,554	13.5	8,050	69.9	1,594	13.8	260	2.3	59	0.5
飛騨市	132	3.4	2,521	65.8	1,014	26.5	146	3.8	20	0.5	466	13.8	2,298	68.1	497	14.7	96	2.8	<20	-
下呂市	184	3.9	3,165	67.9	1,127	24.2	156	3.3	29	0.6	631	14.4	3,034	69.3	570	13.0	122	2.8	19	0.4
白川村	<20	-	122	51.7	90	38.1	20	8.5	<20	-	<20	-	156	69.0	35	15.5	<20	-	<20	-

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が20人未満の場合は値をマスクしています。

（２）　生活習慣病重症化予防のためのレセプトと特定健診との突合（市町村別）

1　高血圧症

※令和2年度　岐阜市（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計	318007 人
年代別	人数(T)
20代以下	99441
30代	37806
40代	53593
50代	51861
60代	46582
70～74歳	28724
再掲 40～74歳(Y)	180760

高血圧症治療中	68597 人 (21.6)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	741	0.7
30代	1406	3.7
40代	6224	11.6
50代	15312	29.5
60代	24462	52.5
70～74歳	20452	71.2
再掲 40～74歳(g)	66450	36.8

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	5374 人 (7.8)		13918 人 (20.3)		－ (－)	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	33	4.5	89	12	<10	－
30代	37	2.6	174	12.4	18	1.28
40代	304	4.9	919	14.8	67	1.08
50代	892	5.8	2493	16.3	189	1.23
60代	1832	7.5	4980	20.4	316	1.29
70～74歳	2276	11.1	5263	25.7	258	1.26
再掲 40～74歳	5304	8	13655	20.5	830	1.25

gのうち特定健診未受診の者(h)：39048 人（58.8 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診　※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
96064人 (53.1)	21405人 (22.3)

※上記「f 高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)(質問票服薬有 レセプト有)：25794 人（26.9 (i/e)）

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	7151	72
治療中(k)	Ⅱ度	2224	22
治療中(k)	Ⅲ度	572	6
未治療(l)	Ⅰ度	8899	78
未治療(l)	Ⅱ度	2073	18
未治療(l)	Ⅲ度	486	4
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	3257 (46%)	1395 (20%)	4869 (68%)
Ⅱ度	1064 (48%)	419 (19%)	1625 (73%)
Ⅲ度	292 (51%)	85 (15%)	439 (77%)
Ⅰ度	3136 (35%)	704 (8%)	6506 (73%)
Ⅱ度	875 (42%)	189 (9%)	1602 (77%)
Ⅲ度	248 (51%)	61 (13%)	392 (81%)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	8374 (9%)	41678 (43%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	780 (8%)	3734 (38%)	9928 (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	298 (3%)	1590 (16%)	1068 (11%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	1014 (9%)	5420 (47%)	11443 (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	201 (2%)	1747 (15%)	550 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　羽島市（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計	56057 人
年代別	人数(T)
20代以下	17691
30代	6734
40代	9948
50代	8765
60代	7986
70～74歳	4933
再掲 40～74歳(Y)	31632

高血圧症治療中	8830 人 (15.8)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	33	0.2
30代	163	2.4
40代	801	8.1
50代	1892	21.6
60代	3171	39.7
70～74歳	2770	56.2
再掲 40～74歳(g)	8634	27.3

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	－ (－)		－ (－)		－ (－)	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	<10	－	<10	－	0	－
30代	<10	－	23	14.1	<10	－
40代	26	3.2	103	12.9	<10	－
50代	74	3.9	227	12	<10	－
60代	209	6.6	561	17.7	11	0.35
70～74歳	248	9	657	23.7	11	0.4
再掲 40～74歳	557	6.5	1548	17.9	32	0.37

gのうち特定健診未受診の者(h)：4959 人（57.4 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診　※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
14941人 (47.2)	3904人 (26.1)

※上記「f 高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)(質問票服薬有 レセプト有)：4223 人（28.3 (i/e)）

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	1302	69
治療中(k)	Ⅱ度	485	26
治療中(k)	Ⅲ度	110	6
未治療(l)	Ⅰ度	1586	79
未治療(l)	Ⅱ度	341	17
未治療(l)	Ⅲ度	80	4
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	631 (48%)	250 (19%)	854 (66%)
Ⅱ度	220 (45%)	89 (18%)	332 (68%)
Ⅲ度	48 (44%)	23 (21%)	83 (75%)
Ⅰ度	574 (36%)	129 (8%)	1158 (73%)
Ⅱ度	154 (45%)	43 (13%)	271 (79%)
Ⅲ度	47 (59%)	<10 (－)	64 (80%)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	1044 (7%)	8653 (58%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	102 (5%)	1166 (61%)	1888～1896 (－)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	34 (2%)	429 (23%)	171 (9%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	132 (7%)	1212 (60%)	1998～2006 (－)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	25 (1%)	381 (19%)	110 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　各務原市（総数）　（高血圧症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：122017 人

年代別	人数(T)
20代以下	39341
30代	15485
40代	21405
50代	18310
60代	16283
70～74歳	11193
再掲 40～74歳(Y)	67191

軽症 → 重症

年代別	高血圧症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
	16954 人 (13.9)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	61	0.2	<10	–	<10	–	<10	–
30代	280	1.8	14	5	18	6.4	<10	–
40代	1432	6.7	77	5.4	128	8.9	14	0.98
50代	3488	19	194	5.6	419	12	38	1.09
60代	5976	36.7	447	7.5	940	15.7	68	1.14
70～74歳	5717	51.1	570	10	1135	19.9	64	1.12
再掲 40～74歳(g)	16613	24.7	1288	7.8	2622	15.8	184	1.11

gのうち特定健診未受診の者(h)：9187 人（55.3 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：33661人 (50.1)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：7982人 (23.7)

※上記「高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)：8777 人 (26.1 (i/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	2690	73
	Ⅱ度	781	21
	Ⅲ度	228	6
未治療(l)	Ⅰ度	3351	78
	Ⅱ度	775	18
	Ⅲ度	157	4
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	1198 (45%)	476 (18%)	1846 (69%)
Ⅱ度	335 (43%)	126 (16%)	567 (73%)
Ⅲ度	108 (47%)	40 (18%)	184 (81%)
Ⅰ度	1220 (36%)	295 (9%)	2522 (75%)
Ⅱ度	336 (43%)	75 (10%)	582 (75%)
Ⅲ度	86 (55%)	23 (15%)	127 (81%)

注：()を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m/e)	2886 (9%)	14276 (42%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	206 (8%)	1198 (32%)	3690～3698 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	55 (1%)	548 (15%)	349 (9%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	321 (7%)	1844 (43%)	4274～4282 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	38 (1%)	643 (15%)	212 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　山県市（総数）　（高血圧症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：20688 人

年代別	人数(T)
20代以下	5773
30代	2062
40代	3163
50代	3264
60代	4076
70～74歳	2350
再掲 40～74歳(Y)	12853

軽症 → 重症

年代別	高血圧症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
	4263 人 (20.6)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	14	0.2	0	–	<10	–	<10	–
30代	49	2.4	<10	–	<10	–	0	–
40代	292	9.2	<10	–	21	7.2	<10	–
50代	723	22.2	33	4.6	65	9	<10	–
60代	1712	42	106	6.2	221	12.9	20	1.17
70～74歳	1473	62.7	168	11.4	276	18.7	19	1.29
再掲 40～74歳(g)	4200	32.7	–	–	583	13.9	45	1.07

gのうち特定健診未受診の者(h)：2385 人（56.8 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：5989人 (46.6)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：1494人 (24.9)

※上記「高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)：1985 人 (33.1 (i/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	594	76
	Ⅱ度	145	19
	Ⅲ度	43	5
未治療(l)	Ⅰ度	577	81
	Ⅱ度	109	15
	Ⅲ度	26	4
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	273 (46%)	113 (19%)	385 (65%)
Ⅱ度	61 (42%)	31 (21%)	98 (68%)
Ⅲ度	22 (51%)	<10 (–)	32 (74%)
Ⅰ度	202 (35%)	59 (10%)	418 (72%)
Ⅱ度	45 (41%)	10 (9%)	80 (73%)
Ⅲ度	14 (54%)	<10 (–)	17～25 (–)

注：()を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m/e)	559 (9%)	2974 (50%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	74 (9%)	373 (48%)	782 (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<10 (–)	173 (22%)	57 (7%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	102 (14%)	448 (63%)	703～711 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (–)	154 (22%)	26 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　瑞穂市（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

年代別	人口 人数(T) ※令和2年国勢調査人口等基本集計 49401人	高血圧症治療中 患者数(a) 5534人 (11.2)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b) －(－)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c) －(－)	c/a	人工透析 患者数(d) －(－)	d/a
20代以下	18124	48	0.3	0	－	0	－	0	－
30代	7085	114	1.6	<10	－	12	10.5	<10	－
40代	8721	548	6.3	16	2.9	53	9.7	<10	－
50代	6663	1260	18.9	38	3	165	13.1	28	2.22
60代	5549	2003	36.1	106	5.3	414	20.7	34	1.7
70〜74歳	3259	1561	47.9	105	6.7	399	25.6	30	1.92
再掲 40〜74歳(Y)/(g)	24192	5372	22.2	265	4.9	1031	19.2	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
2666 人 (49.6 (h/g))

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：12623人 (52.2)
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：2629人 (20.8)
※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）
3327 人 (26.4 (i/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	840	71	Ⅰ度	381 (45%)	140 (17%)	555 (66%)
治療中(k)	Ⅱ度	249	21	Ⅱ度	106 (43%)	44 (18%)	185 (74%)
治療中(k)	Ⅲ度	91	8	Ⅲ度	36 (40%)	10 (11%)	64 (70%)
未治療(l)	Ⅰ度	1131	78	Ⅰ度	435 (38%)	75 (7%)	820 (73%)
未治療(l)	Ⅱ度	251	17	Ⅱ度	113 (45%)	23 (9%)	198 (79%)
未治療(l)	Ⅲ度	67	5	Ⅲ度	35 (52%)	<10 (－)	53 (79%)
	分類	人数	l内での割合				

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	1069 (8%)	5502 (44%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	70 (6%)	464 (39%)	1180 (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	22 (2%)	185 (16%)	126 (11%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	107 (7%)	696 (48%)	1440〜1448 (－)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	22 (2%)	238 (16%)	60 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　本巣市（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

年代別	人口 人数(T) ※令和2年国勢調査人口等基本集計 27780人	高血圧症治療中 患者数(a) －(－)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b) －(－)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c) －(－)	c/a	人工透析 患者数(d) －(－)	d/a
20代以下	8978	<10	－	0	－	<10	－	0	－
30代	3066	45	1.5	<10	－	<10	－	0	－
40代	4734	286	6	11	3.8	20	7	0	－
50代	3963	666	16.8	31	4.7	67	10.1	0	－
60代	4302	1221	28.4	62	5.1	125	10.2	0	－
70〜74歳	2737	1120	40.9	82	7.3	147	13.1	0	－
再掲 40〜74歳(Y)/(g)	15736	3293	20.9	186	5.6	359	10.9	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
1746 人 (53 (h/g))

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：8197人 (52.1)
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：1655人 (20.2)
※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）
2404 人 (29.3 (i/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	591	76	Ⅰ度	265 (45%)	95 (16%)	387 (65%)
治療中(k)	Ⅱ度	163	21	Ⅱ度	87 (53%)	32 (20%)	121 (74%)
治療中(k)	Ⅲ度	25	3	Ⅲ度	12 (48%)	<10 (－)	16〜24 (－)
未治療(l)	Ⅰ度	696	79	Ⅰ度	270 (39%)	55 (8%)	509 (73%)
未治療(l)	Ⅱ度	140	16	Ⅱ度	65 (46%)	15 (11%)	103 (74%)
未治療(l)	Ⅲ度	40	5	Ⅲ度	21 (53%)	<10 (－)	31〜39 (－)
	分類	人数	l内での割合				

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	530 (6%)	3587 (44%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	46 (6%)	334 (43%)	779 (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	15 (2%)	124 (16%)	64 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	64 (7%)	465 (53%)	876 (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	14 (2%)	149 (17%)	39 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　岐南町（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

	人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中		脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	22557 人		– (–)		– (–)		– (–)		<10 (–)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	8030	20代以下	<10	–	0	–	<10	–	0	–
30代	3464	30代	78	2.3	<10	–	<10	–	0	–
40代	3933	40代	386	9.8	14	3.6	43	11.1	0	–
50代	3092	50代	893	28.9	46	5.2	114	12.8	<10	–
60代	2497	60代	1159	46.4	75	6.5	225	19.4	<10	–
70～74歳	1541	70～74歳	884	57.4	104	11.8	188	21.3	0	–
再掲 40～74歳(Y)	11063	再掲 40～74歳(g)	3322	30	239	7.2	570	17.2	<10	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
1847 人 （55.6 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：5418人 (49) ― 高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：1212人 (22.4)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）
1334 人 （24.6 (j/e)）

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	369	68	Ⅰ度	152 (41%)	77 (21%)	240 (65%)
	Ⅱ度	129	24	Ⅱ度	69 (53%)	19 (15%)	97 (75%)
	Ⅲ度	46	8	Ⅲ度	27 (59%)	<10 (–)	35 (76%)
未治療(l)	Ⅰ度	522	78	Ⅰ度	196 (38%)	45 (9%)	374 (72%)
	Ⅱ度	124	19	Ⅱ度	56 (45%)	11 (9%)	103 (83%)
	Ⅲ度	22	3	Ⅲ度	12 (55%)	<10 (–)	13～21 (–)
	分類	人数	l内での割合				

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	420 (8%)	2880 (53%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	33 (6%)	276 (51%)	544 (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<10 (–)	131 (24%)	61 (11%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	49 (7%)	380 (57%)	659～667 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	12 (2%)	130 (19%)	37 (6%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　笠松町（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

	人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中		脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	18530 人		5799 人 (31.3)		– (–)		– (–)		– (–)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	6036	20代以下	50	0.8	<20	–	<20	–	<20	–
30代	2391	30代	103	4.3	<20	–	<20	–	<20	–
40代	3313	40代	529	16	32	6	62	11.7	<20	–
50代	2887	50代	1286	44.5	92	7.2	205	15.9	38	2.95
60代	2368	60代	1957	82.6	179	9.1	413	21.1	50	2.55
70～74歳	1535	70～74歳	1874	122.1	267	14.2	516	27.5	49	2.61
再掲 40～74歳(Y)	10103	再掲 40～74歳(g)	5646	55.9	570	10.1	1196	21.2	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
3710 人 （65.7 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：5044人 (49.9) ― 高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：1144人 (22.7)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）
1388 人 （27.5 (j/e)）

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	401	75	Ⅰ度	184 (46%)	89 (22%)	266 (66%)
	Ⅱ度	103	19	Ⅱ度	48 (47%)	22 (21%)	63 (61%)
	Ⅲ度	32	6	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	13～31 (–)
未治療(l)	Ⅰ度	489	80	Ⅰ度	183 (37%)	32 (7%)	358 (73%)
	Ⅱ度	95	16	Ⅱ度	43 (45%)	<20 (–)	71 (75%)
	Ⅲ度	24	4	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
	分類	人数	l内での割合				

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	342 (7%)	2705 (54%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	25 (5%)	284 (53%)	517～535 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	107 (20%)	55 (10%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	53 (9%)	372 (61%)	608 (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	124 (20%)	26 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　北方町(総数)　（高血圧症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計	15818 人
年代別	人数(T)
20代以下	5306
30代	2077
40代	2799
50代	2401
60代	2048
70～74歳	1187
再掲 40～74歳(Y)	8435

高血圧症治療中	– (–)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	–
30代	79	3.8
40代	292	10.4
50代	607	25.3
60代	825	40.3
70～74歳	657	55.3
再掲 40～74歳(g)	2381	28.2

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	– (–)		– (–)		<20 (–)	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	<20	–	0	–	0	–
30代	<20	–	<20	–	0	–
40代	<20	–	35	12	0	–
50代	<20	–	69	11.4	<20	–
60代	37	4.5	125	15.2	0	–
70～74歳	55	8.4	162	24.7	<20	–
再掲 40～74歳	122	5.1	391	16.4	<20	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
1512 人 (63.5 (h/g))

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
3984人 (47.2)	– (–)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)(質問票_服薬有 レセプト有)
1020 人 (25.6 (j/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	297	73	Ⅰ度	142 (48%)	57 (19%)	213 (72%)
治療中(k)	Ⅱ度	94	–	Ⅱ度	45 (48%)	21 (22%)	69 (73%)
治療中(k)	Ⅲ度	<20	–	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
未治療(l)	Ⅰ度	352	76	Ⅰ度	113 (32%)	<20 (–)	256 (73%)
未治療(l)	Ⅱ度	88	19	Ⅱ度	37 (42%)	<20 (–)	69～87 (–)
未治療(l)	Ⅲ度	21	5	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	2～20 (–)
	分類	人数	l内での割合				

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	366 (9%)	1909 (48%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	49 (12%)	189 (46%)	– (99%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	87 (21%)	53 (13%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	75 (16%)	247 (54%)	442～460 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	74 (16%)	22 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　大垣市(総数)　（高血圧症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計	133848 人
年代別	人数(T)
20代以下	43137
30代	17456
40代	22764
50代	20614
60代	18841
70～74歳	11036
再掲 40～74歳(Y)	73255

高血圧症治療中	27812 人 (20.8)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	320	0.7
30代	631	3.6
40代	2558	11.2
50代	5860	28.4
60代	10076	53.5
70～74歳	8367	75.8
再掲 40～74歳(g)	26861	36.7

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	– (–)		6558 人 (23.6)		– (–)	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	<10	–	37	11.6	<10	–
30代	22	3.5	98	15.5	13	2.06
40代	107	4.2	414	16.2	34	1.33
50代	294	5	1064	18.2	67	1.14
60代	695	6.9	2422	24	120	1.19
70～74歳	781	9.3	2523	30.2	99	1.18
再掲 40～74歳	1877	7	6423	23.9	320	1.19

gのうち特定健診未受診の者(h)
16938 人 (63.1 (h/g))

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
34767人 (47.5)	8074人 (23.2)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)(質問票_服薬有 レセプト有)
8624 人 (24.8 (j/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	2454	69	Ⅰ度	1170 (48%)	412 (17%)	1625 (66%)
治療中(k)	Ⅱ度	861	24	Ⅱ度	399 (46%)	134 (16%)	611 (71%)
治療中(k)	Ⅲ度	221	6	Ⅲ度	109 (49%)	29 (13%)	163 (74%)
未治療(l)	Ⅰ度	3537	78	Ⅰ度	1320 (37%)	286 (8%)	2586 (73%)
未治療(l)	Ⅱ度	790	17	Ⅱ度	342 (43%)	86 (11%)	587 (74%)
未治療(l)	Ⅲ度	211	5	Ⅲ度	111 (53%)	26 (12%)	167 (79%)
	分類	人数	l内での割合				

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	3514 (10%)	16537 (48%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	454 (13%)	2005 (57%)	3526 (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	147 (4%)	905 (26%)	345 (10%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	552 (12%)	2533 (56%)	4526 (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	117 (3%)	1015 (22%)	189 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　海津市（総数）　（高血圧症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：27349 人

軽症 → 重症

年代別	人数(T)	高血圧症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		4878 人 (17.8)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	7367	12	0.2	<10	–	<10	–	0	–
30代	2928	53	1.8	<10	–	<10	–	<10	–
40代	4298	333	7.7	<10	–	33	9.9	<10	–
50代	4382	920	21	29	3.2	134	14.6	<10	–
60代	5367	2007	37.4	108	5.4	349	17.4	<10	–
70～74歳	3007	1553	51.6	104	6.7	322	20.7	<10	–
再掲 40～74歳(Y)	17054	再掲 40～74歳(g) 4813	28.2	–	–	838	17.4	16	0.33

gのうち特定健診未受診の者(h)：2755 人（57.2 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：7947人 (46.6)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：2154人 (27.1)

※上記「高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)：2534 人 (31.9 (i/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	773	73
	Ⅱ度	229	22
	Ⅲ度	59	6
未治療(l)	Ⅰ度	862	79
	Ⅱ度	189	17
	Ⅲ度	42	4
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	371 (48%)	145 (19%)	500 (65%)
Ⅱ度	110 (48%)	41 (18%)	165 (72%)
Ⅲ度	29 (49%)	<10 (–)	41 (69%)
Ⅰ度	319 (37%)	75 (9%)	614 (71%)
Ⅱ度	84 (44%)	21 (11%)	150 (79%)
Ⅲ度	24 (57%)	<10 (–)	30 (71%)

注：()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m)	517 (7%)	3987 (50%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	61 (6%)	544 (51%)	1052～1060 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	24 (2%)	210 (20%)	110 (10%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	97 (9%)	635 (58%)	1084～1092 (–)
有所見者(p) 有所見率(p/l)	16 (1%)	235 (22%)	55 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　養老町（総数）　（高血圧症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：22484 人

軽症 → 重症

年代別	人数(T)	高血圧症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		3910 人 (17.4)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	6244	10	0.2	<10	–	<10	–	0	–
30代	2361	65	2.8	<10	–	11	16.9	0	–
40代	3599	275	7.6	13	4.7	32	11.6	<10	–
50代	3486	719	20.6	62	8.6	107	14.9	<10	–
60代	4345	1569	36.1	177	11.3	352	22.4	10	0.64
70～74歳	2449	1272	51.9	161	12.7	319	25.1	12	0.94
再掲 40～74歳(Y)	13879	再掲 40～74歳(g) 3835	27.6	413	10.8	810	21.1	31	0.81

gのうち特定健診未受診の者(h)：2224 人（58 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：6754人 (48.7)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：1823人 (27)

※上記「高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)：2051 人 (30.4 (i/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	605	69
	Ⅱ度	216	25
	Ⅲ度	55	6
未治療(l)	Ⅰ度	728	77
	Ⅱ度	175	18
	Ⅲ度	44	5
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	309 (51%)	120 (20%)	395 (65%)
Ⅱ度	99 (46%)	37 (17%)	147 (68%)
Ⅲ度	23 (42%)	15 (27%)	42 (76%)
Ⅰ度	276 (38%)	56 (8%)	503 (69%)
Ⅱ度	80 (46%)	18 (10%)	141 (81%)
Ⅲ度	29 (66%)	<10 (–)	35～43 (–)

注：()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m)	602 (9%)	3111 (46%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	82 (9%)	445 (51%)	867～875 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	20 (2%)	189 (22%)	96 (11%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	91 (10%)	507 (54%)	937 (99%)
有所見者(p) 有所見率(p/l)	<10 (–)	193 (20%)	48 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度 垂井町(総数)　　(高血圧症)

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 22194 人

年代別	人数(T)
20代以下	6775
30代	2611
40代	3736
50代	3296
60代	3534
70~74歳	2242
再掲 40~74歳(Y)	12808

高血圧症治療中: –（–）

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<10	–
30代	46	1.8
40代	271	7.3
50代	698	21.2
60代	1464	41.4
70~74歳	1220	54.4
再掲 40~74歳(g)	3653	28.5

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	–（–）		–（–）		–（–）	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	0	–	<10	–	0	–
30代	<10	–	<10	–	<10	–
40代	12	4.4	34	12.5	<10	–
50代	40	5.7	122	17.5	18	2.58
60代	78	5.3	263	18	33	2.25
70~74歳	92	7.5	297	24.3	17	1.39
再掲 40~74歳	222	6.1	716	19.6	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h): 2729 人（74.7 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y): 5831人（45.5） — 高血圧症(f) 140/90以上 (f/e): 1463人（25.1）

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）: 1502 人（25.8 (i/e)）

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	469	73
治療中(k)	Ⅱ度	143	22
治療中(k)	Ⅲ度	28	4
未治療(l)	Ⅰ度	632	77
未治療(l)	Ⅱ度	149	18
未治療(l)	Ⅲ度	42	5
	分類	人数	l内での割合

その他のリスク

血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	221 (47%)	71 (15%)	294 (63%)
Ⅱ度	69 (48%)	16 (11%)	106 (74%)
Ⅲ度	16 (57%)	<10 (–)	18 (64%)
Ⅰ度	242 (38%)	44 (7%)	440 (70%)
Ⅱ度	61 (41%)	<10 (–)	108 (72%)
Ⅲ度	15 (36%)	<10 (–)	33~41 (–)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して求めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	954 (16%)	3463 (59%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	121 (19%)	433 (68%)	631~639 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	16 (3%)	224 (35%)	55 (9%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	163 (20%)	565 (69%)	814~822 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	18 (2%)	244 (30%)	36 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度 関ケ原町(総数)　　(高血圧症)

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 5198 人

年代別	人数(T)
20代以下	1337
30代	500
40代	744
50代	861
60代	1061
70~74歳	695
再掲 40~74歳(Y)	3361

高血圧症治療中: –（–）

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	–
30代	29	5.8
40代	110	14.8
50代	310	36
60代	656	61.8
70~74歳	564	81.2
再掲 40~74歳(g)	1640	48.8

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	–（–）		–（–）		<20（–）	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	0	–	<20	–	0	–
30代	0	–	<20	–	0	–
40代	<20	–	<20	–	<20	–
50代	<20	–	33	10.6	0	–
60代	34	5.2	59	9	<20	–
70~74歳	41	7.3	95	16.8	<20	–
再掲 40~74歳	90	5.5	–	–	<20	–

gのうち特定健診未受診の者(h): 1102 人（67.2 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y): 1611人（47.9） — 高血圧症(f) 140/90以上 (f/e): 357人（22.2）

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）: 479 人（29.7 (i/e)）

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	121	76
治療中(k)	Ⅱ度	27	–
治療中(k)	Ⅲ度	<20	–
未治療(l)	Ⅰ度	156	79
未治療(l)	Ⅱ度	33	–
未治療(l)	Ⅲ度	<20	–
	分類	人数	l内での割合

その他のリスク

血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	62 (51%)	23 (19%)	79 (65%)
Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	8~26 (–)
Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
Ⅰ度	54 (35%)	<20 (–)	114 (73%)
Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	14~32 (–)
Ⅲ度	<20 (–)	0 (–)	<20 (–)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して求めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	209 (13%)	708 (44%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	44 (28%)	101 (63%)	– (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	49 (31%)	<20 (–)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	47 (24%)	119 (60%)	– (99%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	58 (29%)	<20 (–)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　神戸町（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：15550 人

高血圧症治療中：－（－）　脳血管疾患：－（－）　虚血性心疾患：－（－）　人工透析：－（－）

年代別	人数(T)	高血圧症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
20代以下	4742	<20	－	0	－	<20	－	0	－
30代	1737	31	1.8	0	－	<20	－	0	－
40代	2709	176	6.5	<20	－	<20	－	<20	－
50代	2241	385	17.2	<20	－	28	7.3	<20	－
60代	2452	821	33.5	52	6.3	77	9.4	<20	－
70～74歳	1669	759	45.5	62	8.2	95	12.5	<20	－
再掲 40～74歳(Y)/(g)	9071	2141	23.6	136	6.4	－	－	37	1.73

gのうち特定健診未受診の者(h)：1062 人（49.6 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5056人（55.7）

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：－（－）

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)(質問票_服薬有 レセプト有)：1574 人（31.1 (j/e)）

	分類	人数	内での割合	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	448	77	190 (42%)	65 (15%)	295 (66%)
治療中(k)	Ⅱ度	93	16	45 (48%)	<20 (-)	65 (70%)
治療中(k)	Ⅲ度	39	7	20～38 (-)	<20 (-)	20～38 (-)
未治療(l)	Ⅰ度	512	82	191 (37%)	35 (7%)	379 (74%)
未治療(l)	Ⅱ度	99	－	40 (40%)	<20 (-)	80～98 (-)
未治療(l)	Ⅲ度	<20	－	<20 (-)	0 (-)	<20 (-)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	555 (11%)	2520 (50%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	127 (22%)	380 (66%)	561～579 (-)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	104 (18%)	193 (33%)	45 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	98 (16%)	390 (62%)	- (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	61 (10%)	130 (21%)	26 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　輪之内町（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：8415 人

高血圧症治療中：－（－）　脳血管疾患：－（－）　虚血性心疾患：－（－）　人工透析：－（－）

年代別	人数(T)	高血圧症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
20代以下	2803	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	1117	<20	－	0	－	<20	－	0	－
40代	1467	74	5	0	－	<20	－	0	－
50代	1093	201	18.4	<20	－	23	11.4	0	－
60代	1257	458	36.4	34	7.4	105	22.9	0	－
70～74歳	678	355	52.4	35	9.9	101	28.5	0	－
再掲 40～74歳(Y)/(g)	4495	1088	24.2	－	－	－	－	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：606 人（55.7 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：2382人（53）

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：586人（24.6）

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)(質問票_服薬有 レセプト有)：694 人（29.1 (j/e)）

	分類	人数	内での割合	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	192	65	89 (46%)	35 (18%)	125 (65%)
治療中(k)	Ⅱ度	88	－	39 (44%)	<20 (-)	61 (69%)
治療中(k)	Ⅲ度	<20	－	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
未治療(l)	Ⅰ度	225	78	86 (38%)	<20 (-)	152 (68%)
未治療(l)	Ⅱ度	56	－	24 (43%)	<20 (-)	37～55 (-)
未治療(l)	Ⅲ度	<20	－	<20 (-)	0 (-)	<20 (-)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	151 (6%)	1281 (54%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	<20 (-)	221 (75%)	- (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (-)	94 (32%)	26 (9%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	20 (7%)	188 (65%)	- (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (-)	62 (21%)	<20 (-)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　安八町（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：12269 人

高血圧症治療中：–（–）　**脳血管疾患**：–（–）　**虚血性心疾患**：–（–）　**人工透析**：<20（–）

レセプト

年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
20代以下	3919	20代以下	<20	–	0	–	<20	–	0	–
30代	1367	30代	25	1.8	<20	–	<20	–	0	–
40代	2259	40代	123	5.4	<20	–	<20	–	<20	–
50代	1805	50代	305	16.9	<20	–	25	8.2	<20	–
60代	1774	60代	550	31	38	6.9	66	12	<20	–
70～74歳	1145	70～74歳	505	44.1	48	9.5	89	17.6	<20	–
再掲 40～74歳(Y)	6983	再掲 40～74歳(g)	1483	21.2	103	6.9	–	–	<20	–

gのうち特定健診未受診の者(h)：729 人（49.2 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40―74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：3816人（54.6）
高血圧症(f) 140/90以上(f/e)：–（–）
※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）：1076 人（28.2 (i/e)）

	分類	人数	割合	血圧分類	肥満 BMI25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)（k内での割合）	Ⅰ度	279	72	Ⅰ度	129 (46%)	55 (20%)	185 (66%)
	Ⅱ度	85	22	Ⅱ度	41 (48%)	<20 (–)	58 (68%)
	Ⅲ度	21	5	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
未治療(l)（l内での割合）	Ⅰ度	374	80	Ⅰ度	155 (41%)	22 (6%)	271 (72%)
	Ⅱ度	76	–	Ⅱ度	31 (41%)	<20 (–)	57～75 (–)
	Ⅲ度	<20	–	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m)(m/e)	211 (6%)	1804 (47%)	
治療中：検査実施者(n) 実施率(n/k)	22 (6%)	237 (62%)	366～384 (–)
治療中：有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	117 (30%)	39 (10%)
未治療：検査実施者(p) 実施率(p/l)	29 (6%)	270 (58%)	– (100%)
未治療：有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	123 (26%)	23 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　揖斐川町（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：15579 人

高血圧症治療中：–（–）　**脳血管疾患**：–（–）　**虚血性心疾患**：–（–）　**人工透析**：–（–）

レセプト

年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
20代以下	4266	20代以下	<20	–	0	–	<20	–	0	–
30代	1510	30代	53	3.5	<20	–	<20	–	<20	–
40代	2381	40代	313	13.1	<20	–	40	12.8	<20	–
50代	2422	50代	856	35.3	43	5	112	13.1	<20	–
60代	3073	60代	1595	51.9	89	5.6	337	21.1	20	1.25
70～74歳	1927	70～74歳	1535	79.7	154	10	421	27.4	20	1.3
再掲 40～74歳(Y)	9803	再掲 40～74歳(g)	4299	43.9	–	–	910	21.2	54	1.26

gのうち特定健診未受診の者(h)：2312 人（53.8 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40―74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5162人（52.7）
高血圧症(f) 140/90以上(f/e)：–（–）
※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）：1726 人（33.4 (i/e)）

	分類	人数	割合	血圧分類	肥満 BMI25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)（k内での割合）	Ⅰ度	467	77	Ⅰ度	209 (45%)	82 (18%)	283 (61%)
	Ⅱ度	125	–	Ⅱ度	54 (43%)	22 (18%)	86 (69%)
	Ⅲ度	<20	–	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
未治療(l)（l内での割合）	Ⅰ度	493	80	Ⅰ度	170 (34%)	32 (6%)	347 (70%)
	Ⅱ度	94	15	Ⅱ度	41 (44%)	<20 (–)	69 (73%)
	Ⅲ度	28	5	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	9～27 (–)

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m)(m/e)	213 (4%)	2621 (51%)	
治療中：検査実施者(n) 実施率(n/k)	<20 (–)	315 (52%)	– (100%)
治療中：有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	135 (22%)	64 (10%)
未治療：検査実施者(p) 実施率(p/l)	38 (6%)	347 (56%)	596～614 (–)
未治療：有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	89 (14%)	23 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　大野町（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：18751 人

高血圧症治療中：－（－）　脳血管疾患：－（－）　虚血性心疾患：－（－）　人工透析：<20（－）

年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
20代以下	5918	<20	－	0	－	<20	－	0	－
30代	2015	24	1.2	<20	－	<20	－	<20	－
40代	3136	120	3.8	<20	－	<20	－	<20	－
50代	2959	328	11.1	<20	－	50	15.2	0	－
60代	2931	699	23.8	29	4.1	113	16.2	<20	－
70～74歳	1792	641	35.8	41	6.4	132	20.6	0	－
再掲 40～74歳(Y)/(g)	10818	1788	16.5	86	4.8	－	－	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：920 人（51.5 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：5191人（48）
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：1303人（25.1）
※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（※質問票_服薬有 レセプト有）：1471 人（28.3 (j/e)）

	分類	人数	内での割合	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	447	71	200 (45%)	75 (17%)	302 (68%)
治療中(k)	Ⅱ度	145	23	71 (49%)	25 (17%)	100 (69%)
治療中(k)	Ⅲ度	40	6	<20 (-)	<20 (-)	21～39 (-)
未治療(l)	Ⅰ度	518	77	205 (40%)	43 (8%)	381 (74%)
未治療(l)	Ⅱ度	120	18	54 (45%)	<20 (-)	85 (71%)
未治療(l)	Ⅲ度	33	5	<20 (-)	<20 (-)	14～32 (-)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	301 (6%)	2352 (45%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	33 (5%)	252 (40%)	613～631 (-)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (-)	109 (17%)	64 (10%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	45 (7%)	352 (52%)	652～670 (-)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (-)	107 (16%)	36 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　池田町（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：19818 人

高血圧症治療中：－（－）　脳血管疾患：－（－）　虚血性心疾患：－（－）　人工透析：<20（－）

年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
20代以下	6437	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	2176	26	1.2	<20	－	<20	－	0	－
40代	3338	134	4	<20	－	<20	－	0	－
50代	3044	294	9.7	<20	－	30	10.2	0	－
60代	2990	600	20.1	28	4.7	93	15.5	<20	－
70～74歳	1833	507	27.7	59	11.6	116	22.9	<20	－
再掲 40～74歳(Y)/(g)	11205	1535	13.7	100	6.5	－	－	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：1124 人（73.2 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：5530人（49.4）
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：1314人（23.8）
※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（※質問票_服薬有 レセプト有）：1389 人（25.1 (j/e)）

	分類	人数	内での割合	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	414	75	206 (50%)	72 (17%)	269 (65%)
治療中(k)	Ⅱ度	116	21	60 (52%)	<20 (-)	82 (71%)
治療中(k)	Ⅲ度	22	4	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
未治療(l)	Ⅰ度	589	77	218 (37%)	46 (8%)	437 (74%)
未治療(l)	Ⅱ度	140	18	54 (39%)	<20 (-)	101 (72%)
未治療(l)	Ⅲ度	33	4	14～32 (-)	<20 (-)	14～32 (-)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	397 (7%)	2908 (53%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	27 (5%)	312 (57%)	533～551 (-)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (-)	130 (24%)	65 (12%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	46 (6%)	436 (57%)	743～761 (-)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (-)	149 (20%)	28 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　関市（総数）　（高血圧症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：71562 人

年代別	人数(T)
20代以下	22282
30代	8252
40代	11702
50代	10702
60代	11781
70～74歳	6843
再掲 40～74歳(Y)	41028

軽症 → 重症

高血圧症治療中			脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
12009 人 (16.8)			－ (－)		－ (－)		－ (－)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	51	0.2	<10	－	<10	－	<10	－
30代	168	2	<10	－	11	6.5	<10	－
40代	899	7.7	26	2.9	94	10.5	16	1.78
50代	2301	21.5	133	5.8	256	11.1	32	1.39
60代	4657	39.5	304	6.5	736	15.8	60	1.29
70～74歳	3933	57.5	387	9.8	814	20.7	33	0.84
再掲 40～74歳(g)	11790	28.7	850	7.2	1900	16.1	141	1.2

gのうち特定健診未受診の者(h)：6662 人（56.5 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：19207人 (46.8)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：4582人 (23.9)

※上記「高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)：5452 人 (28.4 (i/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	1588	74
	Ⅱ度	446	21
	Ⅲ度	117	5
未治療(l)	Ⅰ度	1884	77
	Ⅱ度	430	18
	Ⅲ度	117	5
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク：肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	680 (43%)	315 (20%)	1108 (70%)
Ⅱ度	197 (44%)	80 (18%)	323 (72%)
Ⅲ度	54 (46%)	21 (18%)	92 (79%)
Ⅰ度	680 (36%)	160 (8%)	1403 (74%)
Ⅱ度	164 (38%)	44 (10%)	336 (78%)
Ⅲ度	59 (50%)	14 (12%)	97 (83%)

注：()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m)(m/e)	1639 (9%)	9831 (51%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	147 (7%)	1082 (50%)	2142～2150 (－)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	12 (1%)	459 (21%)	158 (7%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	272 (11%)	1467 (80%)	2422～2430 (－)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	21 (1%)	489 (20%)	84 (3%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　美濃市（総数）　（高血圧症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：15745 人

年代別	人数(T)
20代以下	4320
30代	1792
40代	2328
50代	2404
60代	3137
70～74歳	1764
再掲 40～74歳(Y)	9633

軽症 → 重症

高血圧症治療中			脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)			－ (－)		－ (－)		－ (－)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	35	2	0	－	<20	－	0	－
40代	163	7	<20	－	<20	－	<20	－
50代	460	19.1	20	4.3	48	10.4	0	－
60代	1113	35.5	50	4.5	194	17.4	<20	－
70～74歳	942	53.4	61	6.5	250	26.5	<20	－
再掲 40～74歳(g)	2678	27.8	－	－	－	－	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：1520 人（56.8 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：4416人 (45.8)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：－ (－)

※上記「高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)：1283 人 (29.1 (i/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	373	73
	Ⅱ度	111	22
	Ⅲ度	27	5
未治療(l)	Ⅰ度	404	78
	Ⅱ度	101	－
	Ⅲ度	<20	－
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク：肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	152 (41%)	73 (20%)	258 (69%)
Ⅱ度	36 (32%)	20 (18%)	80 (72%)
Ⅲ度	<20 (－)	<20 (－)	<20 (－)
Ⅰ度	134 (33%)	33 (8%)	297 (74%)
Ⅱ度	38 (38%)	<20 (－)	78 (77%)
Ⅲ度	<20 (－)	<20 (－)	<20 (－)

注：()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m)(m/e)	389 (9%)	2403 (54%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	53 (10%)	334 (65%)	492～510 (－)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (－)	139 (27%)	33 (6%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	49 (9%)	355 (68%)	－ (99%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	128 (25%)	<20 (－)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　郡上市(総数)　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 30848 人

高血圧症治療中: 5559 人 (18)

脳血管疾患: – (–)　虚血性心疾患: – (–)　人工透析: – (–)

年代別	人数(T)	高血圧症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
20代以下	8153	20	0.2	0	–	<10	–	0	–
30代	3442	50	1.5	<10	–	<10	–	0	–
40代	4652	347	7.5	16	4.6	25	7.2	0	–
50代	5130	1059	20.6	50	4.7	118	11.1	<10	–
60代	6193	2310	37.3	142	6.1	316	13.7	20	0.87
70～74歳	3278	1773	54.1	187	10.5	345	19.5	11	0.62
再掲 40～74歳(Y)/(g)	19253	5489	28.5	395	7.2	804	14.6	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h): 2563 人 (46.7 (h/g))

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y): 11627人 (60.4)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e): 2487人 (21.4)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)(質問票_服薬有 レセプト有): 3363 人 (28.9 (i/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	901	74	Ⅰ度	384 (43%)	161 (18%)	594 (66%)
治療中(k)	Ⅱ度	262	21	Ⅱ度	118 (45%)	45 (17%)	201 (77%)
治療中(k)	Ⅲ度	59	5	Ⅲ度	30 (51%)	<10 (–)	43 (73%)
未治療(l)	Ⅰ度	996	79	Ⅰ度	350 (35%)	86 (9%)	734 (74%)
未治療(l)	Ⅱ度	215	17	Ⅱ度	82 (38%)	20 (9%)	174 (81%)
未治療(l)	Ⅲ度	54	4	Ⅲ度	22 (41%)	<10 (–)	44 (81%)
	分類	人数	l内での割合				

注:%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	1161 (10%)	5244 (45%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	190 (16%)	532 (44%)	1213～1221 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	45 (4%)	257 (21%)	101 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	357 (28%)	815 (64%)	1256～1264 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	71 (6%)	330 (26%)	59 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　美濃加茂市(総数)　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 47507 人

高血圧症治療中: 11599 人 (24.4)

脳血管疾患: – (–)　虚血性心疾患: – (–)　人工透析: – (–)

年代別	人数(T)	高血圧症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
20代以下	16617	78	0.5	<10	–	<10	–	0	–
30代	6589	297	4.5	<10	–	41	13.8	<10	–
40代	8228	1284	15.6	45	3.5	167	13	11	0.86
50代	6728	2712	40.3	117	4.3	415	15.3	30	1.11
60代	6005	4164	69.3	236	5.7	844	20.3	53	1.27
70～74歳	3340	3064	91.7	232	7.6	803	26.2	56	1.83
再掲 40～74歳(Y)/(g)	24301	11224	46.2	630	5.6	2229	19.9	150	1.34

gのうち特定健診未受診の者(h): 7022 人 (62.6 (h/g))

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y): 12010人 (49.4)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e): 2595人 (21.6)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)(質問票_服薬有 レセプト有): 2790 人 (23.2 (i/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	828	71	Ⅰ度	354 (43%)	142 (17%)	551 (67%)
治療中(k)	Ⅱ度	282	24	Ⅱ度	131 (46%)	50 (18%)	204 (72%)
治療中(k)	Ⅲ度	63	5	Ⅲ度	36 (57%)	15 (24%)	47 (75%)
未治療(l)	Ⅰ度	1108	78	Ⅰ度	383 (35%)	73 (7%)	806 (73%)
未治療(l)	Ⅱ度	247	17	Ⅱ度	116 (47%)	24 (10%)	201 (81%)
未治療(l)	Ⅲ度	67	5	Ⅲ度	34 (51%)	<10 (–)	56 (84%)
	分類	人数	l内での割合				

注:%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	1449 (12%)	5807 (48%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	323 (28%)	790 (67%)	1164～1172 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	74 (6%)	305 (26%)	139 (12%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	257 (18%)	949 (67%)	1413～1421 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	40 (3%)	316 (22%)	66 (5%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　可児市（総数）

（高血圧症）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
85276 人	
年代別	人数(T)
20代以下	27309
30代	10989
40代	14599
50代	12168
60代	12214
70～74歳	7997
再掲 40～74歳(Y)	46978

高血圧症治療中		
12252 人 (14.4)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	64	0.2
30代	209	1.9
40代	1152	7.9
50代	2395	19.7
60代	4517	37
70～74歳	3915	49
再掲 40～74歳(g)	11979	25.5

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	<10	－	0	－
<10	－	15	7.2	<10	－
54	4.7	91	7.9	17	1.48
162	6.8	241	10.1	34	1.42
451	10	665	14.7	50	1.11
587	15	839	21.4	58	1.48
1254	10.5	1836	15.3	159	1.33

gのうち特定健診未受診の者(h)：8965 人（74.8 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：22568人 (48)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：5013人 (22.2)

※上記「高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)：4934 人 (21.9 (i/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	1430	71
	Ⅱ度	462	23
	Ⅲ度	118	6
未治療(l)	Ⅰ度	2313	77
	Ⅱ度	565	19
	Ⅲ度	125	4
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク：肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	694 (49%)	289 (20%)	1002 (70%)
Ⅱ度	228 (49%)	93 (20%)	332 (72%)
Ⅲ度	55 (47%)	22 (19%)	87 (74%)
Ⅰ度	808 (35%)	227 (10%)	1716 (74%)
Ⅱ度	239 (42%)	66 (12%)	431 (76%)
Ⅲ度	54 (43%)	16 (13%)	98 (78%)

注：()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m/e)	3140 (14%)	11172 (50%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	522 (26%)	1341 (67%)	2001～2009 (－)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	19 (1%)	616 (31%)	160 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	820 (27%)	2049 (68%)	2994～3002 (－)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	16 (1%)	823 (27%)	119 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　坂祝町（総数）

（高血圧症）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
6940 人	
年代別	人数(T)
20代以下	2219
30代	925
40代	1079
50代	970
60代	1129
70～74歳	618
再掲 40～74歳(Y)	3796

高血圧症治療中		
－ (－)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	－
30代	<20	－
40代	56	5.2
50代	126	13
60代	271	24
70～74歳	202	32.7
再掲 40～74歳(g)	655	17.3

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	0	－	0	－
0	－	0	－	0	－
0	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
20	7.4	25	9.2	0	－
<20	－	26	12.9	0	－
－	－	61	9.3	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：373 人（56.9 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：1915人 (50.4)

高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：503人 (26.3)

※上記「高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)：515 人 (26.9 (i/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	155	68
	Ⅱ度	57	－
	Ⅲ度	<20	－
未治療(l)	Ⅰ度	208	75
	Ⅱ度	53	－
	Ⅲ度	<20	－
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク：肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	79 (51%)	25 (16%)	101 (65%)
Ⅱ度	25 (44%)	<20 (－)	38～56 (－)
Ⅲ度	<20 (－)	<20 (－)	<20 (－)
Ⅰ度	76 (37%)	21 (10%)	157 (75%)
Ⅱ度	29 (55%)	<20 (－)	34～52 (－)
Ⅲ度	<20 (－)	<20 (－)	<20 (－)

注：()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m/e)	217 (11%)	837 (44%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	56 (25%)	148 (65%)	－ (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (－)	59 (26%)	25 (11%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	50 (18%)	160 (58%)	－ (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	50 (18%)	<20 (－)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　富加町（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

	人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	高血圧症治療中		脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	4678 人	– (–)		<20 (–)		– (–)		– (–)	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	1444	<20	–	0	–	0	–	0	–
30代	634	<20	–	0	–	0	–	0	–
40代	726	<20	–	<20	–	<20	–	0	–
50代	625	47	7.5	0	–	<20	–	0	–
60代	771	121	15.7	<20	–	<20	–	0	–
70～74歳	478	117	24.5	<20	–	24	20.5	0	–
再掲 40～74歳(Y)/(g)	2600	–	–	<20	–	49	16.1	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
– (–)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
1244人 (47.8)	233人 (18.7)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）342 人 (27.5 (j/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	78	74	Ⅰ度	45 (58%)	<20 (–)	53 (68%)
治療中(k)	Ⅱ度	22	–	Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
治療中(k)	Ⅲ度	<20	–	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
未治療(l)	Ⅰ度	96	75	Ⅰ度	40 (42%)	<20 (–)	73 (76%)
未治療(l)	Ⅱ度	21	–	Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
未治療(l)	Ⅲ度	<20	–	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
	分類	人数	l内での割合				

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	94 (8%)	617 (50%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	<20 (–)	65 (62%)	– (99%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	24 (23%)	<20 (–)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	<20 (–)	79 (62%)	– (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	32 (25%)	<20 (–)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　川辺町（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

	人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	高血圧症治療中		脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	8185 人	– (–)		– (–)		– (–)		<20 (–)	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	2547	<20	–	0	–	<20	–	0	–
30代	992	35	3.5	<20	–	<20	–	0	–
40代	1239	113	9.1	<20	–	<20	–	0	–
50代	1283	246	19.2	<20	–	26	10.6	0	–
60代	1358	425	31.3	<20	–	34	8	<20	–
70～74歳	766	326	42.6	<20	–	37	11.3	0	–
再掲 40～74歳(Y)/(g)	4646	1110	23.9	35	3.2	–	–	<20	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
654 人 (58.9 (h/g))

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
2474人 (53.3)	509人 (20.6)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）707 人 (28.6 (j/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	182	73	Ⅰ度	70 (38%)	27 (15%)	106 (58%)
治療中(k)	Ⅱ度	50	–	Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	31～49 (–)
治療中(k)	Ⅲ度	<20	–	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
未治療(l)	Ⅰ度	213	82	Ⅰ度	65 (31%)	<20 (–)	163 (77%)
未治療(l)	Ⅱ度	40	–	Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	21～39 (–)
未治療(l)	Ⅲ度	<20	–	Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
	分類	人数	l内での割合				

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	283 (11%)	1068 (43%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	57 (23%)	147 (59%)	– (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	51 (20%)	38 (15%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	69 (27%)	180 (69%)	– (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	58 (22%)	<20 (–)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　七宗町（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計	2533 人
年代別	人数(T)
20代以下	605
30代	207
40代	313
50代	426
60代	630
70～74歳	352
再掲 40～74歳(Y)	1721

高血圧症治療中	– (–)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	–
30代	<20	–
40代	<20	–
50代	54	12.7
60代	200	31.7
70～74歳	182	51.7
再掲 40～74歳(g)	–	–

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	<20 (–)		– (–)		– (–)	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	0	–	0	–	0	–
30代	0	–	0	–	0	–
40代	0	–	<20	–	0	–
50代	0	–	<20	–	0	–
60代	<20	–	22	11	0	–
70～74歳	<20	–	34	18.7	0	–
再掲 40～74歳	<20	–	60	13.3	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
–（–）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
896人 (52.1)	251人 (28)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）　320 人 (35.7 (j/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	105	76
	Ⅱ度	28	–
	Ⅲ度	<20	–
未治療(l)	Ⅰ度	88	79
	Ⅱ度	<20	–
	Ⅲ度	<20	–
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中 Ⅰ度	44 (42%)	<20 (–)	78 (74%)
治療中 Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	9～27 (–)
治療中 Ⅲ度	<20 (–)	0 (–)	<20 (–)
未治療 Ⅰ度	23 (26%)	<20 (–)	67 (76%)
未治療 Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
未治療 Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	175 (20%)	469 (52%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	82 (59%)	128 (92%)	– (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	0 (0%)	49 (35%)	<20 (–)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	50 (45%)	93 (83%)	– (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (0%)	35 (31%)	<20 (–)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　八百津町（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計	7975 人
年代別	人数(T)
20代以下	2084
30代	788
40代	1149
50代	1287
60代	1703
70～74歳	964
再掲 40～74歳(Y)	5103

高血圧症治療中	– (–)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	–
30代	<20	–
40代	49	4.3
50代	117	9.1
60代	352	20.7
70～74歳	290	30.1
再掲 40～74歳(g)	808	15.8

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	– (–)		– (–)		– (–)	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	0	–	0	–	0	–
30代	<20	–	<20	–	0	–
40代	<20	–	<20	–	0	–
50代	<20	–	<20	–	0	–
60代	22	6.3	37	10.5	0	–
70～74歳	<20	–	52	17.9	0	–
再掲 40～74歳	48	5.9	112	13.9	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
446 人（55.2 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
2597人 (50.9)	– (–)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）　832 人 (32 (j/e))

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	211	74
	Ⅱ度	61	–
	Ⅲ度	<20	–
未治療(l)	Ⅰ度	247	80
	Ⅱ度	43	14
	Ⅲ度	20	6
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中 Ⅰ度	85 (40%)	28 (13%)	134 (64%)
治療中 Ⅱ度	25 (41%)	<20 (–)	42～60 (–)
治療中 Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
未治療 Ⅰ度	79 (32%)	<20 (–)	177 (72%)
未治療 Ⅱ度	<20 (–)	<20 (–)	24～42 (–)
未治療 Ⅲ度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	316 (12%)	1263 (49%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	99 (35%)	218 (76%)	– (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	83 (29%)	24 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	86 (28%)	230 (74%)	310 (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	76 (25%)	<20 (–)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　白川町（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

	人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）		高血圧症治療中		脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	5389 人		– (–)		– (–)		– (–)		<20 (–)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	1153	20代以下	<20	–	0	–	0	–	0	–
30代	459	30代	<20	–	0	–	0	–	0	–
40代	706	40代	24	3.4	<20	–	<20	–	<20	–
50代	987	50代	72	7.3	<20	–	<20	–	0	–
60代	1334	60代	230	17.2	<20	–	34	14.8	<20	–
70～74歳	750	70～74歳	222	29.6	20	9	46	20.7	<20	–
再掲 40～74歳(Y)	3777	再掲 40～74歳(g)	548	14.5	39	7.1	90	16.4	<20	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
305 人（55.7 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診　※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
1978人 (52.4)	451人 (22.8)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）
565 人（28.6 (j/e)）

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	I度	149	75
	II度	44	–
	III度	<20	–
未治療(l)	I度	194	77
	II度	45	–
	III度	<20	–
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
I度	48 (32%)	26 (17%)	87 (58%)
II度	<20 (–)	<20 (–)	24 (55%)
III度	<20 (–)	0 (–)	<20 (–)
I度	52 (27%)	<20 (–)	130 (67%)
II度	<20 (–)	<20 (–)	26～44 (–)
III度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	220 (11%)	845 (43%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	64 (32%)	145 (73%)	– (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	60 (30%)	<20 (–)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	76 (30%)	170 (68%)	– (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (0%)	52 (21%)	<20 (–)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　東白川村（総数）　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

	人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）		高血圧症治療中		脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	1463 人		– (–)		<20 (–)		– (–)		– (–)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	330	20代以下	0	–	0	–	0	–	0	–
30代	138	30代	<20	–	0	–	0	–	0	–
40代	185	40代	<20	–	0	–	0	–	0	–
50代	304	50代	54	17.8	<20	–	<20	–	0	–
60代	321	60代	156	48.6	<20	–	<20	–	0	–
70～74歳	185	70～74歳	122	65.9	<20	–	<20	–	0	–
再掲 40～74歳(Y)	995	再掲 40～74歳(g)	–	–	<20	–	–	–	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
–（–）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診　※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
526人 (52.9)	106人 (20.2)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）
203 人（38.6 (j/e)）

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	I度	49	83
	II度	<20	–
	III度	<20	–
未治療(l)	I度	38	81
	II度	<20	–
	III度	<20	–
	分類	人数	l内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
I度	20 (41%)	<20 (–)	28 (57%)
II度	<20 (–)	0 (–)	<20 (–)
III度	<20 (–)	0 (–)	<20 (–)
I度	<20 (–)	0 (–)	19～37 (–)
II度	<20 (–)	<20 (–)	<20 (–)
III度	0 (–)	0 (–)	<20 (–)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	<20 (–)	164 (31%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	<20 (–)	21 (36%)	– (98%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	0 (0%)	<20 (–)	<20 (–)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	<20 (–)	<20 (–)	– (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (0%)	<20 (–)	0 (0%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　御嵩町(総数)　(高血圧症)

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中			脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
14690 人		－ (－)			－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	4362	20代以下	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	1841	30代	<20	－	0	－	<20	－	0	－
40代	2276	40代	106	4.7	<20	－	<20	－	0	－
50代	2120	50代	256	12.1	<20	－	61	23.8	0	－
60代	2653	60代	583	22	41	7	120	20.6	<20	－
70～74歳	1438	70～74歳	487	33.9	52	10.7	127	26.1	0	－
再掲 40～74歳(Y)	8487	再掲 40～74歳(g)	1432	16.9	109	7.6	－	－	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
1067 人 (74.5 (h/g))

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
4635人 (54.6)	1172人 (25.3)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)(質問票_服薬有 レセプト有)
1149 人 (24.8 (i/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	314	69	Ⅰ度	148 (47%)	64 (20%)	208 (66%)
治療中(k)	Ⅱ度	104	23	Ⅱ度	51 (49%)	23 (22%)	77 (74%)
治療中(k)	Ⅲ度	34	8	Ⅲ度	15～33 (-)	<20 (-)	15～33 (-)
未治療(l)	Ⅰ度	560	78	Ⅰ度	184 (33%)	43 (8%)	415 (74%)
未治療(l)	Ⅱ度	131	18	Ⅱ度	47 (36%)	<20 (-)	97 (74%)
未治療(l)	Ⅲ度	29	4	Ⅲ度	<20 (-)	<20 (-)	10～28 (-)
	分類	人数	l内での割合				

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	559 (12%)	2287 (49%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	112 (25%)	324 (72%)	452 (100%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (-)	133 (29%)	40 (9%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	200 (28%)	507 (70%)	720 (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (-)	180 (25%)	29 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　多治見市(総数)　(高血圧症)

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中			脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
89260 人		18474 人 (20.7)			－ (－)		2939 人 (15.9)		－ (－)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	26138	20代以下	140	0.5	<10	－	12	8.6	<10	－
30代	10425	30代	352	3.4	17	4.8	36	10.2	<10	－
40代	14406	40代	1469	10.2	72	4.9	166	11.3	11	0.75
50代	14769	50代	3806	25.8	199	5.2	497	13.1	55	1.45
60代	14577	60代	6840	46.9	476	7	1062	15.5	77	1.13
70～74歳	8945	70～74歳	5867	65.6	593	10.1	1166	19.9	81	1.38
再掲 40～74歳(Y)	52697	再掲 40～74歳(g)	17982	34.1	1340	7.5	2891	16.1	224	1.25

gのうち特定健診未受診の者(h)
13472 人 (74.9 (h/g))

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
26346人 (50)	5800人 (22)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)(質問票_服薬有 レセプト有)
6538 人 (24.8 (i/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	1764	74	Ⅰ度	802 (45%)	347 (20%)	1150 (65%)
治療中(k)	Ⅱ度	518	22	Ⅱ度	226 (44%)	88 (17%)	356 (69%)
治療中(k)	Ⅲ度	111	5	Ⅲ度	58 (52%)	17 (15%)	84 (76%)
未治療(l)	Ⅰ度	2648	78	Ⅰ度	818 (31%)	216 (8%)	1909 (72%)
未治療(l)	Ⅱ度	634	19	Ⅱ度	236 (37%)	58 (9%)	466 (74%)
未治療(l)	Ⅲ度	125	4	Ⅲ度	58 (46%)	13 (10%)	97 (78%)
	分類	人数	l内での割合				

注 %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	2325 (9%)	13080 (50%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	208 (9%)	1221 (51%)	2379 (99%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	40 (2%)	502 (21%)	207 (9%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	311 (9%)	1792 (53%)	3387 (99%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	28 (1%)	636 (19%)	121 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　瑞浪市(総数)　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中			脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
30683 人		6536 人 (21.3)			– (–)		– (–)		– (–)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	9592	20代以下	38	0.4	<10	–	<10	–	<10	–
30代	3808	30代	123	3.2	10	8.1	16	13	<10	–
40代	4767	40代	503	10.6	20	4	51	10.1	<10	–
50代	4800	50代	1325	27.6	51	3.8	194	14.6	18	1.36
60代	4869	60代	2484	51	179	7.2	406	16.3	26	1.05
70～74歳	2847	70～74歳	2063	72.5	240	11.6	485	23.5	33	1.6
再掲 40～74歳(Y)	17283	再掲 40～74歳(g)	6375	36.9	490	7.7	1136	17.8	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
4174 人 (65.5 (h/g))

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診　※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
8745人 (50.6)	2207人 (25.2)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)(質問票_服薬有 レセプト有)
2288 人 (26.2 (i/e))

	分類	人数	kの内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	746	74
治療中(k)	Ⅱ度	208	21
治療中(k)	Ⅲ度	58	6
未治療(l)	Ⅰ度	953	80
未治療(l)	Ⅱ度	204	17
未治療(l)	Ⅲ度	38	3
	分類	人数	lの内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	282 (38%)	119 (16%)	495 (66%)
Ⅱ度	101 (49%)	36 (17%)	154 (74%)
Ⅲ度	30 (52%)	<10 (–)	48 (83%)
Ⅰ度	317 (33%)	71 (7%)	695 (73%)
Ⅱ度	80 (39%)	17 (8%)	165 (81%)
Ⅲ度	19 (50%)	<10 (–)	29～37 (–)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	587 (7%)	4692 (54%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	99 (10%)	522 (52%)	1003～1011 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	12 (1%)	191 (19%)	79 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	146 (12%)	750 (63%)	1186～1194 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	13 (1%)	265 (22%)	39 (3%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　土岐市(総数)　　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中			脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
45636 人		7026 人 (15.4)			– (–)		– (–)		– (–)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	13534	20代以下	18	0.1	0	–	0	–	0	–
30代	5537	30代	95	1.7	<10	–	11	11.6	<10	–
40代	7432	40代	490	6.6	31	6.3	52	10.6	16	3.27
50代	7418	50代	1466	19.8	81	5.5	123	8.4	32	2.18
60代	7295	60代	2697	37	199	7.4	325	12.1	45	1.67
70～74歳	4420	70～74歳	2260	51.1	200	8.8	330	14.6	32	1.42
再掲 40～74歳(Y)	26565	再掲 40～74歳(g)	6913	26	511	7.4	830	12	125	1.81

gのうち特定健診未受診の者(h)
5043 人 (72.9 (h/g))

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診　※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
14001人 (52.7)	3548人 (25.3)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)(質問票_服薬有 レセプト有)
3316 人 (23.7 (i/e))

	分類	人数	kの内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	1083	73
治療中(k)	Ⅱ度	323	22
治療中(k)	Ⅲ度	81	5
未治療(l)	Ⅰ度	1602	78
未治療(l)	Ⅱ度	377	18
未治療(l)	Ⅲ度	82	4
	分類	人数	lの内での割合

血圧分類	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	477 (44%)	216 (20%)	717 (66%)
Ⅱ度	131 (41%)	57 (18%)	228 (71%)
Ⅲ度	46 (57%)	10 (12%)	64 (79%)
Ⅰ度	501 (31%)	131 (8%)	1158 (72%)
Ⅱ度	135 (36%)	43 (11%)	292 (77%)
Ⅲ度	36 (44%)	14 (17%)	67 (82%)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	853 (6%)	7547 (54%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	95 (6%)	878 (59%)	1478～1486 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	16 (1%)	333 (22%)	167 (11%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	154 (7%)	1281 (62%)	2052～2060 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	22 (1%)	408 (20%)	88 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　中津川市（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

	人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	高血圧症治療中	脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析
総数	62231 人	11755 人 (18.9)	– (–)	– (–)	– (–)

年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	18960	54	0.3	<10	–	<10	–	<10	–
30代	7568	178	2.4	17	9.6	15	8.4	<10	–
40代	9975	912	9.1	102	11.2	83	9.1	10	1.1
50代	9464	2406	25.4	235	9.8	219	9.1	38	1.58
60代	10330	4512	43.7	404	9	612	13.6	76	1.68
70〜74歳	5934	3693	62.2	429	11.6	621	16.8	65	1.76
再掲 40〜74歳(Y) / (g)	35703	11523	32.3	1170	10.2	1535	13.3	189	1.64

gのうち特定健診未受診の者(h)
6459 人 (56.1 (h/g))

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40-74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
19333人 (54.1)	4693人 (24.3)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)(質問票_服薬有 レセプト有)
5384 人 (27.8 (i/e))

	分類	人数	割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	1627	71	Ⅰ度	676 (42%)	283 (17%)	1083 (67%)
治療中(k)	Ⅱ度	529	23	Ⅱ度	219 (41%)	78 (15%)	368 (70%)
治療中(k)	Ⅲ度	129	6	Ⅲ度	71 (55%)	21 (16%)	97 (75%)
未治療(l)	Ⅰ度	1925	80	Ⅰ度	603 (31%)	159 (8%)	1391 (72%)
未治療(l)	Ⅱ度	402	17	Ⅱ度	145 (36%)	36 (9%)	299 (74%)
未治療(l)	Ⅲ度	81	3	Ⅲ度	33 (41%)	<10 (–)	67 (83%)

割合：kの行はk内での割合、lの行はl内での割合

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	713 (4%)	9251 (48%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	129 (6%)	1304 (57%)	2276〜2284 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	44 (2%)	495 (22%)	169 (7%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	142 (6%)	1357 (56%)	2399〜2407 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	19 (1%)	510 (21%)	95 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell., Keith-Wagener, Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　恵那市（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

	人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	高血圧症治療中	脳血管疾患	虚血性心疾患	人工透析
総数	38397 人	6470 人 (16.9)	– (–)	– (–)	– (–)

年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	11092	84	0.8	<10	–	<10	–	0	–
30代	4223	93	2.2	<10	–	<10	–	0	–
40代	6119	431	7	17	3.9	27	6.3	0	–
50代	5978	1170	19.6	51	4.4	125	10.7	<10	–
60代	6924	2555	36.9	142	5.6	275	10.8	<10	–
70〜74歳	4061	2137	52.6	189	8.8	353	16.5	10	0.47
再掲 40〜74歳(Y) / (g)	23082	6293	27.3	399	6.3	780	12.4	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
3426 人 (54.4 (h/g))

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40-74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
12118人 (52.5)	3136人 (25.9)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)(質問票_服薬有 レセプト有)
3369 人 (27.8 (i/e))

	分類	人数	割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	1013	70	Ⅰ度	418 (41%)	171 (17%)	647 (64%)
治療中(k)	Ⅱ度	341	24	Ⅱ度	148 (43%)	68 (20%)	248 (73%)
治療中(k)	Ⅲ度	95	7	Ⅲ度	46 (48%)	12 (13%)	69 (73%)
未治療(l)	Ⅰ度	1288	76	Ⅰ度	397 (31%)	104 (8%)	977 (76%)
未治療(l)	Ⅱ度	332	20	Ⅱ度	128 (39%)	44 (13%)	256 (77%)
未治療(l)	Ⅲ度	67	4	Ⅲ度	29 (43%)	13 (19%)	51 (76%)

割合：kの行はk内での割合、lの行はl内での割合

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害

	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	767 (6%)	6944 (57%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	175 (12%)	936 (65%)	1440〜1448 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	51 (4%)	407 (28%)	119 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	217 (13%)	1133 (67%)	1678〜1686 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	36 (2%)	377 (22%)	67 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell., Keith-Wagener, Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　高山市（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
69013 人	
年代別	人数(T)
20代以下	20106
30代	8114
40代	11693
50代	10818
60代	11150
70～74歳	7132
再掲 40～74歳(Y)	40793

高血圧症治療中 12317 人 (17.8)			脳血管疾患 – (–)		虚血性心疾患 – (–)		人工透析 – (–)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	50	0.2	<10	–	<10	–	<10	–
30代	174	2.1	<10	–	<10	–	<10	–
40代	1007	8.6	35	3.5	86	8.5	18	1.79
50代	2576	23.8	86	3.3	248	9.6	29	1.13
60代	4551	40.8	277	6.1	677	14.9	52	1.14
70～74歳	3959	55.5	310	7.8	740	18.7	51	1.29
再掲 40～74歳(g)	12093	29.6	708	5.9	1751	14.5	150	1.24

gのうち特定健診未受診の者(h)
6408 人 （53 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：23081人 (56.6)
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：4522人 (19.6)
※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）
5715 人 (24.8 (i/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	1614	74	Ⅰ度	611 (38%)	243 (15%)	1004 (62%)
治療中(k)	Ⅱ度	472	22	Ⅱ度	192 (41%)	74 (16%)	315 (67%)
治療中(k)	Ⅲ度	97	4	Ⅲ度	44 (45%)	20 (21%)	59 (61%)
未治療(l)	Ⅰ度	1812	77	Ⅰ度	602 (33%)	134 (7%)	1290 (71%)
未治療(l)	Ⅱ度	428	18	Ⅱ度	167 (39%)	47 (11%)	304 (71%)
未治療(l)	Ⅲ度	99	4	Ⅲ度	55 (56%)	15 (15%)	73 (74%)
	分類	人数	l内での割合				

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	1509 (7%)	11383 (49%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	354 (16%)	986 (45%)	2171 (99%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	14 (1%)	383 (18%)	121 (6%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	414 (18%)	1291 (55%)	2317 (99%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	11 (0%)	396 (17%)	76 (3%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　飛騨市（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
17257 人	
年代別	人数(T)
20代以下	4379
30代	1821
40代	2816
50代	2920
60代	3220
70～74歳	2101
再掲 40～74歳(Y)	11057

高血圧症治療中 – (–)			脳血管疾患 – (–)		虚血性心疾患 – (–)		人工透析 – (–)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	<20	–	0	–	0	–	0	–
30代	27	1.5	<20	–	0	–	0	–
40代	182	6.5	<20	–	<20	–	<20	–
50代	577	19.8	<20	–	47	8.1	<20	–
60代	1144	35.5	39	3.4	129	11.3	<20	–
70～74歳	1045	49.7	70	6.7	175	16.7	<20	–
再掲 40～74歳(g)	2948	26.7	130	4.4	–	–	26	0.88

gのうち特定健診未受診の者(h)
1199 人 （40.7 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：7085人 (64.1)
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)：1698人 (24)
※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）
2094 人 (29.6 (i/e))

	分類	人数	k内での割合	血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
治療中(k)	Ⅰ度	607	73	Ⅰ度	249 (41%)	103 (17%)	392 (65%)
治療中(k)	Ⅱ度	181	22	Ⅱ度	76 (42%)	35 (19%)	115 (64%)
治療中(k)	Ⅲ度	45	5	Ⅲ度	26～44 (–)	<20 (–)	26～44 (–)
未治療(l)	Ⅰ度	678	78	Ⅰ度	220 (32%)	65 (10%)	478 (71%)
未治療(l)	Ⅱ度	142	16	Ⅱ度	52 (37%)	<20 (–)	110 (77%)
未治療(l)	Ⅲ度	45	5	Ⅲ度	21 (47%)	<20 (–)	26～44 (–)
	分類	人数	l内での割合				

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	385 (5%)	2898 (41%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	58 (7%)	285 (34%)	814～832 (–)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	<20 (–)	110 (13%)	70 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	100 (12%)	438 (51%)	846～864 (–)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	151 (17%)	36 (4%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell.、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　下呂市（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
23127 人	
年代別	人数(T)
20代以下	5984
30代	2344
40代	3543
50代	3925
60代	4554
70～74歳	2777
再掲 40～74歳(Y)	14799

高血圧症治療中		
－（－）		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<10	－
30代	50	2.1
40代	247	7
50代	842	21.5
60代	1650	36.2
70～74歳	1405	50.6
再掲 40～74歳(g)	4144	28

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－（－）		－（－）		－（－）	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	0	－	0	－
0	－	<10	－	0	－
18	7.3	18	7.3	<10	－
49	5.8	73	8.7	<10	－
138	8.4	226	13.7	11	0.67
131	9.3	233	16.6	13	0.93
336	8.1	550	13.3	30	0.72

gのうち特定健診未受診の者(h)
1973 人（47.6 (h/g)）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
8711人 (58.9)	1889人 (21.7)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）
2413 人（27.7 (j/e)）

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	671	73
	Ⅱ度	191	21
	Ⅲ度	57	6
未治療(l)	Ⅰ度	787	81
	Ⅱ度	147	15
	Ⅲ度	36	4
	分類	人数	l内での割合

その他のリスク			
血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	250 (37%)	120 (18%)	392 (58%)
Ⅱ度	75 (39%)	34 (18%)	123 (64%)
Ⅲ度	28 (49%)	11 (19%)	40 (70%)
Ⅰ度	229 (29%)	72 (9%)	542 (69%)
Ⅱ度	59 (40%)	14 (10%)	120 (82%)
Ⅲ度	18 (50%)	<10 (-)	27～35 (-)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	891 (10%)	4245 (49%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	177 (19%)	443 (48%)	910～918 (-)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	20 (2%)	184 (20%)	70 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	191 (20%)	517 (53%)	961～969 (-)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	20 (2%)	168 (17%)	29 (3%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　白川村（総数）　（高血圧症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
1247 人	
年代別	人数(T)
20代以下	387
30代	152
40代	198
50代	177
60代	205
70～74歳	128
再掲 40～74歳(Y)	708

高血圧症治療中		
－（－）		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	0	－
30代	<20	－
40代	<20	－
50代	22	12.4
60代	42	20.5
70～74歳	53	41.4
再掲 40～74歳(g)	－	－

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
<20（－）		<20（－）		－（－）	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	0	－	0	－
0	－	0	－	0	－
0	－	0	－	0	－
0	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
0	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
－（－）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)
468人 (66.1)	95人 (20.3)

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(j)（質問票_服薬有 レセプト有）
118 人（25.2 (j/e)）

	分類	人数	k内での割合
治療中(k)	Ⅰ度	28	67
	Ⅱ度	<20	－
	Ⅲ度	<20	－
未治療(l)	Ⅰ度	38	72
	Ⅱ度	<20	－
	Ⅲ度	<20	－
	分類	人数	l内での割合

その他のリスク			
血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
Ⅰ度	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
Ⅱ度	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
Ⅲ度	<20 (-)	0 (-)	<20 (-)
Ⅰ度	19～37 (-)	<20 (-)	19～37 (-)
Ⅱ度	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
Ⅲ度	<20 (-)	0 (-)	<20 (-)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(＋以上)
詳細健診実施者(m) (m/e)	<20 (-)	217 (46%)	
検査実施者(n) 実施率(n/k)	0 (0%)	<20 (-)	－ (98%)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	0 (0%)	<20 (-)	<20 (-)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	<20 (-)	31 (58%)	－ (100%)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (0%)	<20 (-)	0 (0%)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

2　糖尿病



※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。



※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　各務原市（総数）　（糖尿病）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
122017 人	
年代別	人数(T)
20代以下	39341
30代	15485
40代	21405
50代	18310
60代	16283
70～74歳	11193
再掲 40～74歳(Y)	67191

糖尿病治療中 16973 人 (13.9)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	591	1.5
30代	834	5.4
40代	2020	9.4
50代	3478	19
60代	5153	31.6
70～74歳	4897	43.8
再掲 40～74歳(g)	15548	23.1

インスリン療法 831 人 (4.9)		糖尿病性腎症 88 人 (0.5)		人工透析 – (–)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
15	2.5	<10	–	<10	–
39	4.7	<10	–	<10	–
88	4.4	<10	–	<10	–
194	5.6	16	0.5	27	0.78
247	4.8	25	0.5	30	0.58
248	5.1	35	0.7	42	0.86
777	5	–	–	–	–

gのうち特定健診未受診者(h)：8820 人（56.7）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：33661人（50.1）

※糖尿病型(f)(f/e)：8681人（25.8）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：8276 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：405 人（5）(j/f)

	その他のリスク		
	高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 1649（20）	1114（67.6）	890（54）	1159（70.3）
※コントロール良 6627（80）	4024（60.7）	2387（36）	4270（64.4）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類		第1期	第2期	第3期	第4期
		腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR		30以上			30未満
尿蛋白	アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
	尿蛋白	(－)	(±)	(±)以上	問わない
		2081	230	206	13

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　山県市（総数）　（糖尿病）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
20688 人	
年代別	人数(T)
20代以下	5773
30代	2062
40代	3163
50代	3264
60代	4076
70～74歳	2350
再掲 40～74歳(Y)	12853

糖尿病治療中 3770 人 (18.2)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	74	1.3
30代	106	5.1
40代	318	10.1
50代	640	19.6
60代	1419	34.8
70～74歳	1213	51.6
再掲 40～74歳(g)	3590	27.9

インスリン療法 – (–)		糖尿病性腎症 – (–)		人工透析 – (–)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	–	<10	–	0	–
<10	–	<10	–	0	–
<10	–	<10	–	<10	–
19	3	42	6.6	<10	–
41	2.9	81	5.7	<10	–
45	3.7	68	5.6	<10	–
–	–	–	–	19	0.53

gのうち特定健診未受診者(h)：2129 人（59.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5989人（46.6）

※糖尿病型(f)(f/e)：1821人（30.4）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1734 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：87 人（5）(j/f)

	その他のリスク		
	高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 293（17）	185（63.1）	152（51.9）	190（64.8）
※コントロール良 1441（83）	883（61.3）	531（36.8）	869（60.3）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類		第1期	第2期	第3期	第4期
		腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR		30以上			30未満
尿蛋白	アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
	尿蛋白	(－)	(±)	(±)以上	問わない
		593	59	34	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　瑞穂市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：49401 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		4399 人 (8.9)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	18124	163	0.9	<10	–	0	–	0	–
30代	7085	199	2.8	<10	–	<10	–	<10	–
40代	8721	537	6.2	16	3	<10	–	0	–
50代	6663	940	14.1	34	3.6	<10	–	11	1.17
60代	5549	1458	26.3	43	2.9	13	0.9	15	1.03
70～74歳	3259	1102	33.8	30	2.7	11	1	14	1.27
再掲 40～74歳(Y)	24192	再掲 40～74歳(g) 4037	16.7	123	3	35	0.9	–	–

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：2115 人（52.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：12623人（52.2）

※糖尿病型(f)(f/e)：3109人（24.6）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：2964 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：145 人（5）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 541（18）	130/80以上 335（61.9）	BMI 25以上 289（53.4）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 350（64.7）
※コントロール良 2423（82）	1288（53.2）	907（37.4）	1455（60）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	874	81	67	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　本巣市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：27780 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		2425 人 (8.7)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	8978	52	0.6	<10	–	0	–	0	–
30代	3066	87	2.8	<10	–	<10	–	0	–
40代	4734	257	5.4	<10	–	0	–	0	–
50代	3963	504	12.7	20	4	<10	–	0	–
60代	4302	826	19.2	24	2.9	<10	–	0	–
70～74歳	2737	699	25.5	27	3.9	<10	–	0	–
再掲 40～74歳(Y)	15736	再掲 40～74歳(g) 2286	14.5	–	–	–	–	–	–

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：1290 人（56.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：8197人（52.1）

※糖尿病型(f)(f/e)：2220人（27.1）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：2128 人（96）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：92 人（4）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 367（17）	130/80以上 208（56.7）	BMI 25以上 189（51.5）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 244（66.5）
※コントロール良 1761（83）	886（50.3）	606（34.4）	1104（62.7）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	635	68	50	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　岐南町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：22557 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		4974 人 (22.1)		－ (－)		－ (－)		<10 (－)	
20代以下	8030	474	5.9	<10	－	<10	－	0	－
30代	3464	484	14	17	3.5	0	－	0	－
40代	3933	863	21.9	28	3.2	<10	－	0	－
50代	3092	1121	36.3	55	4.9	<10	－	<10	－
60代	2497	1197	47.9	50	4.2	<10	－	<10	－
70～74歳	1541	835	54.2	26	3.1	<10	－	0	－
再掲 40～74歳(Y)	11063	再掲 40～74歳(g) 4016	36.3	159	4	17	0.4	<10	－

軽症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：2355 人（58.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5418人（49）

※糖尿病型(f)(f/e)：1371人（25.3）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1309 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：62 人（5）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 260（20）	130/80以上 180（69.2）	BMI 25以上 134（51.5）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 179（68.8）
※コントロール良 1049（80）	630（60.1）	419（39.9）	646（61.6）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	375	38	50	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　笠松町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：18530 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		7374 人 (39.8)		－ (－)		－ (－)		－ (－)	
20代以下	6036	326	5.4	<20	－	0	－	0	－
30代	2391	334	14	26	7.8	<20	－	<20	－
40代	3313	917	27.7	52	5.7	<20	－	<20	－
50代	2887	1614	55.9	110	6.8	<20	－	31	1.92
60代	2368	2218	93.7	156	7	<20	－	49	2.21
70～74歳	1535	1965	128	152	7.7	<20	－	45	2.29
再掲 40～74歳(Y)	10103	再掲 40～74歳(g) 6714	66.5	470	7	54	0.8	－	－

軽症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：4454 人（66.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5044人（49.9）

※糖尿病型(f)(f/e)：1407人（27.9）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1354 人（96）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：53 人（4）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 278（21）	130/80以上 168（60.4）	BMI 25以上 154（55.4）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 196（70.5）
※コントロール良 1076（79）	608（56.5）	418（38.8）	648（60.2）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	338	39	31	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　北方町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：15818 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		3467 人 (21.9)		– (–)		<20 (–)		<20 (–)	
20代以下	5306	303	5.7	<20	–	0	–	0	–
30代	2077	360	17.3	<20	–	0	–	0	–
40代	2799	540	19.3	<20	–	0	–	0	–
50代	2401	725	30.2	<20	–	<20	–	0	–
60代	2048	886	43.3	26	2.9	<20	–	<20	–
70～74歳	1187	653	55	<20	–	0	–	0	–
再掲 40～74歳(Y)	8435	再掲 40～74歳(g) 2804	33.2	73	2.6	<20	–	<20	–

gのうち特定健診未受診者(h)：1811 人（64.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：3984人（47.2）

※糖尿病型(f)(f/e)：948人（23.8）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：889 人（94）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：59 人（6）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 174（20）	130/80以上 121（69.5）	BMI 25以上 100（57.5）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 124（71.3）
※コントロール良 715（80）	397（55.5）	272（38）	479（67）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
蛋白 尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	362	36	28	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　大垣市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：133848 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		31594 人 (23.6)		1565 人 (5)		– (–)		– (–)	
20代以下	43137	1520	3.5	66	4.3	<10	–	<10	–
30代	17456	1758	10.1	86	4.9	22	1.3	<10	–
40代	22764	3918	17.2	165	4.2	77	2	17	0.43
50代	20614	6410	31.1	357	5.6	163	2.5	51	0.8
60代	18841	9780	51.9	492	5	254	2.6	96	0.98
70～74歳	11036	8208	74.4	399	4.9	170	2.1	87	1.06
再掲 40～74歳(Y)	73255	再掲 40～74歳(g) 28316	38.7	1413	5	664	2.3	251	0.89

gのうち特定健診未受診者(h)：18310 人（64.7）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：34767人（47.5）

※糖尿病型(f)(f/e)：8239人（23.7）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：7734 人（94）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：505 人（6）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 1393（18）	130/80以上 952（68.3）	BMI 25以上 827（59.4）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 920（66）
※コントロール良 6341（82）	3634（57.3）	2383（37.6）	3911（61.7）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
蛋白 尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	3706	495	398	34

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　海津市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：27349 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		4898 人 (17.9)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	7367	140	1.9	<10	–	0	–	0	–
30代	2928	227	7.8	<10	–	0	–	0	–
40代	4298	556	12.9	17	3.1	<10	–	<10	–
50代	4382	956	21.8	36	3.8	<10	–	<10	–
60代	5367	1716	32	62	3.6	<10	–	0	–
70～74歳	3007	1303	43.3	43	3.3	<10	–	<10	–
再掲 40～74歳(Y)	17054	再掲 40～74歳(g) 4531	26.6	158	3.5	14	0.3	–	–

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：2699 人（59.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：7947人（46.6）

※糖尿病型(f)(f/e)：2401人（30.2）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：2258 人（94）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：143 人（6）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 473（21）	130/80以上 313（66.2）	BMI 25以上 278（58.8）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 300（63.4）
※コントロール良 1785（79）	1091（61.1）	704（39.4）	1080（60.5）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	625	68	44	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　養老町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：22484 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		3692 人 (16.4)		– (–)		<10 (–)		– (–)	
20代以下	6244	85	1.4	<10	–	0	–	0	–
30代	2361	130	5.5	<10	–	<10	–	0	–
40代	3599	305	8.5	<10	–	<10	–	<10	–
50代	3486	612	17.6	11	1.8	<10	–	<10	–
60代	4345	1427	32.8	25	1.8	<10	–	<10	–
70～74歳	2449	1133	46.3	22	1.9	<10	–	<10	–
再掲 40～74歳(Y)	13879	再掲 40～74歳(g) 3477	25.1	–	–	<10	–	15	0.43

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：2092 人（60.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：6754人（48.7）

※糖尿病型(f)(f/e)：1964人（29.1）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1866 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：98 人（5）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 334（18）	130/80以上 237（71）	BMI 25以上 183（54.8）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 200（59.9）
※コントロール良 1532（82）	952（62.1）	598（39）	903（58.9）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	551	66	41	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　垂井町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：22194 人

年代別	人数(T)
20代以下	6775
30代	2611
40代	3736
50代	3296
60代	3534
70～74歳	2242
再掲 40～74歳(Y)	12808

糖尿病治療中：3368 人（15.2）

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	84	1.2
30代	114	4.4
40代	360	9.6
50代	636	19.3
60代	1158	32.8
70～74歳	1016	45.3
再掲 40～74歳(g)	3170	24.8

	インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
	－（－）		－（－）		－（－）	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	0	－	0	－	0	－
30代	<10	－	0	－	0	－
40代	12	3.3	0	－	0	－
50代	33	5.2	<10	－	12	1.89
60代	53	4.6	<10	－	18	1.55
70～74歳	39	3.8	<10	－	16	1.57
再掲 40～74歳(g)	137	4.3	－	－	－	－

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：2493 人（78.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5831人（45.5）

※糖尿病型(f)(f/e)：1100人（18.9）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：984 人（89）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：116 人（11）(j/f)

	その他のリスク		
	高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 225（23）	146（64.9）	137（60.9）	147（65.3）
※コントロール良 759（77）	446（58.8）	309（40.7）	499（65.7）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	531	63	51	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　関ケ原町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：5198 人

年代別	人数(T)
20代以下	1337
30代	500
40代	744
50代	861
60代	1061
70～74歳	695
再掲 40～74歳(Y)	3361

糖尿病治療中：－（－）

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	－
30代	37	7.4
40代	102	13.7
50代	236	27.4
60代	500	47.1
70～74歳	487	70.1
再掲 40～74歳(g)	1325	39.4

	インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
	－（－）		<20（－）		<20（－）	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	0	－	0	－	0	－
30代	0	－	<20	－	0	－
40代	0	－	0	－	<20	－
50代	<20	－	<20	－	0	－
60代	<20	－	<20	－	<20	－
70～74歳	<20	－	<20	－	<20	－
再掲 40～74歳(g)	－	－	<20	－	<20	－

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：877 人（66.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：1611人（47.9）

※糖尿病型(f)(f/e)：486～504（－）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：485 人（96）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：<20（－）

	その他のリスク		
	高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 83（17）	56（67.5）	43（51.8）	56（67.5）
※コントロール良 402（83）	248（61.7）	145（36.1）	246（61.2）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	118	<20	<20	0

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　神戸町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：15550 人

年代別	人数(T)
20代以下	4742
30代	1737
40代	2709
50代	2241
60代	2452
70～74歳	1669
再掲 40～74歳(Y)	9071

経症 → 重症

糖尿病治療中		
1543 人 (9.9)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	52	1.1
30代	65	3.7
40代	160	5.9
50代	294	13.1
60代	477	19.5
70～74歳	495	29.7
再掲 40～74歳(g)	1426	15.7

インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
－ (－)		<20 (－)		<20 (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	0	－	0	－
0	－	0	－	0	－
<20	－	<20	－	<20	－
<20	－	<20	－	<20	－
<20	－	<20	－	<20	－
<20	－	<20	－	<20	－
25	1.8	<20	－	<20	－

gのうち特定健診未受診者(h)：774 人（54.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5056人 (55.7)

※糖尿病型(f)(f/e)：1327人 (26.2)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1274 人 (96) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：53 人 (4) (j/f)

※コントロール不良	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
198 (16)	130/80以上 145 (73.2)	BMI 25以上 112 (56.6)	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 135 (68.2)
※コントロール良 1076 (84)	644 (59.9)	412 (38.3)	645 (59.9)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	739	57	54	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　輪之内町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：8415 人

年代別	人数(T)
20代以下	2803
30代	1117
40代	1467
50代	1093
60代	1257
70～74歳	678
再掲 40～74歳(Y)	4495

経症 → 重症

糖尿病治療中		
－ (－)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	－
30代	<20	－
40代	57	3.9
50代	108	9.9
60代	250	19.9
70～74歳	207	30.5
再掲 40～74歳(g)	622	13.8

インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
<20 (－)		<20 (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	0	－	0	－
0	－	0	－	0	－
<20	－	0	－	0	－
0	－	0	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	0	－	0	－
<20	－	<20	－	－	－

gのうち特定健診未受診者(h)：354 人（56.9）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：2382人 (53)

※糖尿病型(f)(f/e)：610人 (25.6)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：581 人 (95) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：29 人 (5) (j/f)

※コントロール不良	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
128 (22)	130/80以上 81 (63.3)	BMI 25以上 83 (64.8)	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 83 (64.8)
※コントロール良 453 (78)	267 (58.9)	191 (42.2)	276 (60.9)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	294	68	34	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　安八町（総数）

（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：12269 人

年代別	人数(T)
20代以下	3919
30代	1367
40代	2259
50代	1805
60代	1774
70～74歳	1145
再掲 40～74歳(Y)	6983

経症 → 重症

糖尿病治療中			インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
－ (－)			<20 (－)		<20 (－)		<20 (－)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	<20	－	0	－	0	－	0	－
40代	70	3.1	0	－	0	－	<20	－
50代	130	7.2	<20	－	<20	－	<20	－
60代	225	12.7	<20	－	<20	－	<20	－
70～74歳	214	18.7	<20	－	0	－	<20	－
再掲 40～74歳(g)	639	9.2	<20	－	<20	－	<20	－

gのうち特定健診未受診者(h)：305 人（47.7）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：3816人（54.6）

※糖尿病型(f)(f/e)：876人（23）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：837 人（96）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：39 人（4）(j/f)

※コントロール不良	その他のリスク 高血圧 130/80以上	肥満 BMI 25以上	脂質 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
174 (21)	109 (62.6)	114 (65.5)	119 (68.4)
※コントロール良 663 (79)	357 (53.8)	239 (36)	408 (61.5)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
蛋白	(－)	(±)	(±)以上	問わない
	359	51	49	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　揖斐川町（総数）

（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：15579 人

年代別	人数(T)
20代以下	4266
30代	1510
40代	2381
50代	2422
60代	3073
70～74歳	1927
再掲 40～74歳(Y)	9803

経症 → 重症

糖尿病治療中			インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
3368 人 (21.6)			194 人 (5.8)		－ (－)		－ (－)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	86	2	<20	－	<20	－	0	－
30代	93	6.2	<20	－	<20	－	<20	－
40代	276	11.6	<20	－	<20	－	0	－
50代	543	22.4	29	5.3	<20	－	<20	－
60代	1205	39.2	70	5.8	46	3.8	<20	－
70～74歳	1165	60.5	59	5.1	52	4.5	<20	－
再掲 40～74歳(g)	3189	32.5	－	－	126	4	－	－

gのうち特定健診未受診者(h)：1869 人（58.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5162人（52.7）

※糖尿病型(f)(f/e)：1396人（27）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1340 人（96）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：56 人（4）(j/f)

※コントロール不良	その他のリスク 高血圧 130/80以上	肥満 BMI 25以上	脂質 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
261 (19)	156 (59.8)	132 (50.6)	156 (59.8)
※コントロール良 1079 (81)	604 (56)	404 (37.4)	605 (56.1)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
蛋白	(－)	(±)	(±)以上	問わない
	343	46	30	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　大野町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：18751 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		1330 人 (7.1)		– (–)		<20 (–)		<20 (–)	
20代以下	5918	30	0.5	0	–	0	–	0	–
30代	2015	34	1.7	0	–	0	–	0	–
40代	3136	106	3.4	<20	–	<20	–	<20	–
50代	2959	235	7.9	<20	–	<20	–	<20	–
60代	2931	459	15.7	<20	–	<20	–	<20	–
70～74歳	1792	466	26	<20	–	<20	–	0	–
再掲 40～74歳(Y)	10818	再掲 40～74歳(g) 1266	11.7	30	2.4	<20	–	<20	–

gのうち特定健診未受診者(h)：673 人（53.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5191人 (48)

※糖尿病型(f)(f/e)：1407人 (27.1)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1347 人 (96) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：60 人 (4) (j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 232 (17)	130/80以上 160 (69)	BMI 25以上 119 (51.3)	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 147 (63.4)
※コントロール良 1115 (83)	681 (61.1)	408 (36.6)	667 (59.8)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
蛋白 尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	427	40	28	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　池田町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：19818 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		1575 人 (7.9)		– (–)		<20 (–)		<20 (–)	
20代以下	6437	38	0.6	<20	–	0	–	0	–
30代	2176	46	2.1	<20	–	0	–	0	–
40代	3338	169	5.1	<20	–	0	–	0	–
50代	3044	274	9	<20	–	0	–	0	–
60代	2990	558	18.7	20	3.6	<20	–	0	–
70～74歳	1833	490	26.7	<20	–	<20	–	<20	–
再掲 40～74歳(Y)	11205	再掲 40～74歳(g) 1491	13.3	48	3.2	<20	–	<20	–

gのうち特定健診未受診者(h)：1121 人（75.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5530人 (49.4)

※糖尿病型(f)(f/e)：1151人 (20.8)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1061 人 (92) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：90 人 (8) (j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 201 (19)	130/80以上 129 (64.2)	BMI 25以上 124 (61.7)	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 117 (58.2)
※コントロール良 860 (81)	500 (58.1)	372 (43.3)	520 (60.5)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
蛋白 尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	447	51	28	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　関市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：71562 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		11996 人 (16.8)		575 人 (4.8)		－ (－)		－ (－)	
20代以下	22282	501	2.2	28	5.6	<10	－	0	－
30代	8252	601	7.3	14	2.3	11	1.8	0	－
40代	11702	1244	10.6	58	4.7	42	3.4	<10	－
50代	10702	2241	20.9	96	4.3	65	2.9	13	0.58
60代	11781	4078	34.6	212	5.2	122	3	32	0.78
70～74歳	6843	3331	48.7	167	5	100	3	16	0.48
再掲 40～74歳(Y)	41028	再掲 40～74歳(g) 10894	26.6	533	4.9	329	3	－	－

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：6471 人（59.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：19207人（46.8）

※糖尿病型(f)(f/e)：4984人（25.9）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：4735 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：249 人（5）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 1009（21）	130/80以上 642（63.6）	BMI 25以上 518（51.3）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 696（69）
※コントロール良 3726（79）	2209（59.3）	1389（37.3）	2416（64.8）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	1688	198	115	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　美濃市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：15745 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		2594 人 (16.5)		－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
20代以下	4320	42	1	0	－	0	－	0	－
30代	1792	87	4.9	<20	－	<20	－	0	－
40代	2328	227	9.8	28	12.3	<20	－	0	－
50代	2404	421	17.5	38	9	<20	－	0	－
60代	3137	986	31.4	85	8.6	47	4.8	<20	－
70～74歳	1764	831	47.1	45	5.4	35	4.2	<20	－
再掲 40～74歳(Y)	9633	再掲 40～74歳(g) 2465	25.6	196	8	107	4.3	<20	－

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：1419 人（57.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：4416人（45.8）

※糖尿病型(f)(f/e)：1294人（29.3）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1228 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：66 人（5）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 253（21）	130/80以上 170（67.2）	BMI 25以上 126（49.8）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 173（68.4）
※コントロール良 975（79）	568（58.3）	308（31.6）	642（65.8）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	463	58	22	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　郡上市（総数）

（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：30848 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		4696 人 (15.2)		－ (－)		－ (－)		－ (－)	
20代以下	8153	126	1.5	<10	－	0	－	0	－
30代	3442	175	5.1	<10	－	<10	－	0	－
40代	4652	416	8.9	23	5.5	24	5.8	0	－
50代	5130	837	16.3	38	4.5	70	8.4	<10	－
60代	6193	1788	28.9	84	4.7	123	6.9	14	0.78
70～74歳	3278	1354	41.3	44	3.2	129	9.5	10	0.74
再掲 40～74歳(Y)	19253	再掲 40～74歳(g) 4395	22.8	189	4.3	346	7.9	－	－

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：2091 人（47.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：11627人 (60.4)

※糖尿病型(f) (f/e)：2994人 (25.8)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：2833 人 (95) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：161 人 (5) (j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 554 (20)	130/80以上 375 (67.7)	BMI 25以上 287 (51.8)	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 366 (66.1)
※コントロール良 2279 (80)	1249 (54.8)	812 (35.6)	1422 (62.4)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	878	67	70	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　美濃加茂市（総数）

（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：47507 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		12690 人 (26.7)		742 人 (5.8)		－ (－)		－ (－)	
20代以下	16617	507	3.1	19	3.7	<10	－	<10	－
30代	6589	658	10	39	5.9	<10	－	<10	－
40代	8228	1582	19.2	100	6.3	32	2	<10	－
50代	6728	2663	39.6	173	6.5	51	1.9	20	0.75
60代	6005	4111	68.5	227	5.5	88	2.1	40	0.97
70～74歳	3340	3169	94.9	184	5.8	62	2	47	1.48
再掲 40～74歳(Y)	24301	再掲 40～74歳(g) 11525	47.4	684	5.9	233	2	－	－

経症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：7446 人（64.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：12010人 (49.4)

※糖尿病型(f) (f/e)：2631人 (21.9)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：2484 人 (94) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：147 人 (6) (j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 493 (20)	130/80以上 321 (65.1)	BMI 25以上 270 (54.8)	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 335 (68)
※コントロール良 1991 (80)	1180 (59.3)	720 (36.2)	1267 (63.6)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	859	70	78	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　可児市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：85276 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		12555 人 (14.7)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	27309	452	1.7	<10	–	<10	–	<10	–
30代	10989	652	5.9	28	4.3	<10	–	0	–
40代	14599	1515	10.4	69	4.6	<10	–	<10	–
50代	12168	2309	19	98	4.2	16	0.7	14	0.61
60代	12214	4037	33.1	151	3.7	34	0.8	35	0.87
70～74歳	7997	3590	44.9	114	3.2	22	0.6	43	1.2
再掲 40～74歳(Y)	46978	再掲 40～74歳(g) 11451	24.4	432	3.8	–	–	–	–

gのうち特定健診未受診者(h)：8546 人（74.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：22568人 (48)

※糖尿病型(f)(f/e)：4181人 (18.5)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：3538 人 (85) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：643 人 (15) (j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 961 (27)	130/80以上 640 (66.6)	BMI 25以上 516 (53.7)	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 659 (68.6)
※コントロール良 2577 (73)	1489 (57.8)	1004 (39)	1633 (63.4)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	2062	179	139	18

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　坂祝町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：6940 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		– (–)		<20 (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	2219	<20	–	0	–	0	–	0	–
30代	925	<20	–	0	–	0	–	0	–
40代	1079	20	1.9	0	–	0	–	0	–
50代	970	60	6.2	<20	–	0	–	0	–
60代	1129	137	12.1	<20	–	0	–	0	–
70～74歳	618	125	20.2	<20	–	0	–	0	–
再掲 40～74歳(Y)	3796	再掲 40～74歳(g) 342	9	<20	–	–	–	–	–

gのうち特定健診未受診者(h)：190 人（55.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：1915人 (50.4)

※糖尿病型(f)(f/e)：442人 (23.1)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：416 人 (94) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：26 人 (6) (j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 90 (22)	130/80以上 63 (70)	BMI 25以上 53 (58.9)	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 61 (67.8)
※コントロール良 326 (78)	182 (55.8)	126 (38.7)	187 (57.4)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	229	<20	23	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　富加町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：4678 人

年代別	人数(T)
20代以下	1444
30代	634
40代	726
50代	625
60代	771
70～74歳	478
再掲 40～74歳(Y)	2600

経症 → 重症

年代別	糖尿病治療中 278 人 (5.9) 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 <20 (−) 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 − (−) 患者数(c)	c/a	人工透析 − (−) 患者数(d)	d/a
20代以下	<20	−	0	−	0	−	0	−
30代	<20	−	0	−	0	−	0	−
40代	<20	−	0	−	0	−	0	−
50代	48	7.7	<20	−	0	−	0	−
60代	104	13.5	<20	−	0	−	0	−
70～74歳	99	20.7	0	−	0	−	0	−
再掲 40～74歳(g)	−	−	<20	−	−	−	−	−

gのうち特定健診未受診者(h)：− (−)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：1244人 (47.8)

※糖尿病型(f)(f/e)：406～424 (−)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：405 人 (97) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：<20 (−)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 67 (17)	44 (65.7)	38 (56.7)	44 (65.7)
※コントロール良 338 (83)	216 (63.9)	133 (39.3)	209 (61.8)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(−)	(±)	(±)以上	問わない
	206	31	<20	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　川辺町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：8185 人

年代別	人数(T)
20代以下	2547
30代	992
40代	1239
50代	1283
60代	1358
70～74歳	766
再掲 40～74歳(Y)	4646

経症 → 重症

年代別	糖尿病治療中 619 人 (7.6) 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 <20 (−) 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 <20 (−) 患者数(c)	c/a	人工透析 − (−) 患者数(d)	d/a
20代以下	28	1.1	0	−	0	−	0	−
30代	33	3.3	0	−	0	−	0	−
40代	76	6.1	<20	−	0	−	0	−
50代	111	8.7	<20	−	<20	−	0	−
60代	174	12.8	<20	−	<20	−	0	−
70～74歳	197	25.7	<20	−	<20	−	0	−
再掲 40～74歳(g)	558	12	<20	−	<20	−	−	−

gのうち特定健診未受診者(h)：338 人 (60.6) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：2474人 (53.3)

※糖尿病型(f)(f/e)：578人 (23.4)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：551 人 (95) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：27 人 (5) (j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 105 (19)	73 (69.5)	48 (45.7)	71 (67.6)
※コントロール良 446 (81)	256 (57.4)	146 (32.7)	262 (58.7)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(−)	(±)	(±)以上	問わない
	329	20	33	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　七宗町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：2533 人

年代別	人数(T)
20代以下	605
30代	207
40代	313
50代	426
60代	630
70～74歳	352
再掲 40～74歳(Y)	1721

経症 → 重症

年代別	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
	－（－）		<20（－）		<20（－）		－（－）	
20代以下	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	<20	－	0	－	0	－	0	－
40代	<20	－	0	－	0	－	0	－
50代	27	6.3	0	－	0	－	0	－
60代	74	11.7	<20	－	<20	－	0	－
70～74歳	99	28.1	<20	－	0	－	0	－
再掲 40～74歳(g)	－	－	<20	－	<20	－	－	－

gのうち特定健診未受診者(h)：－（－）

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：896人（52.1）

※糖尿病型(f)(f/e)：214～232（－）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：213 人（94）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：<20（－）

		その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良	44（21）	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
	25～43（－）	24（54.5）	25～43（－）	
※コントロール良	169（79）			
	113（66.9）	52（30.8）	109（64.5）	

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	168	<20	<20	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　八百津町（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：7975 人

年代別	人数(T)
20代以下	2084
30代	788
40代	1149
50代	1287
60代	1703
70～74歳	964
再掲 40～74歳(Y)	5103

経症 → 重症

年代別	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
	815 人（10.2）		<20（－）		<20（－）		－（－）	
20代以下	21	1	0	－	0	－	0	－
30代	22	2.8	0	－	0	－	0	－
40代	65	5.7	0	－	0	－	0	－
50代	126	9.8	<20	－	0	－	0	－
60代	313	18.4	<20	－	<20	－	0	－
70～74歳	268	27.8	<20	－	0	－	0	－
再掲 40～74歳(g)	772	15.1	<20	－	<20	－	－	－

gのうち特定健診未受診者(h)：412 人（53.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：2597人（50.9）

※糖尿病型(f)(f/e)：773人（29.8）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：747 人（97）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：26 人（3）(j/f)

		その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良	131（18）	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
	85（64.9）	85（64.9）	59（45）	85（64.9）
※コントロール良	616（82）			
	343（55.7）	184（29.9）	372（60.4）	

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	510	<20	43	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　白川町（総数）　（糖尿病）



※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　東白川村（総数）　（糖尿病）



※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　御嵩町（総数）

（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：14690 人

年代別	人数(T)
20代以下	4362
30代	1841
40代	2276
50代	2120
60代	2653
70～74歳	1438
再掲 40～74歳(Y)	8487

軽症 → 重症

糖尿病治療中		
– (–)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	–
30代	24	1.3
40代	44	1.9
50代	112	5.3
60代	288	10.9
70～74歳	260	18.1
再掲 40～74歳(g)	704	8.3

インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
<20 (–)		– (–)		– (–)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	–	0	–	0	–
0	–	0	–	0	–
0	–	0	–	0	–
<20	–	0	–	0	–
<20	–	0	–	0	–
<20	–	0	–	0	–
<20	–	–	–	–	–

gのうち特定健診未受診者(h)：566 人（80.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：4635人 (54.6)

※糖尿病型(f)(f/e)：792人 (17.1)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：673 人 (85) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：119 人 (15) (j/f)

	その他のリスク		
	高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 209 (31)	132 (63.2)	117 (56)	146 (69.9)
※コントロール良 464 (69)	264 (56.9)	186 (40.1)	290 (62.5)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	390	45	53	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　多治見市（総数）

（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：89260 人

年代別	人数(T)
20代以下	26138
30代	10425
40代	14406
50代	14769
60代	14577
70～74歳	8945
再掲 40～74歳(Y)	52697

軽症 → 重症

糖尿病治療中		
19864 人 (22.3)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	811	3.1
30代	1028	9.9
40代	2117	14.7
50代	3929	26.6
60代	6536	44.8
70～74歳	5443	60.8
再掲 40～74歳(g)	18025	34.2

インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
953 人 (4.8)		846 人 (4.3)		– (–)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
99	12.2	31	3.8	0	–
47	4.6	43	4.2	<10	–
95	4.5	108	5.1	10	0.47
154	3.9	175	4.5	42	1.07
284	4.3	267	4.1	62	0.95
274	5	222	4.1	83	1.52
807	4.5	772	4.3	197	1.09

gのうち特定健診未受診者(h)：13398 人（74.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：26346人 (50)

※糖尿病型(f)(f/e)：5010人 (19)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：4483 人 (89) (i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：527 人 (11) (j/f)

	その他のリスク		
	高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 1060 (24)	717 (67.6)	535 (50.5)	668 (63)
※コントロール良 3423 (76)	2017 (58.9)	1297 (37.9)	2110 (61.6)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	2060	241	141	14

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　瑞浪市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：30683 人

年代別	人数(T)
20代以下	9592
30代	3808
40代	4767
50代	4800
60代	4869
70～74歳	2847
再掲 40～74歳(Y)	17283

糖尿病治療中（経症）：6413 人（20.9）

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	248	2.6
30代	300	7.9
40代	673	14.1
50代	1297	27
60代	2142	44
70～74歳	1753	61.6
再掲 40～74歳(g)	5865	33.9

	インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
	－（－）		－（－）		－（－）	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	<10	－	<10	－	<10	－
30代	<10	－	0	－	<10	－
40代	21	3.1	<10	－	<10	－
50代	38	2.9	<10	－	16	1.23
60代	76	3.5	11	0.5	29	1.35
70～74歳	78	4.4	10	0.6	33	1.88
再掲 40～74歳(g)	213	3.6	35	0.6	－	－

gのうち特定健診未受診者(h)：3861 人（65.8）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：8745人（50.6）

※糖尿病型(f)(f/e)：1961人（22.4）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1789 人（91）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：172 人（9）(j/f)

	その他のリスク		
	高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 373（21）	263（70.5）	199（53.4）	252（67.6）
※コントロール良 1416（79）	875（61.8）	475（33.5）	919（64.9）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（＋）以上	問わない
	818	101	56	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　土岐市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：45636 人

年代別	人数(T)
20代以下	13534
30代	5537
40代	7432
50代	7418
60代	7295
70～74歳	4420
再掲 40～74歳(Y)	26565

糖尿病治療中（経症）：7857 人（17.2）

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	277	2
30代	392	7.1
40代	828	11.1
50代	1560	21
60代	2623	36
70～74歳	2177	49.3
再掲 40～74歳(g)	7188	27.1

	インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
	－（－）		－（－）		－（－）	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	<10	－	<10	－	0	－
30代	12	3.1	<10	－	0	－
40代	29	3.5	<10	－	<10	－
50代	51	3.3	18	1.2	19	1.22
60代	82	3.1	41	1.6	29	1.11
70～74歳	60	2.8	31	1.4	13	0.6
再掲 40～74歳(g)	222	3.1	－	－	－	－

gのうち特定健診未受診者(h)：5319 人（74）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：14001人（52.7）

※糖尿病型(f)(f/e)：2865人（20.5）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：2533 人（88）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：332 人（12）(j/f)

	その他のリスク		
	高血圧	肥満	脂質
	130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 581（23）	423（72.8）	333（57.3）	402（69.2）
※コントロール良 1952（77）	1279（65.5）	702（36）	1195（61.2）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（＋）以上	問わない
	1133	153	101	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　中津川市(総数)　(糖尿病)

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計		糖尿病治療中			インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
62231 人		11184 人 (18)			ー (−)		ー (−)		ー (−)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	18960	20代以下	428	2.3	<10	−	<10	−	0	−
30代	7568	30代	555	7.3	16	2.9	<10	−	<10	−
40代	9975	40代	1121	11.2	35	3.1	<10	−	<10	−
50代	9464	50代	2097	22.2	91	4.3	40	1.9	25	1.19
60代	10330	60代	3822	37	148	3.9	85	2.2	56	1.47
70～74歳	5934	70～74歳	3161	53.3	134	4.2	79	2.5	46	1.46
再掲 40～74歳(Y)	35703	再掲 40～74歳(g)	10201	28.6	408	4	−	−	−	−

gのうち特定健診未受診者(h)
5720 人 (56.1)(h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：19333人 (54.1)

※糖尿病型(f) (f/e)：4928人 (25.5)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
　(質問票 または レセプト)

治療中(i)（質問票:服薬有 または レセプト有）：4684 人 (95) (i/f)

未治療(j)（質問票:服薬無 かつ レセプト無）：244 人 (5) (j/f)

	その他のリスク 高血圧 130/80以上	肥満 BMI 25以上	脂質 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 911 (19)	646 (70.9)	439 (48.2)	605 (66.4)
※コントロール良 3773 (81)	2384 (63.2)	1253 (33.2)	2322 (61.5)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類		第1期	第2期	第3期	第4期
		腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR		30以上			30未満
尿蛋白	アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
	尿蛋白	(−)	(±)	(±)以上	問わない
		1317	164	112	10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　恵那市(総数)　(糖尿病)

軽症 → 重症

レセプト

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計		糖尿病治療中			インスリン療法		糖尿病性腎症		人工透析	
38397 人		5811 人 (15.1)			ー (−)		ー (−)		ー (−)	
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	11092	20代以下	125	1.1	<10	−	<10	−	0	−
30代	4223	30代	187	4.4	11	5.9	<10	−	0	−
40代	6119	40代	504	8.2	20	4	18	3.6	0	−
50代	5978	50代	1126	18.8	46	4.1	36	3.2	<10	−
60代	6924	60代	2197	31.7	80	3.6	98	4.5	<10	−
70～74歳	4061	70～74歳	1672	41.2	80	4.8	75	4.5	<10	−
再掲 40～74歳(Y)	23082	再掲 40～74歳(g)	5499	23.8	226	4.1	227	4.1	−	−

gのうち特定健診未受診者(h)
3021 人 (54.9)(h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)：12118人 (52.5)

※糖尿病型(f) (f/e)：3237人 (26.7)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
　(質問票 または レセプト)

治療中(i)（質問票:服薬有 または レセプト有）：3029 人 (94) (i/f)

未治療(j)（質問票:服薬無 かつ レセプト無）：208 人 (6) (j/f)

	その他のリスク 高血圧 130/80以上	肥満 BMI 25以上	脂質 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
※コントロール不良 545 (18)	416 (76.3)	276 (50.6)	358 (65.7)
※コントロール良 2484 (82)	1560 (62.8)	829 (33.4)	1507 (60.7)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類		第1期	第2期	第3期	第4期
		腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
eGFR		30以上			30未満
尿蛋白	アルブミン尿	正常アルブミン尿(30未満)	微量アルブミン尿(30～299)	顕性アルブミン尿(300以上)	問わない
	尿蛋白	(−)	(±)	(±)以上	問わない
		1008	116	69	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
　なお、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第2版)」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　高山市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：69013 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 年代別	患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
			12514 人 (18.1)		674 人 (5.4)		－ (－)		－ (－)	
20代以下	20106	20代以下	513	2.6	32	6.2	0	－	0	－
30代	8114	30代	563	6.9	21	3.7	<10	－	0	－
40代	11693	40代	1357	11.6	57	4.2	21	1.5	<10	－
50代	10818	50代	2541	23.5	146	5.7	51	2	13	0.51
60代	11150	60代	4074	36.5	214	5.3	100	2.5	29	0.71
70～74歳	7132	70～74歳	3466	48.6	204	5.9	76	2.2	29	0.84
再掲 40～74歳(Y)	40793	再掲 40～74歳(g)	11438	28	621	5.4	248	2.2	－	－

軽症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：5958 人（52.1）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：23081人（56.6）

※糖尿病型(f)(f/e)：5417人（23.5）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：5116 人（94）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：301 人（6）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 881（17）	130/80以上 536（60.8）	BMI 25以上 419（47.6）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 549（62.3）
※コントロール良 4235（83）	2137（50.5）	1315（31.1）	2414（57）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	1961	167	104	11

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　飛騨市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：17257 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 年代別	患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
			2277 人 (13.2)		－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
20代以下	4379	20代以下	49	1.1	<20	－	<20	－	0	－
30代	1821	30代	49	2.7	0	－	0	－	0	－
40代	2816	40代	158	5.6	<20	－	<20	－	0	－
50代	2920	50代	359	12.3	<20	－	<20	－	<20	－
60代	3220	60代	865	26.9	40	4.6	<20	－	<20	－
70～74歳	2101	70～74歳	797	37.9	29	3.6	<20	－	<20	－
再掲 40～74歳(Y)	11057	再掲 40～74歳(g)	2179	19.7	83	3.8	48	2.2	<20	－

軽症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：903 人（41.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：7085人（64.1）

※糖尿病型(f)(f/e)：1813人（25.6）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：1729 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：84 人（5）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 361（21）	130/80以上 236（65.4）	BMI 25以上 188（52.1）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 241（66.8）
※コントロール良 1368（79）	828（60.5）	454（33.2）	836（61.1）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	（－）	（±）	（±）以上	問わない
	463	48	45	<20

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　下呂市（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：23127 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		3846 人 (16.6)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	5984	91	1.5	<10	–	<10	–	0	–
30代	2344	90	3.8	<10	–	13	14.4	0	–
40代	3543	274	7.7	12	4.4	34	12.4	<10	–
50代	3925	732	18.6	28	3.8	84	11.5	<10	–
60代	4554	1432	31.4	79	5.5	156	10.9	14	0.98
70～74歳	2777	1227	44.2	56	4.6	145	11.8	12	0.98
再掲 40～74歳(Y)	14799	再掲 40～74歳(g) 3665	24.8	175	4.8	419	11.4	33	0.9

軽症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：1740 人（47.5）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：8711人（58.9）

※糖尿病型(f)(f/e)：2393人（27.5）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：2281 人（95）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：112 人（5）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 411（18）	130/80以上 269（65.5）	BMI 25以上 188（45.7）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 238（57.9）
※コントロール良 1870（82）	1045（55.9）	507（27.1）	1069（57.2）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	734	144	47	<10

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　白川村（総数）　（糖尿病）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：1247 人

年代別	人数(T)	糖尿病治療中 患者数(a)	割合(a/T)	インスリン療法 患者数(b)	b/a	糖尿病性腎症 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		– (–)		<20 (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	387	0	–	0	–	0	–	0	–
30代	152	0	–	0	–	0	–	0	–
40代	198	<20	–	0	–	0	–	0	–
50代	177	<20	–	0	–	0	–	0	–
60代	205	<20	–	<20	–	0	–	0	–
70～74歳	128	<20	–	<20	–	0	–	0	–
再掲 40～74歳(Y)	708	再掲 40～74歳(g) 30	4.2	<20	–	–	–	–	–

軽症 → 重症

gのうち特定健診未受診者(h)：16 人（53.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：468人（66.1）

※糖尿病型(f)(f/e)：85人（18.2）

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中（質問票 または レセプト）

治療中(i)（質問票：服薬有 または レセプト有）：63 人（74）(i/f)

未治療(j)（質問票：服薬無 かつ レセプト無）：22 人（26）(j/f)

	その他のリスク 高血圧	肥満	脂質
※コントロール不良 25（40）	130/80以上 <20（–）	BMI 25以上 <20（–）	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 <20（–）
※コントロール良 38（60）	19～37（–）	<20（–）	19～37（–）

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

	第1期 腎症前期	第2期 早期腎症期	第3期 顕性腎症期	第4期 腎不全期
eGFR	30以上			30未満
尿蛋白 アルブミン尿	正常アルブミン尿（30未満）	微量アルブミン尿（30～299）	顕性アルブミン尿（300以上）	問わない
尿蛋白	(－)	(±)	(＋)以上	問わない
	42	0	0	0

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

3　脂質異常症

※令和2年度　岐阜市（総数）　（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
318007 人	
年代別	人数(T)
20代以下	99441
30代	37806
40代	53593
50代	51861
60代	46582
70～74歳	28724
再掲 40～74歳(Y)	180760

脂質異常症治療中		
55816 人 (17.6)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	2741	2.8
30代	2887	7.6
40代	6550	12.2
50代	12256	23.6
60代	17543	37.7
70～74歳	13839	48.2
再掲 40～74歳(g)	50188	27.8

脳血管疾患	
3537 人 (6.3)	
患者数(b)	b/a
32	1.2
49	1.7
217	3.3
590	4.8
1180	6.7
1469	10.6
3456	6.9

虚血性心疾患	
11399 人 (20.4)	
患者数(c)	c/a
92	3.4
202	7
801	12.2
2055	16.8
4112	23.4
4137	29.9
11105	22.1

人工透析	
－ (－)	
患者数(d)	d/a
<10	－
<10	－
25	0.38
80	0.65
168	0.96
132	0.95
405	0.81

gのうち特定健診未受診の者(h)
28377 人（56.5）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	脂質異常(LDL-C) 180以上(f') (f'/e)
96064人 (53.1)	13428人 (14)	5045人 (5.3)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）：24017 人（25）(i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)
3131 人	1369 人
23 (j/f)	27 (k/f)
10297 人	3676 人
77 (l/f)	73 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
1084人 (34.6)	382人 (12.2)	934人 (29.8)
3454人 (33.5)	623人 (6.1)	2662人 (25.9)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	8374 (8.7)	41678 (43.4)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	267 (8.5)	1175 (37.5)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	58 (1.9)	403 (12.9)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	894 (8.7)	5012 (48.7)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	118 (1.1)	1509 (14.7)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　羽島市（総数）　（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
56057 人	
年代別	人数(T)
20代以下	17691
30代	6734
40代	9948
50代	8765
60代	7986
70～74歳	4933
再掲 40～74歳(Y)	31632

脂質異常症治療中		
8652 人 (15.4)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	291	1.6
30代	394	5.9
40代	1048	10.5
50代	1838	21
60代	2838	35.5
70～74歳	2243	45.5
再掲 40～74歳(g)	7967	25.2

脳血管疾患	
－ (－)	
患者数(b)	b/a
<10	－
15	3.8
31	3
64	3.5
177	6.2
201	9
473	5.9

虚血性心疾患	
1476 人 (17.1)	
患者数(c)	c/a
17	5.8
48	12.2
133	12.7
226	12.3
507	17.9
545	24.3
1411	17.7

人工透析	
－ (－)	
患者数(d)	d/a
0	－
<10	－
0	－
<10	－
<10	－
<10	－
－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
4420 人（55.5）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	脂質異常(LDL-C) 180以上(f') (f'/e)
14941人 (47.2)	2047人 (13.7)	784人 (5.2)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）：4283 人（28.7）(i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)
481 人	184 人
23 (j/f)	23 (k/f)
1566 人	600 人
77 (l/f)	77 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
186人 (38.7)	67人 (13.9)	163人 (33.9)
573人 (36.6)	91人 (5.8)	433人 (27.7)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	1044 (7)	8653 (57.9)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	42 (8.7)	270 (56.1)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	13 (2.7)	90 (18.7)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	134 (8.6)	972 (62.1)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	13 (0.8)	263 (16.8)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　各務原市（総数）

（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	122017 人
年代別	人数(T)
20代以下	39341
30代	15485
40代	21405
50代	18310
60代	16283
70～74歳	11193
再掲 40～74歳(Y)	67191

脂質異常症治療中	12810 人 (10.5)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	589	1.5
30代	702	4.5
40代	1566	7.3
50代	2617	14.3
60代	3814	23.4
70～74歳	3522	31.5
再掲 40～74歳(g)	11519	17.1

脳血管疾患	– (–)	
患者数(b)	b/a	
<10	–	
20	2.8	
65	4.2	
130	5	
273	7.2	
341	9.7	
809	7	

虚血性心疾患	2016 人 (15.7)	
患者数(c)	c/a	
18	3.1	
48	6.8	
129	8.2	
337	12.9	
652	17.1	
832	23.6	
1950	16.9	

人工透析	– (–)	
患者数(d)	d/a	
0	–	
<10	–	
<10	–	
<10	–	
13	0.34	
11	0.31	
35	0.3	

gのうち特定健診未受診の者(h)：6252 人（54.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f)(f/e)	180以上(f')(f'/e)
33661人 (50.1)	4845人 (14.4)	1797人 (5.3)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 8045 人 (23.9) (j/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
1008 人	425 人
21 (j/f)	24 (k/f)
3837 人	1372 人
79 (l/f)	76 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
343人 (34)	106人 (10.5)	318人 (31.5)	
1357人 (35.4)	219人 (5.7)	1009人 (26.3)	

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m)(m/a)	2866 (8.5)	14276 (42.4)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	96 (9.5)	383 (38)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (–)	140 (13.9)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	353 (9.2)	1808 (47.1)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	34 (0.9)	600 (15.6)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　山県市（総数）

（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	20688 人
年代別	人数(T)
20代以下	5773
30代	2062
40代	3163
50代	3264
60代	4076
70～74歳	2350
再掲 40～74歳(Y)	12853

脂質異常症治療中	2383 人 (11.5)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	52	0.9
30代	64	3.1
40代	237	7.5
50代	426	13.1
60代	875	21.5
70～74歳	729	31
再掲 40～74歳(g)	2267	17.6

脳血管疾患	– (–)	
患者数(b)	b/a	
<10	–	
<10	–	
<10	–	
18	4.2	
63	7.2	
94	12.9	
–	–	

虚血性心疾患	– (–)	
患者数(c)	c/a	
0	–	
<10	–	
18	7.6	
33	7.7	
127	14.5	
151	20.7	
329	14.5	

人工透析	<10 (–)	
患者数(d)	d/a	
0	–	
0	–	
0	–	
0	–	
<10	–	
<10	–	
<10	–	

gのうち特定健診未受診の者(h)：1257 人（55.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f)(f/e)	180以上(f')(f'/e)
5989人 (46.6)	798人 (13.3)	281人 (4.7)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 1671 人 (27.9) (j/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
156 人	66 人
20 (j/f)	23 (k/f)
642 人	215 人
80 (l/f)	77 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
62人 (39.7)	26人 (16.7)	50人 (32.1)	
195人 (30.4)	42人 (6.5)	173人 (26.9)	

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m)(m/a)	559 (9.3)	2974 (49.7)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	20 (12.8)	81 (51.9)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (–)	38 (24.4)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	69 (10.7)	363 (56.5)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (–)	120 (18.7)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　瑞穂市（総数）　（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	49401 人
年代別	人数(T)
20代以下	18124
30代	7085
40代	8721
50代	6663
60代	5549
70～74歳	3259
再掲 40～74歳(Y)	24192

脂質異常症治療中	4048 人 (8.2)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	128	0.7
30代	181	2.6
40代	528	6.1
50代	837	12.6
60代	1360	24.5
70～74歳	1014	31.1
再掲 40～74歳(g)	3739	15.5

脳血管疾患	– (–)	
患者数(b)	b/a
<10	–
<10	–
<10	–
23	2.7
106	12.7
70	5.1
281	20.7
64	6.3
296	29.2
–	–
721	19.3

虚血性心疾患	– (–)	
患者数(c)	c/a
<10	–
14	7.7
38	7.2
<10	–
<10	–
10	0.74
11	1.08
29	0.78

人工透析	– (–)	
患者数(d)	d/a
0	–
<10	–
<10	–
<10	–
<10	–
10	0.74
11	1.08
29	0.78

gのうち特定健診未受診の者(h)：1734 人（46.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)	12623人 (52.2)

脂質異常(LDL-C)	160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
	1700人 (13.5)	620人 (4.9)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）	2966 人 (23.5) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
351 人	157 人
21 (j/f)	25 (k/f)
1349 人	463 人
79 (l/f)	75 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
	120人 (34.2)	40人 (11.4)	86人 (24.5)
	456人 (33.8)	79人 (5.9)	318人 (23.6)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	1069 (8.5)	5502 (43.6)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	26 (7.4)	137 (39)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (–)	49 (14)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	129 (9.6)	673 (49.9)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	15 (1.1)	193 (14.3)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　本巣市（総数）　（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	27780 人
年代別	人数(T)
20代以下	8978
30代	3066
40代	4734
50代	3963
60代	4302
70～74歳	2737
再掲 40～74歳(Y)	15736

脂質異常症治療中	2115 人 (7.6)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	34	0.4
30代	53	1.7
40代	176	3.7
50代	444	11.2
60代	764	17.8
70～74歳	644	23.5
再掲 40～74歳(g)	2028	12.9

脳血管疾患	– (–)	
患者数(b)	b/a
0	–
0	–
<10	–
<10	–
42	5.5
45	7
99	4.9
–	–

虚血性心疾患	– (–)	
患者数(c)	c/a
<10	–
<10	–
<10	–
43	9.7
75	9.8
94	14.6
–	–

人工透析	– (–)	
患者数(d)	d/a
0	–
0	–
0	–
0	–
0	–
0	–
0	–
–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)：1003 人（49.5）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)	8197人 (52.1)

脂質異常(LDL-C)	160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
	922人 (11.2)	309人 (3.8)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）	1993 人 (24.3) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
196 人	83 人
21 (j/f)	27 (k/f)
726 人	226 人
79 (l/f)	73 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
	82人 (41.8)	21人 (10.7)	51人 (26)
	280人 (38.6)	40人 (5.5)	192人 (26.4)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	530 (6.5)	3587 (43.8)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	11 (5.6)	90 (45.9)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (–)	32 (16.3)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	56 (7.7)	400 (55.1)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (–)	93 (12.8)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　岐南町（総数）　（脂質異常症）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
22557 人	
年代別	人数(T)
20代以下	8030
30代	3464
40代	3933
50代	3092
60代	2497
70～74歳	1541
再掲 40～74歳(Y)	11063

脂質異常症治療中		
3168 人 (14)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	100	1.2
30代	241	7
40代	549	14
50代	815	26.4
60代	887	35.5
70～74歳	576	37.4
再掲 40～74歳(g)	2827	25.6

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		<10 (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<10	－	<10	－	0	－
<10	－	14	5.8	0	－
14	2.6	81	14.8	0	－
33	4	152	18.7	<10	－
45	5.1	193	21.8	0	－
53	9.2	144	25	0	－
145	5.1	570	20.2	<10	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：1450 人（51.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	脂質異常(LDL-C) 180以上(f') (f'/e)
5418人 (49)	807人 (14.9)	321人 (5.9)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 1303 人（24）(i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
175 人	75 人
22 (j/f)	23 (k/f)
632 人	246 人
78 (l/f)	77 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
69人 (39.4)	24人 (13.7)	58人 (33.1)
217人 (34.3)	28人 (4.4)	138人 (21.8)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	420 (7.8)	2880 (53.2)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	11 (6.3)	90 (51.4)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	31 (17.7)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	47 (7.4)	359 (56.8)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (－)	115 (18.2)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　笠松町（総数）　（脂質異常症）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
18530 人	
年代別	人数(T)
20代以下	6036
30代	2391
40代	3313
50代	2887
60代	2368
70～74歳	1535
再掲 40～74歳(Y)	10103

脂質異常症治療中		
4902 人 (26.5)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	65	1.1
30代	135	5.6
40代	493	14.9
50代	1141	39.5
60代	1625	68.6
70～74歳	1443	94
再掲 40～74歳(g)	4702	46.5

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
27	5.5	60	12.2	<20	－
96	8.4	191	16.7	23	2.02
158	9.7	372	22.9	30	1.85
210	14.6	433	30	20	1.39
491	10.4	1056	22.5	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：3004 人（63.9）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	脂質異常(LDL-C) 180以上(f') (f'/e)
5044人 (49.9)	702人 (13.9)	252人 (5)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 1326 人（26.3）(i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
172 人	75 人
25 (j/f)	30 (k/f)
530 人	177 人
75 (l/f)	70 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
60人 (34.9)	20人 (11.6)	53人 (30.8)
192人 (36.2)	28人 (5.3)	135人 (25.5)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	342 (6.8)	2705 (53.6)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	96 (55.8)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<20 (－)	23 (13.4)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	30 (5.7)	302 (57)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	76 (14.3)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　北方町（総数）　（脂質異常症）

レセプト　軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
15818 人	
年代別	人数(T)
20代以下	5306
30代	2077
40代	2799
50代	2401
60代	2048
70～74歳	1187
再掲 40～74歳(Y)	8435

脂質異常症治療中		
1462 人 (9.2)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	60	1.1
30代	56	2.7
40代	151	5.4
50代	340	14.2
60代	470	22.9
70～74歳	385	32.4
再掲 40～74歳(g)	1346	16

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	57	16.8	0	－
24	5.1	91	19.4	0	－
34	8.8	111	28.8	<20	－
80	5.9	－	－	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
874 人 (64.9) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
3984人 (47.2)	548人 (13.8)	209人 (5.2)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬者 レセプト有） 851 人 (21.4) (j/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
94 人	46 人
17 (j/f)	22 (k/f)
454 人	163 人
83 (l/f)	78 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
37人 (39.4)	<20 (－)	27人 (28.7)
152人 (33.5)	34人 (7.5)	112人 (24.7)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	366 (9.2)	1909 (47.9)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	53 (56.4)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<20 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	39 (8.6)	241 (53.1)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	83 (18.3)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　大垣市（総数）　（脂質異常症）

レセプト　軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
133848 人	
年代別	人数(T)
20代以下	43137
30代	17456
40代	22764
50代	20614
60代	18841
70～74歳	11036
再掲 40～74歳(Y)	73255

脂質異常症治療中		
21641 人 (16.2)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	800	1.9
30代	1028	5.9
40代	2553	11.2
50代	4450	21.6
60代	7016	37.2
70～74歳	5794	52.5
再掲 40～74歳(g)	19813	27

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
1417 人 (6.5)		5655 人 (26.1)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
11	1.4	94	11.8	0	－
24	2.3	144	14	<10	－
91	3.6	434	17	14	0.55
220	4.9	918	20.6	33	0.74
494	7	1970	28.1	55	0.78
577	10	2095	36.2	59	1.02
1382	7	5417	27.3	161	0.81

gのうち特定健診未受診の者(h)
12272 人 (61.9) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
34767人 (47.5)	4969人 (14.3)	1872人 (5.4)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬者 レセプト有） 7528 人 (21.7) (j/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
994 人	430 人
20 (j/f)	23 (k/f)
3975 人	1442 人
80 (l/f)	77 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
360人 (36.2)	108人 (10.9)	289人 (29.1)
1435人 (36.1)	216人 (5.4)	1074人 (27)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	3514 (10.1)	16537 (47.6)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	108 (10.9)	485 (48.8)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	20 (2)	192 (19.3)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	433 (10.9)	2052 (51.6)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	52 (1.3)	692 (17.4)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　海津市（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
27349 人	
年代別	人数(T)
20代以下	7367
30代	2928
40代	4298
50代	4382
60代	5367
70～74歳	3007
再掲 40～74歳(Y)	17054

脂質異常症治療中		
2717 人 (9.9)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	34	0.5
30代	75	2.6
40代	265	6.2
50代	520	11.9
60代	1053	19.6
70～74歳	770	25.6
再掲 40～74歳(g)	2608	15.3

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		<10 (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	<10	－	0	－
<10	－	10	13.3	0	－
<10	－	28	10.6	0	－
16	3.1	89	17.1	0	－
62	5.9	205	19.5	0	－
56	7.3	165	21.4	<10	－
－	－	487	18.7	<10	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
1517 人（58.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)
7947人 (46.6)

脂質異常(LDL-C)	
160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
1100人 (13.8)	391人 (4.9)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）	
2088 人 (26.3) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
197 人	83 人
18 (j/f)	21 (k/f)
903 人	308 人
82 (l/f)	79 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
84人 (42.6)	25人 (12.7)	64人 (32.5)
320人 (35.4)	64人 (7.1)	260人 (28.8)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	517 (6.5)	3997 (50.2)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	13 (6.6)	93 (47.2)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (－)	36 (18.3)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	73 (8.1)	482 (53.4)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (－)	154 (17.1)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　養老町（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
22484 人	
年代別	人数(T)
20代以下	6244
30代	2361
40代	3599
50代	3486
60代	4345
70～74歳	2449
再掲 40～74歳(Y)	13879

脂質異常症治療中		
2510 人 (11.2)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	45	0.7
30代	76	3.2
40代	233	6.5
50代	468	13.4
60代	965	22.2
70～74歳	723	29.5
再掲 40～74歳(g)	2389	17.2

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<10	－	<10	－	0	－
<10	－	<10	－	0	－
<10	－	22	9.4	<10	－
31	6.6	63	13.5	<10	－
111	11.5	196	20.3	<10	－
87	12	187	25.9	<10	－
－	－	468	19.6	15	0.63

gのうち特定健診未受診の者(h)
1294 人（54.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)
6754人 (48.7)

脂質異常(LDL-C)	
160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
880人 (13)	358人 (5.3)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）	
1739 人 (25.7) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
197 人	83 人
22 (j/f)	23 (k/f)
683 人	275 人
78 (l/f)	77 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
75人 (38.1)	27人 (13.7)	68人 (34.5)
253人 (37)	40人 (5.9)	191人 (28)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	602 (8.9)	3111 (46.1)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<10 (－)	84 (42.6)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (－)	37 (18.8)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	65 (9.5)	357 (52.3)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (－)	117 (17.1)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　垂井町（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 22194 人

指質異常症治療中: 1965 人 (8.9)

脳血管疾患: － (－)　虚血性心疾患: － (－)　人工透析: － (－)

年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	6775	20代以下	17	0.3	<10	－	<10	－	0	－
30代	2611	30代	39	1.5	0	－	<10	－	0	－
40代	3736	40代	193	5.2	<10	－	25	13	0	－
50代	3296	50代	373	11.3	16	4.3	67	18	<10	－
60代	3534	60代	736	20.8	36	4.9	151	20.5	<10	－
70～74歳	2242	70～74歳	607	27.1	51	8.4	193	31.8	<10	－
再掲 40～74歳(Y)	12808	再掲 40～74歳(g)	1909	14.9	－	－	436	22.8	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h): 1431 人 (75) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
5831人 (45.5)	825人 (14.1)	303人 (5.2)

指質異常症治療中(i)（質問票_服薬有　レセプト有）: 1096 人 (18.8) (i/e)

合計(j)	LDL160以上	180以上(k)
治療中	114 人	51 人
	14 (j/f)	17 (k/f)
未治療(l, m)	711 人	252 人
	86 (l/f)	83 (m/f)

その他のリスク	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
治療中	52人 (45.6)	12人 (10.5)	34人 (29.8)
未治療	265人 (37.3)	41人 (5.8)	216人 (30.4)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	954 (16.4)	3463 (59.4)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	24 (21.1)	73 (64)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (－)	28 (24.6)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	132 (18.6)	437 (61.5)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	12 (1.7)	168 (23.6)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　関ケ原町（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 5198 人

指質異常症治療中: － (－)

脳血管疾患: － (－)　虚血性心疾患: － (－)　人工透析: － (－)

年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	1337	20代以下	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	500	30代	25	5	0	－	<20	－	0	－
40代	744	40代	60	8.1	<20	－	<20	－	0	－
50代	861	50代	150	17.4	<20	－	<20	－	0	－
60代	1061	60代	277	26.1	<20	－	22	7.9	0	－
70～74歳	695	70～74歳	229	32.9	<20	－	42	18.3	0	－
再掲 40～74歳(Y)	3361	再掲 40～74歳(g)	716	21.3	33	4.6	75	10.5	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h): 462 人 (64.5) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
1611人 (47.9)	222人 (13.8)	58～76 (－)

指質異常症治療中(i)（質問票_服薬有　レセプト有）: 406 人 (25.2) (i/e)

合計(j)	LDL160以上	180以上(k)
治療中	49 人	<20
	22 (j/f)	－
未治療(l, m)	173 人	57 人
	78 (l/f)	77 (m/f)

その他のリスク	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
治療中	<20 (－)	<20 (－)	<20 (－)
未治療	59人 (34.1)	<20 (－)	47人 (27.2)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	209 (13)	708 (43.9)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	<20 (－)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<20 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	28 (16.2)	89 (51.4)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	37 (21.4)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　神戸町（総数）

（脂質異常症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：15550 人

年代別	人数(T)	脂質異常症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		1531 人 (9.8)		– (–)		148 人 (9.7)		<20 (–)	
20代以下	4742	54	1.1	<20	–	<20	–	0	–
30代	1737	71	4.1	<20	–	<20	–	0	–
40代	2709	175	6.5	<20	–	<20	–	0	–
50代	2241	279	12.4	<20	–	24	8.6	<20	–
60代	2452	509	20.8	27	5.3	62	12.2	<20	–
70～74歳	1669	443	26.5	33	7.4	44	9.9	<20	–
再掲 40～74歳(Y)	9071	再掲 40～74歳(g) 1406	15.5	72	5.1	–	–	<20	–

gのうち特定健診未受診の者(h)：689 人（49）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：5056人 (55.7)

脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
630人 (12.5)	213人 (4.2)

脂質異常症治療中(i)（質問票 服薬有 レセプト有）：1295 人 (25.6) (i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
147 人	57 人	57人 (38.8)	<20 (–)	40人 (27.2)
23 (j/f)	27 (k/f)			
483 人	156 人	158人 (32.7)	26人 (5.4)	135人 (28)
77 (l/f)	73 (m/f)			
未治療(l, m)				

臓器障害

	糖尿病蓄積有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m)(m/a)	555 (11)	2520 (49.8)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (–)	68 (46.3)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<20 (–)	22 (15)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	63 (13)	243 (50.3)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	25 (5.2)	73 (15.1)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
糖尿検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　輪之内町（総数）

（脂質異常症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：8415 人

年代別	人数(T)	脂質異常症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		– (–)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	2803	<20	–	0	–	0	–	0	–
30代	1117	<20	–	0	–	<20	–	0	–
40代	1467	43	2.9	0	–	<20	–	0	–
50代	1093	104	9.5	<20	–	27	26	0	–
60代	1257	253	20.1	23	9.1	79	31.2	0	–
70～74歳	678	219	32.3	23	10.5	86	39.3	0	–
再掲 40～74歳(Y)	4495	再掲 40～74歳(g) 619	13.8	–	–	–	–	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)：334 人（54）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)：2382人 (53)

脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
311人 (13.1)	122人 (5.1)

脂質異常症治療中(i)（質問票 服薬有 レセプト有）：518 人 (21.7) (i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
66 人	25 人	24人 (36.4)	<20 (–)	<20 (–)
21 (j/f)	20 (k/f)			
245 人	97 人	98人 (40)	<20 (–)	80人 (32.7)
79 (l/f)	80 (m/f)			
未治療(l, m)				

臓器障害

	糖尿病蓄積有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m)(m/a)	151 (6.3)	1281 (53.8)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (–)	31 (47)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (–)	<20 (–)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	<20 (–)	137 (55.9)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	38 (15.5)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
糖尿検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　安八町（総数）

（脂質異常症）

レセプト　軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
12269 人	
年代別	人数(T)
20代以下	3919
30代	1367
40代	2259
50代	1805
60代	1774
70～74歳	1145
再掲 40～74歳(Y)	6983

脂質異常症治療中		
－ (－)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	－
30代	38	2.8
40代	128	5.7
50代	255	14.1
60代	438	24.7
70～74歳	419	36.6
再掲 40～74歳(g)	1240	17.8

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	0	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	<20	－
<20	－	29	11.4	0	－
23	5.3	55	12.6	<20	－
30	7.2	77	18.4	0	－
65	5.2	－	－	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：575 人（46.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
3816人 (54.6)	508人 (13.3)	183人 (4.8)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有（レセプト有）） 994 人（26）(i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
140 人	54 人
28 (j/f)	30 (k/f)
368 人	129 人
72 (l/f)	70 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
55人 (39.3)	21人 (15)	40人 (28.6)
133人 (36.1)	<20 (－)	99人 (26.9)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/e)	211 (5.5)	1804 (47.3)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	78 (55.7)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<20 (－)	24 (17.1)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	30 (8.2)	184 (50)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	56 (15.2)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　揖斐川町（総数）

（脂質異常症）

レセプト　軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
15579 人	
年代別	人数(T)
20代以下	4266
30代	1510
40代	2381
50代	2422
60代	3073
70～74歳	1927
再掲 40～74歳(Y)	9803

脂質異常症治療中		
2393 人 (15.4)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	49	1.1
30代	73	4.8
40代	197	8.3
50代	430	17.8
60代	871	28.3
70～74歳	773	40.1
再掲 40～74歳(g)	2271	23.2

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	<20	－
<20	－	<20	－	0	－
21	4.9	54	12.6	<20	－
49	5.6	189	21.7	<20	－
71	9.2	214	27.7	<20	－
－	－	－	－	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：1228 人（54.1）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
5162人 (52.7)	572人 (11.1)	185人 (3.6)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有（レセプト有）） 1363 人（26.4）(i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
111 人	42 人
19 (j/f)	23 (k/f)
461 人	143 人
81 (l/f)	77 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
44人 (39.6)	<20 (－)	41人 (36.9)
160人 (34.7)	20人 (4.3)	114人 (24.7)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/e)	213 (4.1)	2621 (50.8)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	47 (42.3)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	25 (5.4)	245 (53.1)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	55 (11.9)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　大野町（総数）　（脂質異常症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：18751 人

年代別	人数(T)
20代以下	5918
30代	2015
40代	3136
50代	2959
60代	2931
70～74歳	1792
再掲 40～74歳(Y)	10818

経症 → 重症

脂質異常症治療中			脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
1267 人 (6.8)			－ (－)		215 人 (17)		<20 (－)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	37	0.6	0	－	<20	－	0	－
30代	43	2.1	0	－	<20	－	0	－
40代	117	3.7	<20	－	<20	－	0	－
50代	233	7.9	<20	－	39	16.7	0	－
60代	442	15.1	20	4.5	75	17	<20	－
70～74歳	395	22	27	6.8	75	19	0	－
再掲 40～74歳(g)	1187	11	62	5.2	－	－	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：605 人（51）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：5191人（48）

脂質異常(LDL-C) 160以上(f)(f/e)	180以上(f')(f'/e)
734人 (14.1)	254人 (4.9)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）：1396 人（26.9）(i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)
180 人	71 人
25 (j/f)	28 (k/f)
554 人	183 人
75 (l/f)	72 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満	高血糖	高血圧
	BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
	77人 (42.8)	23人 (12.8)	66人 (36.7)
	191人 (34.5)	27人 (4.9)	154人 (27.8)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m)(m/e)	301 (5.8)	2352 (45.3)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	82 (45.6)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<20 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	41 (7.4)	286 (51.6)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	74 (13.4)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　池田町（総数）　（脂質異常症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：19818 人

年代別	人数(T)
20代以下	6437
30代	2176
40代	3338
50代	3044
60代	2990
70～74歳	1833
再掲 40～74歳(Y)	11205

経症 → 重症

脂質異常症治療中			脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
552 人 (2.8)			－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	21	0.3	<20	－	<20	－	0	－
30代	22	1	<20	－	<20	－	0	－
40代	59	1.8	<20	－	<20	－	0	－
50代	95	3.1	0	－	<20	－	0	－
60代	174	5.8	<20	－	21	12.1	0	－
70～74歳	181	9.9	22	12.2	41	22.7	<20	－
再掲 40～74歳(g)	509	4.5	－	－	83	16.3	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：385 人（75.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：5530人（49.4）

脂質異常(LDL-C) 160以上(f)(f/e)	180以上(f')(f'/e)
676人 (12.2)	237人 (4.3)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）：1017 人（18.4）(i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)
109 人	51 人
16 (j/f)	22 (k/f)
567 人	186 人
84 (l/f)	78 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満	高血糖	高血圧
	BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
	43人 (39.4)	<20 (－)	36人 (33)
	200人 (35.3)	28人 (4.9)	163人 (28.7)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m)(m/e)	397 (7.2)	2908 (52.6)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	70 (64.2)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<20 (－)	26 (23.9)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	52 (9.2)	311 (54.9)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	97 (17.1)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　関市（総数）　（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
71562 人	
年代別	人数(T)
20代以下	22282
30代	8252
40代	11702
50代	10702
60代	11781
70～74歳	6843
再掲 40～74歳(Y)	41028

脂質異常症治療中		
9527 人 (13.3)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	322	1.4
30代	464	5.6
40代	1096	9.4
50代	1888	17.6
60代	3216	27.3
70～74歳	2541	37.1
再掲 40～74歳(g)	8741	21.3

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<10	－	<10	－	0	－
10	2.2	25	5.4	0	－
33	3	82	7.5	<10	－
92	4.9	186	9.9	11	0.58
188	5.8	592	18.4	20	0.62
253	10	587	23.1	13	0.51
566	6.5	1447	16.6	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：4791 人（54.8）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
19207人 (46.8)	2729人 (14.2)	999人 (5.2)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 4920 人 (25.6) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
607 人	230 人
22 (j/f)	23 (k/f)
2122 人	769 人
78 (l/f)	77 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
192人 (31.6)	92人 (15.2)	172人 (28.3)
773人 (36.4)	125人 (5.9)	551人 (26)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	1639 (8.5)	9931 (51.2)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	49 (8.1)	257 (42.3)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	85 (14)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	180 (8.5)	1205 (56.8)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (－)	365 (17.2)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　美濃市（総数）　（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
15745 人	
年代別	人数(T)
20代以下	4320
30代	1792
40代	2328
50代	2404
60代	3137
70～74歳	1764
再掲 40～74歳(Y)	9633

脂質異常症治療中		
1918 人 (12.2)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	33	0.8
30代	61	3.4
40代	147	6.3
50代	314	13.1
60代	741	23.6
70～74歳	622	35.3
再掲 40～74歳(g)	1824	18.9

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		321 人 (16.7)		<20 (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	<20	－
<20	－	31	9.9	0	－
25	3.4	122	16.5	<20	－
46	7.4	156	25.1	<20	－
81	4.4	－	－	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：1007 人（55.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
4416人 (45.8)	715人 (16.2)	280人 (6.3)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 1191 人 (27) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
172 人	84 人
24 (j/f)	30 (k/f)
543 人	196 人
76 (l/f)	70 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
55人 (32)	31人 (18)	63人 (36.6)
161人 (29.7)	27人 (5)	139人 (25.6)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	389 (8.8)	2403 (54.4)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	80 (46.5)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<20 (－)	22 (12.8)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	53 (9.8)	324 (59.7)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	102 (18.8)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　郡上市（総数）

（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
30848 人	
年代別	人数(T)
20代以下	8153
30代	3442
40代	4652
50代	5130
60代	6193
70～74歳	3278
再掲 40～74歳(Y)	19253

脂質異常症治療中		
3635 人 (11.8)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	47	0.6
30代	88	2.6
40代	281	6
50代	685	13.4
60代	1483	23.9
70～74歳	1051	32.1
再掲 40～74歳(g)	3500	18.2

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	<10	－	0	－
<10	－	<10	－	0	－
<10	－	31	11	0	－
31	4.5	76	11.1	0	－
92	6.2	248	16.7	<10	－
100	9.5	238	22.6	<10	－
－	－	593	16.9	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：1625 人（46.4）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	脂質異常(LDL-C) 180以上(f') (f'/e)
11627人 (60.4)	1550人 (13.3)	553人 (4.8)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 2818 人 (24.2) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
322 人	137 人
21 (j/f)	25 (k/f)
1228 人	416 人
79 (l/f)	75 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
109人 (33.9)	32人 (9.9)	74人 (23)
406人 (33.1)	58人 (4.7)	291人 (23.7)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	1161 (10)	5244 (45.1)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	42 (13)	127 (39.4)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (－)	61 (18.9)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	160 (13)	611 (49.8)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	17 (1.4)	252 (20.5)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　美濃加茂市（総数）

（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
47507 人	
年代別	人数(T)
20代以下	16617
30代	6589
40代	8228
50代	6728
60代	6005
70～74歳	3340
再掲 40～74歳(Y)	24301

脂質異常症治療中		
5986 人 (12.6)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	175	1.1
30代	261	4
40代	755	9.2
50代	1411	21
60代	1973	32.9
70～74歳	1411	42.2
再掲 40～74歳(g)	5550	22.8

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<10	－	<10	－	0	－
<10	－	24	9.2	<10	－
11	1.5	111	14.7	<10	－
59	4.2	268	19	12	0.85
112	5.7	517	26.2	15	0.76
118	8.4	428	30.3	17	1.2
300	5.4	1324	23.9	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：3325 人（59.9）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	脂質異常(LDL-C) 180以上(f') (f'/e)
12010人 (49.4)	1658人 (13.8)	608人 (5.1)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 2372 人 (19.8) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
289 人	116 人
17 (j/f)	19 (k/f)
1369 人	492 人
83 (l/f)	81 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
105人 (36.3)	33人 (11.4)	66人 (22.8)
482人 (35.2)	80人 (5.8)	351人 (25.6)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	1449 (12.1)	5807 (48.4)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	34 (11.8)	131 (45.3)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (－)	37 (12.8)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	152 (11.1)	742 (54.2)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	17 (1.2)	225 (16.4)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　可児市（総数）　（脂質異常症）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
85276 人	
年代別	人数(T)
20代以下	27309
30代	10989
40代	14599
50代	12168
60代	12214
70～74歳	7997
再掲 40～74歳(Y)	46978

脂質異常症治療中		
7468 人 (8.8)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	254	0.9
30代	413	3.8
40代	932	6.4
50代	1398	11.5
60代	2425	19.9
70～74歳	2046	25.6
再掲 40～74歳(g)	6801	14.5

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<10	－	<10	－	0	－
12	2.9	19	4.6	0	－
30	3.2	74	7.9	0	－
61	4.4	121	8.7	<10	－
145	6	334	13.8	<10	－
220	10.8	459	22.4	10	0.49
456	6.7	988	14.5	－	－

特定健診 ※40－74歳

gのうち特定健診未受診の者(h)：4976 人（73.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診受診者(e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
22568人 (48)	3333人 (14.8)	1236人 (5.5)

脂質異常症治療中(i)（質問票 服薬有 レセプト有） 4067 人（18）(i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
441 人	169 人
13 (j/f)	14 (k/f)
2892 人	1067 人
87 (l/f)	86 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
163人 (37)	72人 (16.3)	123人 (27.9)
941人 (32.5)	188人 (6.5)	745人 (25.8)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	3140 (13.9)	11172 (49.5)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	62 (14.1)	221 (50.1)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (－)	78 (17.7)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	390 (13.5)	1482 (51.2)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (－)	509 (17.6)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　坂祝町（総数）　（脂質異常症）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
6940 人	
年代別	人数(T)
20代以下	2219
30代	925
40代	1079
50代	970
60代	1129
70～74歳	618
再掲 40～74歳(Y)	3796

脂質異常症治療中		
－ (－)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	－
30代	<20	－
40代	37	3.4
50代	61	6.3
60代	84	7.4
70～74歳	61	9.9
再掲 40～74歳(g)	243	6.4

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	0	－	0	－
0	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	<20	－
<20	－	<20	－	0	－
20	8.2	29	11.9	<20	－

特定健診 ※40－74歳

gのうち特定健診未受診の者(h)：146 人（60.1）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診受診者(e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
1915人 (50.4)	307人 (16)	122～140 (－)

脂質異常症治療中(i)（質問票 服薬有 レセプト有） 392 人（20.5）(i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
54 人	<20
18 (j/f)	－
253 人	121 人
82 (l/f)	87 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
24人 (44.4)	<20 (－)	21人 (38.9)
78人 (30.8)	<20 (－)	72人 (28.5)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	217 (11.3)	837 (43.7)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	21 (38.9)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	23 (9.1)	107 (42.3)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (－)	33 (13)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　富加町（総数）　（脂質異常症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：4678 人

年代別	人数(T)	脂質異常症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		201 人 (4.3)		<20 (-)		- (-)		- (-)	
20代以下	1444	<20	-	0	-	0	-	0	-
30代	634	<20	-	0	-	0	-	0	-
40代	726	<20	-	<20	-	<20	-	0	-
50代	625	34	5.4	0	-	<20	-	0	-
60代	771	63	8.2	<20	-	<20	-	0	-
70～74歳	478	77	16.1	<20	-	<20	-	0	-
再掲 40～74歳(Y)	2600	再掲 40～74歳(g) -	-	<20	-	27	14.6	-	-

gのうち特定健診未受診者(h)：98 人（53）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：1244人（47.8）

脂質異常(LDL-C)：160以上(f)(f/e) 172人（13.8）／180以上(f')(f'/e) 47～65（-）

脂質異常症治療中(i)（質問票 服薬有 レセプト有）：357 人（28.7）(i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上	臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
33 人	<20	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)	詳細健診実施者(m/e)	94 (7.6)	617 (49.6)
19 (j/f)	-				検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (-)	<20 (-)
					有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (-)	<20 (-)
139 人	46 人	50人 (36)	<20 (-)	44人 (31.7)	検査実施者(p) 実施率(p/l)	<20 (-)	85 (61.2)
81 (l/f)	78 (m/f)				有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (-)	27 (19.4)
未治療(l, m)							

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　川辺町（総数）　（脂質異常症）

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：8185 人

年代別	人数(T)	脂質異常症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		- (-)		<20 (-)		- (-)		<20 (-)	
20代以下	2547	<20	-	0	-	0	-	0	-
30代	992	23	2.3	0	-	<20	-	0	-
40代	1239	71	5.7	<20	-	<20	-	0	-
50代	1283	139	10.8	<20	-	<20	-	0	-
60代	1358	242	17.8	<20	-	<20	-	<20	-
70～74歳	766	162	21.1	<20	-	<20	-	0	-
再掲 40～74歳(Y)	4646	再掲 40～74歳(g) 614	13.2	<20	-	44	7.2	<20	-

gのうち特定健診未受診者(h)：332 人（54.1）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y)：2474人（53.3）

脂質異常(LDL-C)：160以上(f)(f/e) 310人（12.5）／180以上(f')(f'/e) 101人（4.1）

脂質異常症治療中(i)（質問票 服薬有 レセプト有）：579 人（23.4）(i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上	臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
61 人	21 人	26人 (42.6)	<20 (-)	<20 (-)	詳細健診実施者(m/e)	283 (11.4)	1069 (43.2)
20 (j/f)	21 (k/f)				検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (-)	27 (44.3)
					有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (-)	<20 (-)
249 人	80 人	82人 (32.9)	<20 (-)	48人 (19.3)	検査実施者(p) 実施率(p/l)	26 (10.4)	124 (49.8)
80 (l/f)	79 (m/f)				有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (-)	33 (13.3)
未治療(l, m)							

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　七宗町（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
2533 人	
年代別	人数(T)
20代以下	605
30代	207
40代	313
50代	426
60代	630
70～74歳	352
再掲 40～74歳(Y)	1721

指質異常症治療中		
－ (－)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	－
30代	<20	－
40代	<20	－
50代	<20	－
60代	39	6.2
70～74歳	45	12.8
再掲 40～74歳(g)	100	5.8

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	<20 (－)		－ (－)		－ (－)	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	0	－	0	－	0	－
30代	0	－	0	－	0	－
40代	0	－	<20	－	0	－
50代	0	－	<20	－	0	－
60代	0	－	<20	－	0	－
70～74歳	<20	－	<20	－	0	－
再掲 40～74歳	<20	－	26	26	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
59 人 (59) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	指質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
896人 (52.1)	137～155 (－)	46～64 (－)

指質異常症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）
203 人 (22.7) (i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)
<20	<20
－	－
136 人	45 人
88 (l/f)	83 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満	高血糖	高血圧
	BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
治療中	<20 (－)	<20 (－)	<20 (－)
未治療	44人 (32.4)	<20 (－)	39人 (28.7)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	175 (19.5)	469 (52.3)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	<20 (－)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	24 (17.6)	80 (58.8)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (－)	21 (15.4)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　八百津町（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
7975 人	
年代別	人数(T)
20代以下	2084
30代	788
40代	1149
50代	1287
60代	1703
70～74歳	964
再掲 40～74歳(Y)	5103

指質異常症治療中		
－ (－)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	－
30代	<20	－
40代	21	1.8
50代	34	2.6
60代	90	5.3
70～74歳	65	6.7
再掲 40～74歳(g)	210	4.1

	脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
	<20 (－)		－ (－)		－ (－)	
年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	0	－	0	－	0	－
30代	0	－	0	－	0	－
40代	<20	－	<20	－	0	－
50代	<20	－	<20	－	0	－
60代	<20	－	<20	－	0	－
70～74歳	<20	－	<20	－	0	－
再掲 40～74歳	<20	－	22	10.5	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
100 人 (47.6) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	指質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
2597人 (50.9)	350人 (13.5)	140人 (5.4)

指質異常症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）
662 人 (25.5) (i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)
74 人	31 人
21 (j/f)	22 (k/f)
276 人	109 人
79 (l/f)	78 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満	高血糖	高血圧
	BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
治療中	26人 (35.1)	<20 (－)	22人 (29.7)
未治療	89人 (32.2)	<20 (－)	79人 (28.6)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	316 (12.2)	1263 (48.6)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	40 (54.1)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	24 (8.7)	154 (55.8)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (－)	54 (19.6)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　白川町（総数）　　（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：5389 人

年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
合計	5389 人	－ (－)		－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
20代以下	1153	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	459	<20	－	<20	－	<20	－	0	－
40代	706	26	3.7	0	－	0	－	0	－
50代	987	71	7.2	<20	－	<20	－	0	－
60代	1334	182	13.6	<20	－	28	15.4	<20	－
70～74歳	750	164	21.9	21	12.8	36	22	<20	－
再掲 40～74歳(Y)/(g)	3777	443	11.7	－	－	－	－	<20	－

（患者数(a)・割合(a/T)は脂質異常症治療中）

gのうち特定健診未受診の者(h)：242 人（54.6）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
1978人 (52.4)	242人 (12.2)	67～85 (－)

脂質異常症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）：480 人（24.3）(i/e)

	合計(j) LDL160以上	180以上(k)	肥満 BMI25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
治療中	43 人 / 18 (j/f)	<20 / －	<20 (－)	<20 (－)	<20 (－)
未治療(l, m)	199 人 / 82 (l/f)	66 人 / 81 (m/f)	59人 (29.6)	<20 (－)	49人 (24.6)

その他のリスク

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	220 (11.1)	845 (42.7)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (－)	29 (67.4)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	<20 (－)	102 (51.3)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (－)	<20 (－)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　東白川村（総数）　　（脂質異常症）

軽症 → 重症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）：1463 人

年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
合計	1463 人	238 人 (16.3)		<20 (－)		－ (－)		－ (－)	
20代以下	330	<20	－	0	－	0	－	0	－
30代	138	<20	－	0	－	0	－	0	－
40代	185	<20	－	0	－	<20	－	0	－
50代	304	50	16.4	<20	－	<20	－	0	－
60代	321	100	31.2	<20	－	<20	－	0	－
70～74歳	185	60	32.4	<20	－	<20	－	0	－
再掲 40～74歳(Y)/(g)	995	－	－	<20	－	22	9.8	－	－

（患者数(a)・割合(a/T)は脂質異常症治療中）

gのうち特定健診未受診の者(h)：111 人（49.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
526人 (52.9)	26～44 (－)	<20 (－)

脂質異常症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）：155 人（29.5）(i/e)

	合計(j) LDL160以上	180以上(k)	肥満 BMI25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
治療中	<20 / －	<20 / －	<20 (－)	0人 (－)	<20 (－)
未治療(l, m)	25 人 / 60 (l/f)	<20 / －	<20 (－)	0人 (－)	<20 (－)

その他のリスク

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	<20 (－)	164 (31.2)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	0 (－)	<20 (－)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	<20 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	0 (－)	<20 (－)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (－)	<20 (－)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　御嵩町（総数）

（脂質異常症）

レセプト　軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
14690 人	
年代別	人数(T)
20代以下	4362
30代	1841
40代	2276
50代	2120
60代	2653
70～74歳	1438
再掲 40～74歳(Y)	8487

脂質異常症治療中		
– (–)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	–
30代	25	1.4
40代	78	3.4
50代	169	8
60代	457	17.2
70～74歳	371	25.8
再掲 40～74歳(g)	1075	12.7

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
– (–)		– (–)		– (–)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	–	0	–	0	–
<20	–	<20	–	0	–
<20	–	<20	–	0	–
<20	–	49	29	0	–
27	5.9	108	23.6	0	–
29	7.8	102	27.5	0	–
68	6.3	–	–	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
805 人（74.9）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
4635人 (54.6)	667人 (14.4)	242人 (5.2)

脂質異常症治療中(i)（質問票 脂薬有 レセプト有） 956 人（20.6）(i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
107 人	45 人
16 (j/f)	19 (k/f)
560 人	197 人
84 (l/f)	81 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
41人 (38.3)	<20 (–)	32人 (29.9)
174人 (31.1)	40人 (7.1)	160人 (28.6)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/e)	559 (12.1)	2287 (49.3)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (–)	64 (59.8)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (–)	24 (22.4)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	81 (14.5)	273 (48.8)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<20 (–)	88 (15.7)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　多治見市（総数）

（脂質異常症）

レセプト　軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
89260 人	
年代別	人数(T)
20代以下	26138
30代	10425
40代	14406
50代	14769
60代	14577
70～74歳	8945
再掲 40～74歳(Y)	52697

脂質異常症治療中		
16236 人 (18.2)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	905	3.5
30代	725	7
40代	1757	12.2
50代	3445	23.3
60代	5152	35.3
70～74歳	4252	47.5
再掲 40～74歳(g)	14606	27.7

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
1193 人 (7.3)		2730 人 (16.8)		– (–)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
43	4.8	66	7.3	0	–
50	6.9	74	10.2	0	–
107	6.1	222	12.6	<10	–
179	5.2	489	14.2	19	0.55
368	7.1	891	17.3	28	0.54
446	10.5	988	23.2	45	1.06
1100	7.5	2590	17.7	–	–

gのうち特定健診未受診の者(h)
10413 人（71.3）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
26346人 (50)	3517人 (13.3)	1297人 (4.9)

脂質異常症治療中(i)（質問票 脂薬有 レセプト有） 6456 人（24.5）(i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
671 人	275 人
19 (j/f)	21 (k/f)
2846 人	1022 人
81 (l/f)	79 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
227人 (33.8)	56人 (8.3)	196人 (29.2)
844人 (29.7)	145人 (5.1)	686人 (24.1)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/e)	2325 (8.8)	13080 (49.6)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	70 (10.4)	377 (56.2)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (–)	122 (18.2)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	259 (9.1)	1421 (49.9)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	17 (0.6)	436 (15.3)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　瑞浪市（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 30683 人

年代別	人数(T)	脂質異常症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		3842 人 (12.5)		344 人 (9)		– (–)		– (–)	
20代以下	9592	218	2.3	12	5.5	<10	–	<10	–
30代	3808	239	6.3	11	4.6	<10	–	<10	–
40代	4767	465	9.8	27	5.8	36	7.7	<10	–
50代	4800	775	16.1	47	6.1	67	8.6	<10	–
60代	4869	1205	24.7	101	8.4	155	12.9	<10	–
70～74歳	2847	940	33	146	15.5	199	21.2	15	1.6
再掲 40～74歳(Y)	17283	再掲 40～74歳(g) 3385	19.6	321	9.5	457	13.5	32	0.95

gのうち特定健診未受診の者(h): 2173 人（64.2）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y): 8745人（50.6）

脂質異常(LDL-C) 160以上(f)(f/e)	180以上(f')(f'/e)
1294人（14.8）	467人（5.3）

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）: 1737 人（19.9）(i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)
219 人	79 人
17 (j/f)	17 (k/f)
1075 人	388 人
83 (l/f)	83 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
	84人（38.4）	35人（16）	67人（30.6）
	352人（32.7）	72人（6.7）	311人（28.9）

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m)(m/a)	587 (6.7)	4692 (53.7)
検査実施者(n) 実施率(n/i)	13 (5.9)	107 (48.9)
有所見者(o) 有所見率(o/i)	0 (–)	28 (12.8)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	73 (6.8)	595 (55.3)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (–)	168 (15.6)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　土岐市（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 45636 人

年代別	人数(T)	脂質異常症治療中 患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患 患者数(b)	b/a	虚血性心疾患 患者数(c)	c/a	人工透析 患者数(d)	d/a
		5645 人 (12.4)		– (–)		– (–)		– (–)	
20代以下	13534	198	1.5	<10	–	<10	–	0	–
30代	5537	205	3.7	<10	–	19	9.3	<10	–
40代	7432	534	7.2	27	5.1	40	7.5	<10	–
50代	7418	1134	15.3	52	4.6	101	8.9	12	1.06
60代	7295	1963	26.9	144	7.3	237	12.1	17	0.87
70～74歳	4420	1611	36.4	135	8.4	264	16.4	<10	–
再掲 40～74歳(Y)	26565	再掲 40～74歳(g) 5242	19.7	358	6.8	642	12.2	42	0.8

gのうち特定健診未受診の者(h): 3756 人（71.7）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e/Y): 14001人（52.7）

脂質異常(LDL-C) 160以上(f)(f/e)	180以上(f')(f'/e)
1933人（13.8）	735人（5.2）

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有）: 2959 人（21.1）(i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)
295 人	124 人
15 (j/f)	17 (k/f)
1638 人	611 人
85 (l/f)	83 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
	115人（39）	50人（16.9）	101人（34.2）
	480人（29.3）	96人（5.9）	466人（28.4）

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m)(m/a)	853 (6.1)	7547 (53.9)
検査実施者(n) 実施率(n/i)	17 (5.8)	155 (52.5)
有所見者(o) 有所見率(o/i)	<10 (–)	52 (17.6)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	96 (5.9)	863 (52.7)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (–)	250 (15.3)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　中津川市（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 62231 人

脂質異常症治療中: 10378 人 (16.7)

脳血管疾患: 1211 人 (11.7)

虚血性心疾患: 1085 人 (10.5)

人工透析: − (−)

年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	18960	709	3.7	28	3.9	16	2.3	0	−
30代	7568	531	7	59	11.1	30	5.6	0	−
40代	9975	1138	11.4	156	13.7	69	6.1	<10	−
50代	9464	2044	21.6	273	13.4	173	8.5	<10	−
60代	10330	3359	32.5	347	10.3	387	11.5	20	0.6
70〜74歳	5934	2597	43.8	348	13.4	410	15.8	15	0.58
再掲 40〜74歳(Y) / (g)	35703	9138	25.6	1124	12.3	1039	11.4	46	0.5

gのうち特定健診未受診の者(h): 4831 人 (52.9) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40−74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
19333人 (54.1)	2622人 (13.6)	905人 (4.7)

脂質異常症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）: 5434 人 (28.1) (i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
642 人 / 24 (j/f)	258 人 / 29 (k/f)	215人 (33.5)	84人 (13.1)	198人 (30.8)
1980 人 / 76 (l/f)	647 人 / 71 (m/f)	622人 (31.4)	108人 (5.5)	525人 (26.5)
未治療(l, m)				

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	713 (3.7)	9251 (47.9)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	21 (3.3)	278 (43.3)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (−)	93 (14.5)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	79 (4)	1013 (51.2)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (−)	330 (16.7)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　恵那市（総数）　（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）: 38397 人

脂質異常症治療中: 3986 人 (10.4)

脳血管疾患: − (−)

虚血性心疾患: − (−)

人工透析: <10 (−)

年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	11092	187	1.7	<10	−	<10	−	0	−
30代	4223	165	3.9	<10	−	10	6.1	0	−
40代	6119	430	7	13	3	25	5.8	0	−
50代	5978	820	13.7	35	4.3	67	8.2	<10	−
60代	6924	1337	19.3	66	4.9	151	11.3	<10	−
70〜74歳	4061	1047	25.8	81	7.7	193	18.4	<10	−
再掲 40〜74歳(Y) / (g)	23082	3634	15.7	195	5.4	436	12	<10	−

gのうち特定健診未受診の者(h): 1902 人 (52.3) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40−74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
12118人 (52.5)	1732人 (14.3)	670人 (5.5)

脂質異常症治療中(i)（質問票_服薬有 レセプト有）: 2967 人 (24.5) (i/e)

合計(j) LDL160以上	180以上(k)	その他のリスク 肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血圧 Ⅰ度高血圧以上
391 人 / 23 (j/f)	169 人 / 25 (k/f)	118人 (30.2)	56人 (14.3)	134人 (34.3)
1341 人 / 77 (l/f)	501 人 / 75 (m/f)	412人 (30.7)	93人 (6.9)	408人 (30.4)
未治療(l, m)				

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	767 (6.3)	6944 (57.3)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	40 (10.2)	223 (57)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	11 (2.8)	79 (20.2)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	91 (6.8)	785 (58.5)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	12 (0.9)	224 (16.7)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　高山市（総数）

（脂質異常症）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
69013 人	
年代別	人数(T)
20代以下	20106
30代	8114
40代	11693
50代	10818
60代	11150
70～74歳	7132
再掲 40～74歳(Y)	40793

脂質異常症治療中		
9010 人 (13.1)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	279	1.4
30代	397	4.9
40代	1072	9.2
50代	1954	18.1
60代	2987	26.8
70～74歳	2321	32.5
再掲 40～74歳(g)	8334	20.4

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<10	－	<10	－	0	－
<10	－	19	4.8	<10	－
31	2.9	79	7.4	<10	－
62	3.2	213	10.9	15	0.77
186	6.2	443	14.8	23	0.77
190	8.2	441	19	13	0.56
469	5.6	1176	14.1	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
4111 人 (49.3) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
23081人 (56.6)	2686人 (11.6)	908人 (3.9)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 5756 人 (24.9) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
578 人	215 人
22 (j/f)	24 (k/f)
2108 人	693 人
78 (l/f)	76 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
190人 (32.9)	60人 (10.4)	143人 (24.7)
716人 (34)	131人 (6.2)	468人 (22.2)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	1509 (6.5)	11383 (49.3)
検査実施者(n) 実施率(n/i)	37 (6.4)	263 (45.5)
有所見者(o) 有所見率(o/i)	0 (－)	93 (16.1)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	145 (6.9)	1176 (55.8)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (－)	318 (15.1)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　飛騨市（総数）

（脂質異常症）

レセプト

軽症 → 重症

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
17257 人	
年代別	人数(T)
20代以下	4379
30代	1821
40代	2816
50代	2920
60代	3220
70～74歳	2101
再掲 40～74歳(Y)	11057

脂質異常症治療中		
1963 人 (11.4)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	41	0.9
30代	61	3.3
40代	172	6.1
50代	389	13.3
60代	716	22.2
70～74歳	584	27.8
再掲 40～74歳(g)	1861	16.8

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		<20 (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	0	－
<20	－	25	6.4	0	－
21	2.9	71	9.9	<20	－
32	5.5	91	15.6	<20	－
67	3.6	－	－	<20	－

gのうち特定健診未受診の者(h)
664 人 (35.7) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
7085人 (64.1)	801人 (11.3)	253人 (3.6)

脂質異常症治療中(i)（質問票、服薬有 レセプト有） 1949 人 (27.5) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
220 人	72 人
27 (j/f)	28 (k/f)
581 人	181 人
73 (l/f)	72 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
71人 (32.3)	25人 (11.4)	65人 (29.5)
184人 (31.7)	29人 (5)	153人 (26.3)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	385 (5.4)	2898 (40.9)
検査実施者(n) 実施率(n/i)	20 (9.1)	78 (35.5)
有所見者(o) 有所見率(o/i)	<20 (－)	33 (15)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	33 (5.7)	310 (53.4)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (－)	90 (15.5)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　下呂市（総数）

（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
23127 人	
年代別	人数(T)
20代以下	5984
30代	2344
40代	3543
50代	3925
60代	4554
70～74歳	2777
再掲 40～74歳(Y)	14799

脂質異常症治療中		
3269 人 (14.1)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	62	1
30代	103	4.4
40代	280	7.9
50代	678	17.3
60代	1183	26
70～74歳	963	34.7
再掲 40～74歳(g)	3104	21

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
－ (－)		－ (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
<10	－	<10	－	0	－
<10	－	<10	－	0	－
11	3.9	19	6.8	<10	－
30	4.4	49	7.2	<10	－
93	7.9	146	12.3	<10	－
89	9.2	142	14.7	<10	－
223	7.2	356	11.5	13	0.42

gのうち特定健診未受診の者(h)：1334 人（43）(h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	脂質異常(LDL-C) 180以上(f') (f'/e)
8711人 (58.9)	922人 (10.6)	344人 (3.9)

脂質異常症治療中(i)（質問票 服薬有 レセプト有） 2678 人 (30.7) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
232 人	79 人
25 (j/f)	23 (k/f)
690 人	265 人
75 (l/f)	77 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
57人 (24.6)	19人 (8.2)	68人 (29.3)
215人 (31.2)	37人 (5.4)	183人 (26.5)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	891 (10.2)	4245 (48.7)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	24 (10.3)	119 (51.3)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (－)	35 (15.1)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	58 (8.4)	424 (61.4)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (－)	119 (17.2)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。

※令和2年度　白川村（総数）

（脂質異常症）

軽 症 → 重 症

レセプト

人口（※令和2年国勢調査人口等基本集計）	
1247 人	
年代別	人数(T)
20代以下	387
30代	152
40代	198
50代	177
60代	205
70～74歳	128
再掲 40～74歳(Y)	708

脂質異常症治療中		
<20 (－)		
年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	0	－
30代	0	－
40代	0	－
50代	<20	－
60代	<20	－
70～74歳	<20	－
再掲 40～74歳(g)	<20	－

脳血管疾患		虚血性心疾患		人工透析	
<20 (－)		<20 (－)		－ (－)	
患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
0	－	0	－	0	－
0	－	0	－	0	－
0	－	0	－	0	－
0	－	<20	－	0	－
<20	－	0	－	0	－
0	－	<20	－	0	－
<20	－	<20	－	－	－

gのうち特定健診未受診の者(h)：<20 (－)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※40－74歳

特定健診受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	脂質異常(LDL-C) 180以上(f') (f'/e)
468人 (66.1)	70～88 (－)	29人 (6.2)

脂質異常症治療中(i)（質問票 服薬有 レセプト有） 49 人 (10.5) (i/e)	
合計(j) LDL160以上	180以上(k)
<20	0 人
－	－
69 人	29 人
96 (l/f)	100 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	Ⅰ度高血圧以上
0人 (－)	0人 (－)	0人 (－)
25人 (36.2)	<20 (－)	<20 (－)

臓器障害	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者
詳細健診実施者(m) (m/a)	<20 (－)	217 (46.4)
検査実施者(n) 実施率(n/j)	0 (－)	<20 (－)
有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (－)	0 (－)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	<20 (－)	33 (47.8)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (－)	<20 (－)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有とした

※データ取得時において令和3年度分のレセプト情報がNDBに未格納であったため、令和2年度のデータで突合しています。
なお、「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン（第2版）」に従い、該当者数が最小集計単位未満の場合は、該当セル及び関連セルをマスク処理しています。