

Ⅲ 詳細情報

1 岐阜県全体

(1) 特定健診の状況

1-1 保健指導区分（令和4年度）

	男性						女性					
	情報提供		動機づけ支援		積極的支援		情報提供		動機づけ支援		積極的支援	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	39,345	77.3	4,151	8.2	7,415	14.6	40,048	92.2	2,145	4.9	1,267	2.9
羽島市	6,762	76.5	710	8.0	1,363	15.4	6,435	91.3	393	5.6	224	3.2
各務原市	14,054	77.0	1,481	8.1	2,711	14.9	13,642	92.1	760	5.1	418	2.8
山県市	2,504	78.7	256	8.1	421	13.2	2,501	92.4	132	4.9	73	2.7
瑞穂市	5,568	77.6	597	8.3	1,015	14.1	5,259	91.9	292	5.1	169	3.0
本巣市	3,434	76.5	384	8.6	674	15.0	3,276	91.4	198	5.5	109	3.0
岐南町	2,390	75.8	266	8.4	499	15.8	2,273	91.9	119	4.8	81	3.3
笠松町	2,177	77.5	227	8.1	406	14.5	2,100	90.7	139	6.0	76	3.3
北方町	1,686	77.9	164	7.6	314	14.5	1,773	92.4	91	4.7	54	2.8
大垣市	15,758	76.6	1,700	8.3	3,119	15.2	15,139	91.3	872	5.3	563	3.4
海津市	3,529	77.4	375	8.2	653	14.3	3,171	91.2	185	5.3	120	3.5
養老町	2,844	76.7	308	8.3	554	15.0	2,759	90.4	173	5.7	121	4.0
垂井町	2,546	75.8	258	7.7	557	16.6	2,402	90.3	162	6.1	96	3.6
関ヶ原町	612	76.9	69	8.7	115	14.5	649	88.5	56	7.6	28	3.8
神戸町	2,392	76.3	264	8.4	480	15.3	1,955	90.1	133	6.1	81	3.7
輪之内町	1,037	76.8	105	7.8	208	15.4	1,059	92.1	54	4.7	37	3.2
安八町	1,646	75.3	197	9.0	342	15.7	1,514	90.9	93	5.6	58	3.5
揖斐川町	2,003	77.3	199	7.7	389	15.0	2,087	92.0	120	5.3	61	2.7
大野町	2,120	75.3	223	7.9	474	16.8	2,133	90.3	126	5.3	104	4.4
池田町	2,354	76.0	262	8.5	480	15.5	2,252	91.0	128	5.2	95	3.8
関市	8,397	77.9	862	8.0	1,526	14.2	7,945	92.2	427	5.0	244	2.8
美濃市	1,934	80.3	181	7.5	294	12.2	1,888	92.7	91	4.5	58	2.9
郡上市	5,292	76.3	580	8.4	1,063	15.3	5,085	90.9	330	5.9	180	3.2
美濃加茂市	10,084	76.3	1,086	8.2	2,053	15.5	9,360	90.7	603	5.8	359	3.5
可児市	4,786	77.8	497	8.1	870	14.1	4,830	92.1	264	5.0	149	2.8
坂祝町	822	76.7	83	7.7	167	15.6	777	89.9	52	6.0	35	4.1
富加町	567	79.2	56	7.8	93	13.0	591	93.5	* 41, 6.5%			
川辺町	1,189	80.8	91	6.2	191	13.0	1,006	92.6	46	4.2	35	3.2
七宗町	386	82.7	33	7.1	48	10.3	417	93.5	<20	—	<20	—
八百津町	1,173	79.3	112	7.6	195	13.2	1,124	91.1	64	5.2	46	3.7
白川町	824	81.4	61	6.0	127	12.6	847	94.1	25	2.8	28	3.1
東白川村	224	84.2	* 42, 15.8%				242	91.7	<20	—	<20	—
御嵩町	2,038	76.1	236	8.8	403	15.1	1,803	90.5	101	5.1	89	4.5
多治見市	11,535	79.4	1,111	7.7	1,884	13.0	11,411	92.7	573	4.7	324	2.6
瑞浪市	8,772	79.8	718	6.5	1,510	13.7	7,922	92.3	424	4.9	241	2.8
土岐市	3,819	78.9	356	7.4	665	13.7	3,740	91.7	224	5.5	113	2.8
中津川市	5,412	80.6	435	6.5	870	13.0	5,078	92.3	265	4.8	157	2.9
恵那市	6,313	78.6	601	7.5	1,123	14.0	5,827	91.3	362	5.7	196	3.1
高山市	10,171	81.4	790	6.3	1,534	12.3	10,465	93.7	476	4.3	232	2.1
飛騨市	3,086	82.1	244	6.5	431	11.5	3,047	93.8	143	4.4	60	1.9
下呂市	3,615	81.7	287	6.5	523	11.8	3,742	93.5	157	3.9	102	2.6
白川村	172	76.4	* 53, 23.6%				190	—	<20	—	<20	—

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第3版」（令和5年10月 厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、動機づけ支援と積極的支援の合計値を表示しています。

2-1 メタボリックシンドローム区分（令和4年度）												
	男性						女性					
	非該当		予備群該当		基準該当		非該当		予備群該当		基準該当	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	30,253	59.4	8,642	17.0	12,015	23.6	38,331	88.2	2,183	5.0	2,949	6.8
羽島市	5,117	57.9	1,506	17.1	2,212	25.0	6,039	85.6	365	5.2	649	9.2
各務原市	10,900	59.7	3,214	17.6	4,132	22.7	12,947	87.4	796	5.4	1,077	7.3
山県市	1,859	58.4	562	17.7	760	23.9	2,304	85.1	164	6.1	238	8.8
瑞穂市	4,432	61.7	1,225	17.1	1,523	21.2	5,010	87.6	290	5.1	420	7.3
本巣市	2,672	59.5	784	17.5	1,036	23.1	3,123	87.2	193	5.4	267	7.5
岐南町	1,920	60.9	551	17.5	684	21.7	2,201	89.0	123	5.0	149	6.0
笠松町	1,646	58.6	508	18.1	656	23.4	1,975	85.3	162	7.0	178	7.7
北方町	1,299	60.0	353	16.3	512	23.7	1,678	87.5	101	5.3	139	7.3
大垣市	12,222	59.4	3,538	17.2	4,819	23.4	14,479	87.4	912	5.5	1,184	7.1
海津市	2,556	56.1	827	18.2	1,174	25.8	2,964	85.3	223	6.4	289	8.3
養老町	2,062	55.6	682	18.4	962	26.0	2,589	84.8	222	7.3	242	7.9
垂井町	1,974	58.7	584	17.4	803	23.9	2,287	86.0	166	6.2	207	7.8
関ヶ原町	471	59.2	120	15.1	205	25.8	616	84.0	46	6.3	71	9.7
神戸町	1,870	59.6	533	17.0	733	23.4	1,828	84.3	144	6.6	197	9.1
輪之内町	787	58.3	227	16.8	336	24.9	985	85.7	54	4.7	111	9.7
安八町	1,267	58.0	390	17.9	528	24.2	1,443	86.7	102	6.1	120	7.2
揖斐川町	1,482	57.2	449	17.3	660	25.5	1,952	86.0	134	5.9	183	8.1
大野町	1,624	57.7	500	17.8	693	24.6	2,048	86.7	128	5.4	187	7.9
池田町	1,820	58.8	544	17.6	732	23.6	2,158	87.2	150	6.1	167	6.8
関市	6,546	60.7	1,866	17.3	2,372	22.0	7,643	88.7	408	4.7	565	6.6
美濃市	1,518	63.0	368	15.3	523	21.7	1,812	89.0	89	4.4	136	6.7
郡上市	3,729	60.6	1,000	16.3	1,425	23.2	4,661	88.9	259	4.9	323	6.2
美濃加茂市	4,213	60.8	1,244	17.9	1,478	21.3	4,941	88.3	318	5.7	336	6.0
可児市	8,101	61.3	2,201	16.7	2,921	22.1	9,026	87.4	620	6.0	676	6.6
坂祝町	599	55.9	202	18.8	271	25.3	722	83.6	73	8.5	69	8.0
富加町	429	59.9	122	17.0	165	23.0	559	88.5	27	4.3	46	7.3
川辺町	917	62.3	224	15.2	330	22.4	957	88.0	58	5.3	72	6.6
七宗町	284	60.8	84	18.0	99	21.2	398	89.2	20	4.5	28	6.3
八百津町	858	58.0	263	17.8	359	24.3	1,048	84.9	77	6.2	109	8.8
白川町	653	64.5	163	16.1	196	19.4	805	89.4	47	5.2	48	5.3
東白川村	163	61.3	49	18.4	54	20.3	211	79.9	*53, 20.1%			
御嵩町	1,601	59.8	434	16.2	642	24.0	1,700	85.3	134	6.7	159	8.0
多治見市	9,050	62.3	2,321	16.0	3,159	21.7	10,987	89.3	516	4.2	805	6.5
瑞浪市	3,094	63.9	752	15.5	994	20.5	3,624	88.9	196	4.8	257	6.3
土岐市	5,183	64.5	1,234	15.4	1,620	20.2	5,651	88.5	335	5.3	399	6.3
中津川市	6,934	63.0	1,676	15.2	2,389	21.7	7,654	89.1	398	4.6	535	6.2
恵那市	4,227	62.9	1,006	15.0	1,484	22.1	4,915	89.4	223	4.1	362	6.6
高山市	8,464	67.7	1,821	14.6	2,210	17.7	10,275	92.0	438	3.9	460	4.1
飛騨市	2,529	67.2	531	14.1	701	18.6	2,934	90.3	127	3.9	189	5.8
下呂市	2,899	65.5	668	15.1	857	19.4	3,603	90.1	179	4.5	219	5.5
白川村	119	52.9	46	20.4	60	26.7	181	87.0	* 27, 13.0%			

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第3版」（令和5年10月 厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、予備群該当と基準該当の合計値を表示しています。

3－2 BMI（令和４年度）

	男性										女性									
	低体重		普通体重		肥満1度		肥満2度		肥満3度～4度		低体重		普通体重		肥満1度		肥満2度		肥満3度～4度	
	BMI<18.5		18.5≦BMI<25		25≦BMI<30		30≦BMI<35		35≦BMI		BMI<18.5		18.5≦BMI<25		25≦BMI<30		30≦BMI<35		35≦BMI	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜市	1,578	3.1	31,631	62.1	14,456	28.4	2,691	5.3	556	1.1	6,004	13.8	29,232	67.3	6,440	14.8	1,438	3.3	355	0.8
羽島市	264	3.0	5,351	60.6	2,571	29.1	547	6.2	103	1.2	885	12.6	4,592	65.1	1,211	17.2	301	4.3	63	0.9
各務原市	619	3.4	11,261	61.7	5,246	28.8	913	5.0	208	1.1	1,891	12.8	9,959	67.2	2,349	15.9	505	3.4	119	0.8
山県市	110	3.5	1,978	62.2	892	28.0	168	5.3	33	1.0	338	12.5	1,792	66.2	454	16.8	101	3.7	21	0.8
瑞穂市	235	3.3	4,462	62.1	2,008	28.0	398	5.5	78	1.1	771	13.5	3,756	65.6	932	16.3	196	3.4	67	1.2
本巣市	141	3.1	2,703	60.2	1,353	30.1	242	5.4	53	1.2	418	11.7	2,408	67.2	612	17.1	118	3.3	27	0.8
岐南町	117	3.7	1,895	60.1	929	29.5	173	5.5	41	1.3	332	13.4	1,656	67.0	376	15.2	*109, 4.4%			
笠松町	105	3.7	1,698	60.4	799	28.4	169	6.0	39	1.4	316	13.7	1,491	64.4	375	16.2	103	4.5	30	1.3
北方町	62	2.9	1,343	62.0	591	27.3	133	6.1	36	1.7	251	13.1	1,291	67.3	280	14.6	* 96, 5.0%			
大垣市	701	3.4	12,576	61.1	5,891	28.6	1,144	5.6	267	1.3	2,200	13.3	10,946	66.0	2,616	15.8	638	3.9	178	1.1
海津市	160	3.5	2,666	58.5	1,388	30.5	272	6.0	71	1.6	392	11.3	2,241	64.5	670	19.3	128	3.7	45	1.3
養老町	124	3.4	2,200	59.4	1,113	30.0	231	6.2	38	1.0	363	11.9	1,965	64.4	559	18.3	120	3.9	46	1.5
垂井町	117	3.5	2,035	60.6	950	28.3	208	6.2	51	1.5	322	12.1	1,730	65.0	469	17.6	111	4.2	28	1.1
関ヶ原町	23	2.9	498	62.6	219	27.5	* 56, 7.0%				83	11.3	481	65.6	138	18.8	* 31, 4.2%			
神戸町	91	2.9	1,868	59.6	970	30.9	172	5.5	35	1.1	253	11.7	1,430	65.9	375	17.3	82	3.8	29	1.3
輪之内町	40	3.0	793	58.7	418	31.0	* 99, 7.3%				137	11.9	733	63.7	226	19.7	* 54, 4.7%			
安八町	62	2.8	1,317	60.3	646	29.6	129	5.9	31	1.4	199	12.0	1,117	67.1	263	15.8	* 86, 5.2%			
揖斐川町	83	3.2	1,544	59.6	780	30.1	150	5.8	34	1.3	244	10.8	1,486	65.5	444	19.6	73	3.2	21	0.9
大野町	94	3.3	1,648	58.5	874	31.0	159	5.6	43	1.5	284	12.0	1,558	66.0	402	17.0	97	4.1	21	0.9
池田町	108	3.5	1,859	60.1	897	29.0	192	6.2	40	1.3	311	12.6	1,603	64.8	440	17.8	93	3.8	28	1.1
関市	389	3.6	6,750	62.6	3,001	27.8	522	4.8	123	1.1	1,062	12.3	5,834	67.7	1,349	15.7	302	3.5	72	0.8
美濃市	78	3.2	1,564	64.9	639	26.5	* 129, 5.4%				259	12.7	1,407	69.1	291	14.3	* 80, 3.9%			
郡上市	255	3.7	4,328	62.4	1,923	27.7	345	5.0	84	1.2	723	12.9	3,727	66.6	907	16.2	182	3.3	57	1.0
美濃加茂市	461	3.5	8,291	62.7	3,649	27.6	686	5.2	139	1.1	1,349	13.1	6,900	66.8	1,623	15.7	360	3.5	91	0.9
可児市	174	2.8	3,852	62.6	1,784	29.0	273	4.4	71	1.2	606	11.6	3,613	68.9	851	16.2	148	2.8	25	0.5
坂祝町	32	3.0	675	62.9	302	28.2	* 64, 6.0%				114	13.2	561	64.9	144	16.7	* 46, 5.3%			
富加町	24	3.4	444	62.0	200	27.9	* 48, 6.7%				56	8.9	443	70.1	99	15.7	* 34, 5.4%			
川辺町	48	3.3	948	64.5	408	27.7	* 67, 4.6%				150	13.8	742	68.3	157	14.4	* 38, 3.5%			
七宗町	25	5.4	305	65.3	*137, 29.3%						59	13.2	301	67.5	*86, 19.3%					
八百津町	61	4.1	937	63.3	410	27.7	* 72, 4.9%				169	13.7	819	66.4	197	16.0	* 49, 4.0%			
白川町	36	3.6	692	68.4	246	24.3	* 38, 3.8%				119	13.2	626	69.6	121	13.4	*34, 3.8%			
東白川村	<20	—	178	66.9	66	24.8	<20	—	<20	—	22	8.3	188	71.2	*54, 20.5%					
御嵩町	99	3.7	1,662	62.1	754	28.2	132	4.9	30	1.1	250	12.5	1,310	65.6	336	16.8	71	3.6	29	1.5
多治見市	515	3.5	9,363	64.4	3,850	26.5	659	4.5	142	1.0	1,663	13.5	8,431	68.5	1,758	14.3	366	3.0	92	0.8
瑞浪市	390	3.6	7,110	64.6	2,919	26.5	471	4.3	110	1.0	1,173	13.7	5,744	66.9	1,329	15.5	267	3.1	76	0.9
土岐市	167	3.5	3,156	65.2	1,272	26.3	197	4.1	50	1.0	574	14.1	2,717	66.6	628	15.4	123	3.0	36	0.9
中津川市	248	3.7	4,437	66.1	1,697	25.3	275	4.1	60	0.9	706	12.8	3,761	68.4	823	15.0	171	3.1	41	0.8
恵那市	295	3.7	5,185	64.5	2,117	26.3	366	4.6	74	0.9	871	13.6	4,233	66.3	1,009	15.8	227	3.6	47	0.7
高山市	427	3.4	8,085	64.7	3,334	26.7	540	4.3	109	0.9	1,657	14.8	7,544	67.5	1,610	14.4	300	2.7	64	0.6
飛騨市	123	3.3	2,454	65.3	1,008	26.8	151	4.0	25	0.7	487	15.0	2,176	67.0	451	13.9	113	3.5	23	0.7
下呂市	163	3.7	2,981	67.4	1,088	24.6	158	3.6	35	0.8	615	15.4	2,694	67.3	543	13.6	125	3.1	24	0.6
白川村	<20	—	106	47.1	93	41.3	—	—	<20	—	<20	—	141	67.8	40	19.2	<20	—	<20	—

※「匿名医療保険等関連情報データベース（NDB）の利用に関するガイドライン第3版」（令和5年10月 厚生労働省保険局）に従い、該当者数が20人未満の集計単位とならないよう、予備群該当と基準該当の合計値を表示しています。

(2) 生活習慣病重症化予防のためのレセプトと特定健診の突合（市町村別）

1 高血圧症

※令和3年度 岐阜市（総数）

（高血圧症）

人口		軽 症		→ 重 症		
※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中		脳血管疾患		
318007 人		70787 人 (22.3)		5540 人 (7.8)		
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a
20代以下	99441	20代以下	792	0.8	28	3.5
30代	37806	30代	1472	3.9	52	3.5
40代	53593	40代	6397	11.9	308	4.8
50代	51861	50代	16228	31.3	953	5.9
60代	46582	60代	24828	53.3	1857	7.5
70～74歳	28724	70～74歳	21070	73.4	2342	11.1
再掲	180760	再掲	68523	37.9	5460	8
40～74歳(Y)		40～74歳(g)			14319	20.9
レセプト		gのうち特定健診未受診の者(h)		虚血性心疾患		
		39464 人 (57.6 (h/g))		14611 人 (20.6)		
				患者数(c)	c/a	
				91	11.5	
				201	13.7	
				943	14.7	
				2769	17.1	
				5197	20.9	
				5410	25.7	
				患者数(d)	d/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(e)	e/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(f)	f/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(g)	g/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(h)	h/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(i)	i/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(j)	j/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(k)	k/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(l)	l/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(m)	m/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(n)	n/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(o)	o/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(p)	p/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(q)	q/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(r)	r/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(s)	s/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(t)	t/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(u)	u/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(v)	v/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(w)	w/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(x)	x/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(y)	y/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(z)	z/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(aa)	aa/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ab)	ab/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ac)	ac/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ad)	ad/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ae)	ae/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(af)	af/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ag)	ag/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ah)	ah/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ai)	ai/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(aj)	aj/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ak)	ak/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(al)	al/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(am)	am/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(an)	an/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ao)	ao/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ap)	ap/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(aq)	aq/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(ar)	ar/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	
				205	1.26	
				325	1.31	
				278	1.32	
				人工透析	- (-)	
				患者数(as)	as/a	
				<10	-	
				16	1.09	
				52	0.81	

(高血压)

-132-

-134-

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

27780 人

年代別	人数(T)
20代以下	8978
30代	3066
40代	4734
50代	3963
60代	4302
70～74歳	2737

再掲
40～74歳(Y)

15736

軽 症

高血圧症治療中

3340 人
(12)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	12	0.1
30代	55	1.8
40代	279	5.9
50代	693	17.5
60代	1131	26.3
70～74歳	1170	42.7

再掲
40～74歳(g)

3273 20.8

gのうち特定健診未受診の者(h)

1706 人 (52.1 (h/g))

再掲
40～74歳(Y)

15736

レセプト

虚血性心疾患

-
(-)

患者数(b)	b/a
0	-
0	-
<10	-
22	3.2
54	4.8
94	8

-

脳血管疾患

-
(-)

患者数(b)	b/a
0	-
0	-
<10	-
22	3.2
54	4.8
94	8

-

虚血性心疾患

-
(-)

患者数(c)	c/a
<10	-
<10	-
19	6.8
52	7.5
94	8.3
134	11.5

299 9.1

人工透析

<10
(-)

患者数(d)	d/a
0	-
0	-
0	-
<10	-

<10

特定健診

※40～74歳

特定健診受診者(e)

8402人
(53.4)

高血圧症(f)

140/90以上
(f/e)

1618人
(19.3)

※上記「f高血圧症」に
内服治療中の
140/90未満は含まない

その他のリスク

血圧分類	肥満	高血糖	脂質異常症
I度	BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
II度	252 (44%)	100 (17%)	400 (69%)
III度	70 (43%)	31 (19%)	122 (76%)
	28 (64%)	<10 (-)	33 (75%)

再掲
40～74歳

臓器障害

詳細健診実施者(m)	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
3825 (46%)	586 (7%)	3825 (46%)	3825 (46%)

検査実施者(n)
365 (47%)
782 (100%)

検査実施者(o)
140 (18%)
51 (7%)

検査実施者(p)
449 (54%)
827～835 (-)

検査実施者(q)
127 (15%)
28 (3%)

注：％を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して求めた値

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類
2以上の結果を所見有とした

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie,いずれかの分類
2以上の結果を所見者とした

人口				軽 症		重 症			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				高血圧症治療中		脳血管疾患		虚血性心疾患	
22557 人				3588 人 (15.9)		-		-	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	年代別	患者数(b)	割合(b/a)	患者数(c)	c/a	患者数(d)
20代以下	8030	21	0.3	20代以下	0	-	<10	-	<10
30代	3464	79	2.3	30代	<10	-	<10	-	0
40代	3933	415	10.6	40代	23	5.5	55	13.3	0
50代	3092	975	31.5	50代	44	4.5	113	11.6	<10
60代	2497	1177	47.1	60代	68	5.8	189	16.1	<10
70～74歳	1541	921	59.8	70～74歳	92	10	204	22.1	<10
再掲 40～74歳(Y)	11063	再掲 40～74歳(Z)	3488	31.5	227	6.5	561	16.1	<10

注意: レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診受診者(e)
(e/y)

5788人
(52.3)

高血圧症(f)
140/90以上
(f/e)

1312人
(22.7)

※上記「高血圧症」に
内服治療中の
140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)質問票服薬有(セプト有)

1445 人 (25 (i/e))

分類	人数	k内での割合
I 度	397	68
II 度	148	26
III 度	35	6

その他のリスク

血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c 6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
I 度	162 (41%)	64 (16%)	267 (67%)
II 度	69 (47%)	28 (19%)	101 (88%)
III 度	20 (57%)	<10 (-)	25 (71%)

臓器障害

	眼底検査有所見者 (m/e)	聴能検査有所見者 心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
詳細健診実施者	425 (7%)	3119 (54%)	
検査実施者(n)	23 (4%)	305 (53%)	571~579 (-)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	10 (2%)	137 (24%)	64 (11%)

高血圧症治療中(i)質問票服薬有(セプト有)

1445 人 (25 (i/e))

分類	人数	k内での割合
I 度	571	78
II 度	132	18
III 度	29	4

臓器障害

	眼底検査有所見者 (p/q)	聴能検査有所見者 心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
検査実施者	48 (7%)	406 (55%)	723~731 (-)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (-)	130 (18%)	34 (5%)

注: %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類
2以上の結果を所見有とした

レポート

人口		軽 症		重 症						
※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中		脳血管疾患						
15818 人		－ (－)		－ (－)						
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a
20代以下	5306	20代以下	<20	－	<20	－	<20	－	0	－
30代	2077	30代	96	4.6	<20	－	<20	－	0	－
40代	2799	40代	338	12.1	<20	－	21	6.2	0	－
50代	2401	50代	746	31.1	24	3.2	80	10.7	<20	－
60代	2048	60代	1047	51.1	51	4.9	170	16.2	0	－
70～74歳	1187	70～74歳	862	72.6	70	8.1	185	21.5	0	－
再掲 40～74歳(Y)	8435	再掲 40～74歳(Y)	2993	35.5	－	－	456	15.2	<20	－

注意: レサプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診
受診者(e)
(e/y)

4177人
(49.5)

高血圧症(f)
140/90以上
(f/e)

-
(-)

高血圧症治療中(k)

-

高血圧症治療中(i)質問票服薬有 レセプト有)

1116 人 (26.7 (i/e))

分類

人数

k内での割合

治療中

I 度

297

72

II 度

102

-

III 度

<20

-

未治療(l)

I 度

384

79

II 度

80

16

III 度

22

5

分類

人数

i内での割合

※上記「f」高血圧症」に
内服治療中の
140/90未満は含まない

その他のリスク

血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c 6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
I 度	141 (47%)	47 (16%)	197 (66%)
II 度	41 (40%)	<20 (-)	82 (80%)
III 度	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)

臓器障害

	眼底検査有所見者 (m/e)	脚底検査有所見者 (9%)	心電図結果有所見者 尿蛋白(+以上)
	2058 (49%)	379 (9%)	2058 (49%)

特定健診
※40歳

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類
2以上の結果を所見有とした

人口		軽 症		重 症	
※令和2年国勢調査人口等基本集計					
133848 人		高血圧症治療中		脳血管疾患	
		28500 人 (21.3)		虚血性心疾患	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(c)	c/a
20代以下	43137	310	0.7	39	12.6
30代	17456	683	3.9	107	15.7
40代	22764	2691	11.8	400	14.9
50代	20614	6291	30.5	1164	18.5
60代	18841	10065	53.4	2339	23.2
70～74歳	11036	8460	76.7	2487	29.4
再掲 40～74歳(Y)	73255	再掲 40～74歳(g)	27507	再掲 40～74歳(h)	6390
				人工透析	
				患者数(d)	d/a
				＜10	－
				12	1.76
				26	0.97
				97	1.54
				110	1.09
				115	1.36
				348	1.27

注意: レサプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

高血圧症治療中(①質問票服薬有 レセプト有)			
9601人 (26 (i/e))			
分類	人数	k内での割合	
I度	2747	72	
II度	855	22	
III度	224	6	
治療中(k)			
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)			
8499人 (23)			
特定健診受診者(e) (e/y)			
36942人 (50.4)			
※上記「f」高血圧症に内服治療中の140/90未満は含まない			
未治療	3643	78	
II度治療(l)	835	18	
III度	195	4	
分類	人数	i内での割合	

その他のリスク			
血圧分類	肥満BMI25以上	高血糖HbA1c 6.5以上空腹時126以上	脂質異常症LDL120以上HDL40未満TG150以上
I度	1255 (46%)	506 (18%)	1738 (63%)
II度	409 (48%)	133 (16%)	598 (70%)
III度	104 (46%)	28 (13%)	168 (75%)
I度	1332 (37%)	306 (8%)	2629 (72%)
II度	385 (46%)	83 (10%)	614 (74%)
III度	102 (52%)	22 (11%)	163 (84%)

その他のリスク			
血圧分類	肥満BMI25以上	高血糖HbA1c 6.5以上空腹時126以上	脂質異常症LDL120以上HDL40未満TG150以上
I度	1255 (46%)	506 (18%)	1738 (63%)
II度	409 (48%)	133 (16%)	598 (70%)
III度	104 (46%)	28 (13%)	168 (75%)
I度	1332 (37%)	306 (8%)	2629 (72%)
II度	385 (46%)	83 (10%)	614 (74%)
III度	102 (52%)	22 (11%)	163 (84%)

臓器障害			
	眼底検査有所見者(m/e)	心電図結果有所見者(n/e)	尿蛋白(+以上)原蛋白(+以上)
	3451 (9%)	17430 (47%)	
検査実施者(n)	372 (10%)	2022 (53%)	3816 (100%)
有所見者(o)	129 (3%)	940 (25%)	347 (9%)
有所見率(o/k)			
検査実施者(p)	460 (10%)	2497 (53%)	4664~4672 (-)
有所見者(q)	86 (2%)	1020 (22%)	172 (4%)
有所見率(q/l)			

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類2以上の結果を所見有とした

人口		軽 症		重 症	
※令和2年国勢調査人口調査本集計		高血圧症治療中		脳血管疾患	
27349 人		5017 人 (18.3)		虚血性心疾患	
人工透析		患者数(a) 割合(a/T)		患者数(c) c/a	
年次別		患者数(b) b/a		患者数(d) d/a	
20代以下		0		0	
30代		<10		<10	
40代		<10		<10	
50代		22		38	
60代		90		124	
70～74歳		117		315	
再掲		再掲		再掲	
17054		4948		825	
40～74歳(Y)		29		16.7	
0.44					

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

高血圧症治療中(i)質問票調査票有 (セプト有)				その他のリスク				臓器障害			
2595 人 (31.9 (i/e))				血圧分類				詳細健診実施者(m)			
				肥満				眼底検査有所見者			
				BMI				心電図結果有所見者			
				25以上				眼底検査有所見者			
				I度				LDL120以上			
				II度				HDL40未満			
				III度				TG150以上			
				I度				HbA1c6.5以上			
				II度				空腹時126以上			
				III度				13 (24%)			
				I度				68 (8%)			
				II度				11 (6%)			
				III度				<10 (-)			
				I度				313 (38%)			
				II度				78 (44%)			
				III度				21 (40%)			
				I度				598 (72%)			
				II度				130 (73%)			
				III度				37 (71%)			
				I度				606 (57%)			
				II度				230 (22%)			
				III度				42 (4%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			
				II度				86 (8%)			
				III度				1009~1017 (-)			
				I度				70 (7%)			
				II度				26 (3%)			
				III度				262 (26%)			
				I度				599 (59%)			
				II度				262 (26%)			
				III度				26 (3%)			
				I度				78 (7%)			
				II度				20 (2%)			
				III度				230 (22%)			
				I度				1055~1063 (-)			

-142-

人口調査人口調査基本集計				軽 症		→ 重 症	
5198 人				高血圧症治療中		脳血管疾患	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	虚血性心疾患		人工透析	
20代以下	1337	<20	-	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a
30代	500	28	5.6	0	-	0	-
40代	744	120	16.1	0	-	<20	-
50代	861	306	35.5	<20	-	<20	-
60代	1061	633	59.7	<20	-	38	12.4
70～74歳	695	547	78.7	26	4.1	50	7.9
				61	11.2	95	17.4
再掲	3361	再掲	1606	99	6.2	-	-
40～74歳(Y)		40～74歳(g)	47.8			<20	-

レセプト		gのうち特定健診未受診の者(h)	
		1060 人 (66 (h/g))	

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

高血圧症治療中(i)質問票回答者(レセプト有)			
474 人 (29.1 (i/e))			
分類	人数	k内での割合	
I 度	102	76	
II 度	26	-	
III 度	<20	-	
未治療中(k)			
I 度	149	83	
II 度	21	-	
III 度	<20	-	
分類	人数	I 内での割合	

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症(f)140/90以上(f/e)			
314 人 (19.3)			
特定健診受診者(e)	人数	割合	
1627 人 (48.4)			
314 人 (19.3)			

その他のリスク			
血圧分類	肥満	高血糖	脂質異常症
I 度	BMI 25以上	HbA1c6.5以上	LDL120以上
II 度	47 (46%)	21 (21%)	HDL40未満
III 度	<20 (-)	<20 (-)	TG150以上
	<20 (-)	<20 (-)	68 (67%)
	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
	50 (34%)	<20 (-)	110 (74%)
	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)

臓器障害			
詳細健診実施者(m)	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
694 (43%)	181 (11%)	694 (43%)	-
検査実施者(n)	30 (22%)	84 (62%)	-
実施率(n/k)	<20 (-)	41 (30%)	<20 (-)
有所見者(o)	39 (22%)	111 (82%)	-
有所見率(o/k)	<20 (-)	57 (32%)	<20 (-)
検査実施者(p)	39 (22%)	111 (82%)	-
実施率(p/l)	<20 (-)	57 (32%)	<20 (-)
有所見者(q)	39 (22%)	111 (82%)	-
有所見率(q/l)	<20 (-)	57 (32%)	<20 (-)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie,いずれかの分類2以上の結果を所見者とした

※令和3年度 神戸市(総数)

(高血圧症)

人口			軽 症			重 症								
※ 令和2年度国勢調査人口等基本集計			高血圧症治療中			脳血管疾患			虚血性心疾患			人工透析		
15550 人			(-)			(-)			(-)			(-)		
年代別	人数(T)		年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a	患者数(d)	d/a			
20代以下	4742		20代以下	<20	-	<20	-	0	-	0	-			
30代	1737		30代	26	1.5	0	-	<20	-	<20	-			
40代	2709		40代	175	6.5	<20	-	<20	-	<20	-			
50代	2241		50代	380	17	<20	-	35	9.2	<20	-			
60代	2452		60代	836	34.1	45	5.4	74	8.9	<20	-			
70～74歳	1669		70～74歳	774	46.4	65	8.4	104	13.4	<20	-			
再掲	9071		再掲	2165	23.9	125	5.8	-	-	36	1.66			
40～74歳(Y)			40～74歳(g)											
レセプト			gのうち特定健診未受診の者(h)											
			1104 人 (51 (h/g))											

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40～74 歳				その他のリスク				臓器障害							
高血圧症治療中 (i) 質問票/尿薬有 レセプト有)				血 圧 分 類				脳虚性心疾患				人工透析			
1628 人 (29.9 (i/e))				I 度				LDL170以上				(-)			
分類 人数				II 度				HbA1c6.5以上				(-)			
I 度 433				III 度				空腹時126以上				(-)			
II 度 132								HDL40未満				(-)			
III 度 <20								TG150以上				(-)			
高血圧症(f)				I 度				BMI				(-)			
140/90以上				II 度				25以上				(-)			
(f/e)				III 度				173 (40%)				(-)			
1233人								72 (17%)				(-)			
(22.6)								56 (42%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								<20 (-)				(-)			
								179 (34%)				(-)			
								33 (6%)				(-)			
								51 (46%)				(-)			
								<20 (-)				(-)			

※令和3年度 輸之内町(総数)

(高血圧症)

軽 症

重 症

人口
※令和2年国勢調査人口等基本集計

8415 人

年代別	人数(T)
20代以下	2803
30代	1117
40代	1467
50代	1093
60代	1257
70～74歳	678

再掲
40～74歳(Y)

4495

高血圧症治療中

(-)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	-
30代	26	2.3
40代	74	5
50代	232	21.2
60代	474	37.7
70～74歳	405	59.7

再掲
40～74歳(g)

1185

26.4

脳血管疾患

(-)

患者数(b)	b/a
<20	-
0	-
<20	-
<20	-
<20	-
23	4.9
39	9.6

再掲
40～74歳(Y)

73

6.2

虚血性心疾患

(-)

患者数(c)	c/a
<20	-
<20	-
<20	-
21	9.1
98	20.7
109	26.9

再掲
40～74歳(Y)

-

-

人工透析

(-)

患者数(d)	d/a
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-

再掲
40～74歳(Y)

-

-

レセプト

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

gのうち特定健診未受診の者(h)

615 人 (51.9 (h/g))

特定健診

※40～74歳

特定健診受診者(e)

2485人 (55.3)

高血圧症(f)

140/90以上 (f/e)

645人 (26)

その他のリスク

血圧分類	肥満	高血糖	脂質異常症
I 度	BMI 25以上	HbA1c6.5以上	LDL120以上
II 度	112 (45%)	41 (16%)	HDL40未満
III 度	41 (48%)	<20 (-)	TG150以上
	<20 (-)	<20 (-)	159 (64%)
	<20 (-)	<20 (-)	58 (67%)
			<20 (-)
I 度	89 (39%)	24 (10%)	158 (68%)
II 度	24 (44%)	<20 (-)	35～53 (-)
III 度	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)

臓器障害

詳細健診実施者(m)	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
検査実施者(n)	<20 (-)	231 (66%)	-
実施率(n/k)	<20 (-)	93 (27%)	25 (7%)
検査実施者(o)	<20 (-)	190 (84%)	-
実施率(o/l)	<20 (-)	48 (16%)	<20 (-)
検査実施者(p)	<20 (-)	190 (84%)	-
実施率(p/l)	<20 (-)	48 (16%)	<20 (-)
検査実施者(q)	<20 (-)	190 (84%)	-
実施率(q/l)	<20 (-)	48 (16%)	<20 (-)

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie,いずれかの分類2以上の結果を所見者とした
※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

-147-

軽 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

15579 人

年代別

人数(T)

20代以下

4266

30代

1510

40代

2381

50代

2422

60代

3073

70～74歳

1927

再掲

40～74歳(Y)

9803

人工透析

患者数(d)

0

<20

<20

<20

<20

<20

<20

27

虚血性心疾患

患者数(c)

0

<20

<20

36

117

294

441

脳血管疾患

患者数(b)

<20

<20

<20

38

78

135

脂質異常症

HbA1c6.5以上

25以上

260 (47%)

65 (42%)

<20 (-)

高血圧症治療中

患者数(a)

<20

45

312

825

1548

1584

割合(a/T)

-

3

13.1

34.1

50.4

82.2

再掲

40～74歳(g)

4269

43.5

再掲

40～74歳(Y)

9803

重 症

人工透析

患者数(d)

0

<20

<20

<20

<20

<20

<20

27

虚血性心疾患

患者数(c)

0

<20

<20

36

117

294

441

脳血管疾患

患者数(b)

<20

<20

<20

38

78

135

脂質異常症

HbA1c6.5以上

25以上

260 (47%)

65 (42%)

<20 (-)

高血圧症治療中

患者数(a)

<20

45

312

825

1548

1584

割合(a/T)

-

3

13.1

34.1

50.4

82.2

再掲

40～74歳(g)

4269

43.5

再掲

40～74歳(Y)

9803

レセプト

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※40～74歳

特定健診受診者(e)

5210人 (53.1)

高血圧症(f)

140/90以上 (f/e)

1433人 (27.5)

※上記「f:高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

その他のリスク

血圧分類

肥満

BMI

25以上

260 (47%)

65 (42%)

<20 (-)

脂質異常症

LDL120以上

HDL40未満

TG150以上

340 (61%)

83 (54%)

21～39 (-)

高血圧症治療中(i):質問票調査有 (レセプト有)

1771 人 (34 (j/e))

分類

人数

k内での割合

I 度

559

74

II 度

155

21

III 度

40

5

臓器障害

眼底検査有所見者

256 (5%)

詳細健診実施者(m)

2764 (53%)

尿蛋白(>以上)

2764 (53%)

検査実施者(n)

38 (5%)

392 (52%)

735～753 (-)

有所見者(o)

<20 (-)

155 (21%)

71 (9%)

有所見率(o/k)

<20 (-)

21%

9%

検査実施者(p)

36 (5%)

392 (58%)

660～678 (-)

実施率(p/l)

<20 (-)

101 (15%)

25 (4%)

有所見者(q)

<20 (-)

101 (15%)

25 (4%)

有所見率(q/l)

<20 (-)

15%

4%

眼底検査についてはWong-Mitchell, Keith-Wagener, Scheieいずれかの分類2以上の結果を所見有とした

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

人口			軽 症			重 症		
※令和2年国勢調査人口等基本集計			人口			人口		
18751 人			18751 人			18751 人		
年代別	人数(T)		年代別	患者数(a)	割合(a/T)	年代別	患者数(b)	割合(b/a)
20代以下	5918		20代以下	<20	-	20代以下	0	-
30代	2015		30代	<20	-	30代	<20	-
40代	3136		40代	121	3.9	40代	<20	-
50代	2959		50代	345	11.7	50代	<20	-
60代	2931		60代	709	24.2	60代	22	3.1
70～74歳	1792		70～74歳	615	34.3	70～74歳	39	6.3
再掲	10818		再掲	1790	16.5	再掲	70	3.9
40～74歳(Y)			40～74歳(g)			40～74歳		
			gのうち特定健診未受診の者(h)					
			894 人 (49.9 (h/g))					

人口			軽 症			重 症		
※令和2年国勢調査人口等基本集計			高血圧症治療中			脳血管疾患		
19818 人			－ (－)			－ (－)		
年代別	人数(T)		年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	
20代以下	6437		20代以下	<20	－	0	－	
30代	2176		30代	26	1.2	0	－	
40代	3338		40代	152	4.6	<20	－	
50代	3044		50代	321	10.5	<20	－	
60代	2990		60代	609	20.4	26	4.3	
70～74歳	1833		70～74歳	497	27.1	57	11.5	
再掲	11205		再掲	1579	14.1	99	6.3	
40～74歳(Y)			40～74歳(g)					
レセプト			gのうち特定健診未受診の者(h)			注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。		
			1136 人 (71.9 (h/g))					

軽 症				重 症			
人口				脳血管疾患			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				虚血性心疾患			
15745 人				人工透析			
年代別	人数(T)	高血圧症治療中		患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a
20代以下	4320	患者数(a)	割合(a/T)	0	-	0	-
30代	1792	<20	-	0	-	0	-
40代	2328	35	2	<20	-	<20	-
50代	2404	187	8	<20	-	38	8.2
60代	3137	464	19.3	54	4.9	165	15
70～74歳	1764	1099	35	58	6	236	24.4
再掲	9633	969	54.9	127	4.7	-	-
40～74歳(Y)		2719	28.2				
レセプト				その他のリスク			
gのうち特定健診未受診の者(h)				血圧分類	肥満	高血糖	脂質異常症
1521 人 (55.9 (h/g))					BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
特定健診受診者(e) (e/Y)				I度	153 (37%)	61 (15%)	275 (67%)
4591人 (47.7)				II度	53 (39%)	<20 (-)	93 (69%)
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)				III度	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
- (-)				I度	143 (34%)	21 (5%)	329 (78%)
※上記「f高血圧症」に 内服治療中の 140/90未満は含まない				II度	44 (44%)	<20 (-)	78 (78%)
特定健診受診者(e) (e/Y)				III度	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
4591人 (47.7)				分類	人数	k内での割合	
高血圧症治療中(k)				I度	409	73	
未治療(l)				II度	135	24	
424人 (47.7)				III度	20	4	
高血圧症治療中(l)				I度	424	78	
100人 (47.7)				II度	100	-	
III度				III度	<20	-	
分類				人数	I内での割合		
424人 (47.7)							
高血圧症治療中(m)							
404人 (9%)							
高血圧症治療中(n)							
69人 (12%)							
高血圧症治療中(o)							
44人 (8%)							
高血圧症治療中(p)							
57人 (10%)							
高血圧症治療中(q)							
22人 (4%)							
高血圧症治療中(r)							
35人 (6%)							
高血圧症治療中(s)							
184人 (33%)							
高血圧症治療中(t)							
386人 (68%)							
高血圧症治療中(u)							
545～563人 (96%)							
高血圧症治療中(v)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(w)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(x)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(y)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(z)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(aa)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(ab)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(ac)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(ad)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(ae)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(af)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(ag)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(ah)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(ai)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(aj)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(ak)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(al)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(am)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(an)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(ao)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(ap)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(aq)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(ar)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(as)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(at)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(au)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(av)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(aw)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(ax)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(ay)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(az)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(ba)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(bb)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(bc)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(bd)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(be)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(bf)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(bg)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(bh)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(bi)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(bj)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(bk)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(bl)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(bm)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(bn)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(bo)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(bp)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(bq)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(br)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(bs)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(bt)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(bu)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(bv)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(bw)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(bx)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(by)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(bz)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(ca)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(cb)							
133人 (24%)							
高血圧症治療中(cc)							
<20人 (4%)							
高血圧症治療中(cd)							
356人 (66%)							
高血圧症治療中(ce)							
133人 (24%)							

人口				軽 症		重 症	
※令和2年国勢調査人口等基本集計							
30848 人				高血圧症治療中			
5546 人 (18)							
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	脳血管疾患		
20代以下	8153	20代以下	16	0.2	虚血性心疾患		
30代	3442	30代	44	1.3	人工透析		
40代	4652	40代	341	7.3	患者数(d)		
50代	5130	50代	1108	21.6	患者数(c)		
60代	6193	60代	2215	35.8	患者数(b)		
70～74歳	3278	70～74歳	1822	55.6	患者数(a)		
再掲 40～74歳(Y)	19253	再掲 40～74歳(Y)	5486	28.5	患者数		
					b/a		
					c/a		
					d/a		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		

注意: レサプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 40歳以上74歳未満

※上記「f」高血圧症に内服治療中の140/90未満は含まない

特定健診受診者(e/y)	11984人 (62.2)	高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)	2526人 (21.1)	高血圧症治療中(k)	49人	3504人 (29.2 (i/e))	高血圧症治療中(i)質問票服薬有 (セザン有)
分類	人数	k内での割合	人数	人数	人数	人数	人数
I度	937	75	1005	79	1005	79	79
II度	266	21	231	18	231	18	18
III度	49	4	38	3	38	3	3
分類	人数	i内での割合	人数	人数	人数	人数	人数
I度	1005	79	1005	79	1005	79	79
II度	231	18	231	18	231	18	18
III度	38	3	38	3	38	3	3
分類	人数	i内での割合	人数	人数	人数	人数	人数
I度	1005	79	1005	79	1005	79	79
II度	231	18	231	18	231	18	18
III度	38	3	38	3	38	3	3

その他のリスク

血圧分類	肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c 6.5以上 空腹時126以上	脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
I度	398 (42%)	151 (16%)	583 (82%)
II度	114 (43%)	44 (17%)	185 (70%)
III度	24 (49%)	10 (20%)	40~48 (-)

臓器障害

詳細健診実施者(m) (m/e)	眼底検査有所見者 1124 (9%)	心電図結果有所見者 5400 (45%)	尿蛋白(μ以上) 1243~1251 (-)
検査実施者(n) 実施率(n/k)	169 (13%)	582 (46%)	1243~1251 (-)
有所見者(o) 有所見率(o/k)	31 (2%)	292 (23%)	97 (8%)
検査実施者(p) 実施率(p/l)	371 (29%)	819 (84%)	1265~1273 (-)
有所見者(q) 有所見率(q/l)	50 (4%)	359 (28%)	34 (3%)

注: %を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類
2以上の結果を所見有とした

※令和3年度 坂祝町(総数)

(高血圧症)

軽 症				重 症			
人口				脳血管疾患			
※令和2年国勢調査人口等集本集計				虚血性心疾患			
6940 人				人工透析			
年代別	人数(T)	高血圧症治療中		患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a
20代以下	2219	患者数(a)	割合(a/T)	0	-	<20	-
30代	925	<20	-	0	-	0	-
40代	1079	39	3.6	0	-	<20	-
50代	970	143	14.7	<20	-	<20	-
60代	1129	273	24.2	20	7.3	31	11.4
70～74歳	618	198	32	<20	-	23	11.6
再掲	3796	再掲	653	-	-	71	10.9
40～74歳(Y)		40～74歳(g)	17.2	-	-	-	-

レセプト		gのうち特定健診未受診の者(h)	
		336 人 (51.5 (h/g))	

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

高血圧症治療中(i)質問票、服薬有（レセプト有）			
570 人 (29.1 (i/e))			
分類	人数	k内での割合	
I 度	167	74	
II 度	50	-	
III 度	<20	-	
未治療中(k)			
I 度	186	75	
II 度	46	-	
III 度	<20	-	
分類	人数	I 内での割合	

※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない

特定健診受診者(e)		高血圧症(f)	
1957人 (51.6)		475人 (24.3)	
(e/Y)		(f/e)	

その他のリスク			
血圧分類	肥満	高血糖	脂質異常症
I 度	BMI 25以上	HbA1c6.5以上	LDL120以上
II 度	70 (42%)	26 (16%)	HDL40未満
III 度	20 (40%)	<20 (-)	TG150以上
	<20 (-)	<20 (-)	110 (66%)
	<20 (-)	<20 (-)	31～49 (-)
	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
I 度	71 (38%)	<20 (-)	127 (68%)
II 度	20 (43%)	<20 (-)	27～45 (-)
III 度	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)

臓器障害			
詳細健診実施者(m)	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
155 (68%)	56 (25%)	940 (48%)	-
検査実施者(n)	56 (25%)	155 (68%)	-
有所見者(o)	<20 (-)	64 (28%)	25 (11%)
有所見率(o/k)	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
検査実施者(p)	51 (21%)	170 (69%)	-
有所見者(q)	<20 (-)	58 (23%)	<20 (-)
有所見率(q/l)	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie,いずれかの分類2以上の結果を所見者とした

人口				軽 症		重 症		
※令和2年国勢調査人口等基本集計				高血圧症治療中		人工透析		
4678 人				- (-)		- (-)		
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	年代別	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a
20代以下	1444	0	-	20代以下	0	-	0	-
30代	634	<20	-	30代	0	-	<20	-
40代	726	21	2.9	40代	<20	-	<20	-
50代	625	51	8.2	50代	51	-	<20	-
60代	771	111	14.4	60代	111	-	20	18
70～74歳	478	118	24.7	70～74歳	118	-	23	19.5
再掲	2600	再掲	301	再掲	40～74歳(g)	11.6	48	15.9
40～74歳(Y)		gのうち特定健診未受診の者(h)		144 人 (47.8 (h/g))				-
レセプト				注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。				

特定健診 ※ 40～74 歳				その他のリスク				臓器障害						
高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)				高血圧症治療中(i)質問票、服薬有 (レセプト有)				眼底検査有所見者 心電図結果有所見者						
1435人 (55.2)				405 人 (28.2 (i/e))				詳細検査実施者(m) (m/e)						
特定健診 受診者(e) (e/Y)				分類	人数	k内での割合	肥満	BMI	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上	検査実施者(n) 実施率(n/k)	93 (67%)	34 (25%)	701 (49%)
267人 (18.6)				I 度	94	68	47 (50%)	<20 (-)	<20 (-)	60 (64%)	36 (26%)	0 (0%)	36 (26%)	36 (26%)
				II 度	32	-	<20 (-)	<20 (-)	13～31 (-)		0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
				III 度	<20	-	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)	81 (63%)	20 (16%)	81 (63%)	81 (63%)
				未 治 療 (l)	人数	I 度 II 度 III 度 分類	34 (33%) <20 (-) <20 (-) <20 (-)	<20 (-) <20 (-) <20 (-)	76 (73%) <20 (-) <20 (-)		33 (26%)	33 (26%)	33 (26%)	33 (26%)
											20 (16%)	0 (0%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	20 (16%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	0 (0%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
											0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
											20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)	20 (16%)
											81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)	81 (63%)
											36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)	36 (26%)
										</				

-158-

-159-

軽 症				重 症			
人口調査人口等基本集計				人工透析			
7975 人				虚血性心疾患			
高血圧症治療中				脳血管疾患			
患者数(a)				患者数(b)			
割合(a/T)				患者数(c)			
患者数(d)				患者数(e)			
患者数(f)				患者数(g)			
患者数(h)				患者数(i)			
患者数(j)				患者数(k)			
患者数(l)				患者数(m)			
患者数(n)				患者数(o)			
患者数(p)				患者数(q)			
患者数(r)				患者数(s)			
患者数(t)				患者数(u)			
患者数(v)				患者数(w)			
患者数(x)				患者数(y)			
患者数(z)				患者数(aa)			
患者数(ab)				患者数(ac)			
患者数(ad)				患者数(ae)			
患者数(af)				患者数(ag)			
患者数(ah)				患者数(ai)			
患者数(aj)				患者数(ak)			
患者数(al)				患者数(am)			
患者数(an)				患者数(ao)			
患者数(ap)				患者数(aq)			
患者数(ar)				患者数(as)			
患者数(at)				患者数(au)			
患者数(av)				患者数(aw)			
患者数(ax)				患者数(ay)			
患者数(az)				患者数(ba)			
患者数(cb)				患者数(bc)			
患者数(cd)				患者数(ce)			
患者数(cd)				患者数(cf)			
患者数(cd)				患者数(cg)			
患者数(cd)				患者数(ch)			
患者数(cd)				患者数(ci)			
患者数(cd)				患者数(cj)			
患者数(cd)				患者数(ck)			
患者数(cd)				患者数(cl)			
患者数(cd)				患者数(cm)			
患者数(cd)				患者数(cn)			
患者数(cd)				患者数(co)			
患者数(cd)				患者数(cp)			
患者数(cd)				患者数(cq)			
患者数(cd)				患者数(cr)			
患者数(cd)				患者数(cs)			
患者数(cd)				患者数(ct)			
患者数(cd)				患者数(cu)			
患者数(cd)				患者数(cv)			
患者数(cd)				患者数(cw)			
患者数(cd)				患者数(cx)			
患者数(cd)				患者数(cy)			
患者数(cd)				患者数(cz)			
患者数(cd)				患者数(da)			
患者数(cd)				患者数(db)			
患者数(cd)				患者数(dc)			
患者数(cd)				患者数(de)			
患者数(cd)				患者数(df)			
患者数(cd)				患者数(dg)			
患者数(cd)				患者数(dh)			
患者数(cd)				患者数(di)			
患者数(cd)				患者数(dj)			
患者数(cd)				患者数(dk)			
患者数(cd)				患者数(dl)			
患者数(cd)				患者数(dm)			
患者数(cd)				患者数(dn)			
患者数(cd)				患者数(do)			
患者数(cd)				患者数(dp)			
患者数(cd)				患者数(dq)			
患者数(cd)				患者数(dr)			
患者数(cd)				患者数(ds)			
患者数(cd)				患者数(dt)			
患者数(cd)				患者数(du)			
患者数(cd)				患者数(dv)			
患者数(cd)				患者数(dw)			
患者数(cd)				患者数(dx)			
患者数(cd)				患者数(dy)			
患者数(cd)				患者数(dz)			
患者数(cd)				患者数(ea)			
患者数(cd)				患者数(eb)			
患者数(cd)				患者数(ec)			
患者数(cd)				患者数(ed)			
患者数(cd)				患者数(ef)			
患者数(cd)				患者数(eg)			
患者数(cd)				患者数(eh)			
患者数(cd)				患者数(ei)			
患者数(cd)				患者数(ej)			
患者数(cd)				患者数(ek)			
患者数(cd)				患者数(el)			
患者数(cd)				患者数(em)			
患者数(cd)				患者数(en)			
患者数(cd)				患者数(eo)			
患者数(cd)				患者数(ep)			
患者数(cd)				患者数(eq)			
患者数(cd)				患者数(er)			
患者数(cd)				患者数(es)			
患者数(cd)				患者数(et)			
患者数(cd)				患者数(eu)			
患者数(cd)				患者数(ev)			
患者数(cd)				患者数(ew)			
患者数(cd)				患者数(ex)			
患者数(cd)				患者数(ey)			
患者数(cd)				患者数(ez)			
患者数(cd)				患者数(fa)			
患者数(cd)				患者数(fb)			
患者数(cd)				患者数(fc)			
患者数(cd)				患者数(fd)			
患者数(cd)				患者数(fe)			
患者数(cd)				患者数(ff)			
患者数(cd)				患者数(fg)			
患者数(cd)				患者数(fh)			
患者数(cd)				患者数(fi)			
患者数(cd)				患者数(fj)			
患者数(cd)				患者数(fk)			
患者数(cd)				患者数(fl)			
患者数(cd)				患者数(fm)			
患者数(cd)				患者数(fn)			
患者数(cd)				患者数(fo)			
患者数(cd)				患者数(fp)			
患者数(cd)				患者数(fq)			
患者数(cd)				患者数(fr)			
患者数(cd)				患者数(fs)			
患者数(cd)				患者数(ft)			
患者数(cd)				患者数(fu)			
患者数(cd)				患者数(fv)			
患者数(cd)				患者数(fw)			
患者数(cd)				患者数(fx)			
患者数(cd)				患者数(fy)			
患者数(cd)				患者数(fz)			
患者数(cd)				患者数(ga)			
患者数(cd)				患者数(gb)			
患者数(cd)				患者数(gc)			
患者数(cd)				患者数(gd)			
患者数(cd)				患者数(ge)			
患者数(cd)				患者数(gf)			
患者数(cd)				患者数(gg)			
患者数(cd)				患者数(gh)			
患者数(cd)				患者数(gi)			
患者数(cd)				患者数(gj)			
患者数(cd)				患者数(gk)			
患者数(cd)				患者数(gl)			
患者数(cd)				患者数(gm)			
患者数(cd)				患者数(gn)			
患者数(cd)				患者数(go)			
患者数(cd)				患者数(gp)			
患者数(cd)				患者数(gq)			
患者数(cd)				患者数(gr)			
患者数(cd)				患者数(gs)			
患者数(cd)				患者数(gt)			
患者数(cd)				患者数(gu)			
患者数(cd)				患者数(gv)			
患者数(cd)				患者数(gw)			
患者数(cd)				患者数(gx)			
患者数(cd)				患者数(gy)			
患者数(cd)				患者数(gz)			
患者数(cd)				患者数(ha)			
患者数(cd)				患者数(hb)			
患者数(cd)				患者数(hc)			
患者数(cd)				患者数(hd)			
患者数(cd)				患者数(he)			
患者数(cd)				患者数(hf)			
患者数(cd)				患者数(hg)			
患者数(cd)				患者数(hh)			
患者数(cd)				患者数(hi)			
患者数(cd)				患者数(hj)			
患者数(cd)				患者数(hk)			
患者数(cd)				患者数(hl)			
患者数(cd)				患者数(hm)			
患者数(cd)				患者数(hn)			
患者数(cd)				患者数(ho)			
患者数(cd)				患者数(hp)			
患者数(cd)				患者数(hq)			
患者数(cd)				患者数(hr)			
患者数(cd)				患者数(hs)			
患者数(cd)				患者数(ht)			
患者数(cd)				患者数(hu)			
患者数(cd)				患者数(hv)			
患者数(cd)				患者数(hw)			
患者数(cd)				患者数(hx)			
患者数(cd)				患者数(hy)			
患者数(cd)				患者数(hz)			
患者数(cd)				患者数(ia)			
患者数(cd)				患者数(ib)			
患者数(cd)				患者数(ic)			
患者数(cd)				患者数(id)			
患者数(cd)				患者数(ie)			
患者数(cd)				患者数(if)			
患者数(cd)				患者数(ig)			
患者数(cd)				患者数(ih)			
患者数(cd)				患者数(ii)			
患者数(cd)				患者数(ij)			
患者数(cd)				患者数(ik)			
患者数(cd)				患者数(il)			
患者数(cd)				患者数(im)			
患者数(cd)				患者数(in)			
患者数(cd)				患者数(io)			
患者数(cd)				患者数(ip)			
患者数(cd)				患者数(iq)			
患者数(cd)				患者数(ir)			
患者数(cd)				患者数(is)			
患者数(cd)				患者数(it)			
患者数(cd)				患者数(iu)			
患者数(cd)				患者数(iv)			
患者数(cd)				患者数(iw)			
患者数(cd)				患者数(ix)			
患者数(cd)				患者数(iy)			
患者数(cd)				患者数(iz)			
患者数(cd)				患者数(ja)			
患者数(cd)				患者数(jb)			
患者数(cd)				患者数(jc)			
患者数(cd)				患者数(jd)			
患者数(cd)				患者数(je)			
患者数(cd)				患者数(jf)			
患者数(cd)				患者数(jg)			
患者数(cd)				患者数(jh)			
患者数(cd)				患者数(ji)			
患者数(cd)				患者数(jj)			
患者数(cd)				患者数(jk)			
患者数(cd)				患者数(jl)			
患者数(cd)				患者数(jm)			
患者数(cd)				患者数(jn)			
患者数(cd)				患者数(jo)			
患者数(cd)				患者数(jp)			
患者数(cd)				患者数(jq)			
患者数(cd)				患者数(jr)			
患者数(cd)				患者数(js)			
患者数(cd)				患者数(jt)			
患者数(cd)				患者数(ju)			
患者数(cd)				患者数(jv)			
患者数(cd)				患者数(jw)			
患者数(cd)				患者数(jx)			
患者数(cd)				患者数(jy)			
患者数(cd)				患者数(jz)			
患者数(cd)				患者数(ka)			
患者数(cd)				患者数(kb)			
患者数(cd)				患者数(kc)			
患者数(cd)				患者数(kd)			
患者数(cd)				患者数(ke)			
患者数(cd)				患者数(kf)			
患者数(cd)				患者数(kg)			
患者数(cd)				患者数(kh)			
患者数(cd)				患者数(ki)			
患者数(cd)				患者数(kj)			
患者数(cd)				患者数(kk)			
患者数(cd)				患者数(kl)			
患者数(cd)				患者数(km)			
患者数(cd)				患者数(kn)			
患者数(cd)				患者数(ko)			
患者数(cd)				患者数(kp)			
患者数(cd)				患者数(kq)			
患者数(cd)				患者数(kr)			
患者数(cd)				患者数(ks)			
患者数(cd)				患者数(kt)			
患者数(cd)				患者数(ku)			
患者数(cd)				患者数(kv)			
患者数(cd)				患者数(kw)			
患者数(cd)				患者数(kx)			
患者数(cd)				患者数(ky)			
患者数(cd)				患者数(kz)			
患者数(cd)				患者数(la)			
患者数(cd)				患者数(lb)			
患者数(cd)				患者数(lc)			
患者数(cd)				患者数(ld)			
患者数(cd)				患者数(le)			
患者数(cd)				患者数(lf)			
患者数(cd)				患者数(lg)			
患者数(cd)				患者数(lh)			
患者数(cd)				患者数(li)			
患者数(cd)				患者数(lj)			
患者数(cd)				患者数(lk)			
患者数(cd)				患者数(lm)			
患者数(cd)				患者数(ln)			
患者数(cd)				患者数(lo)			
患者数(cd)				患者数(lp)			
患者数(cd)				患者数(lq)			
患者数(cd)				患者数(lr)			
患者数(cd)				患者数(ls)			
患者数(cd)				患者数(lt)			
患者数(cd)				患者数(lu)			
患者数(cd)				患者数(lv)			
患者数(cd)				患者数(lw)			
患者数(cd)				患者数(lx)			
患者数(cd)				患者数(ly)			
患者数(cd)				患者数(lz)			
患者数(cd)				患者数(ma)			
患者数(cd)				患者数(mb)			
患者数(cd)				患者数(mc)			
患者数(cd)				患者数(md)			
患者数(cd)				患者数(me)			
患者数(cd)				患者数(mf)			
患者数(cd)				患者数(mg)			
患者数(cd)				患者数(mh)			
患者数(cd)				患者数(mi)			
患者数(cd)				患者数(mj)			
患者数(cd)				患者数(mk)			
患者数(cd)				患者数(ml)			
患者数(cd)				患者数(mn)			
患者数(cd)				患者数(mo)			
患者数(cd)				患者数(mp)			
患者数(cd)				患者数(mq)			
患者数(cd)				患者数(mr)			
患者数(cd)				患者数(ms)			
患者数(cd)				患者数(mt)			
患者数(cd)				患者数(mu)			
患者数(cd)				患者数(mv)			
患者数(cd)				患者数(mw)			
患者数(cd)				患者数(mx)			
患者数(cd)				患者数(my)			
患者数(cd)				患者数(mz)			
患者数(cd)				患者数(na)			
患者数(cd)				患者数(nb)			
患者数(cd)				患者数(nc)			
患者数(cd)				患者数(nd)			
患者数(cd)				患者数(ne)			
患者数(cd)				患者数(nf)			
患者数(cd)				患者数(ng)			
患者数(cd)				患者数(nh)			
患者数(cd)				患者数(ni)			
患者数(cd)				患者数(nj)			
患者数(cd)				患者数(nk)			
患者数(cd)				患者数(nl)			
患者数(cd)				患者数(nm)			
患者数(cd)				患者数(nn)			
患者数(cd)				患者数(no)			
患者数(cd)				患者数(np)			
患者数(cd)				患者数(nq)			
患者数(cd)				患者数(nr)			
患者数(cd)				患者数(ns)			
患者数(cd)				患者数(nt)			
患者数(cd)				患者数(nu)			
患者数(cd)				患者数(nv)			
患者数(cd)				患者数(nw)			
患者数(cd)				患者数(nx)			
患者数(cd)				患者数(ny)			
患者数(cd)				患者数(nz)			
患者数(cd)				患者数(oa)			
患者数(cd)				患者数(ob)			
患者数(cd)				患者数(oc)			
患者数(cd)				患者数(od)			
患者数(cd)				患者数(oe)			
患者数(cd)				患者数(of)			
患者数(cd)				患者数(og)			
患者数(cd)				患者数(oh)			
患者数(cd)				患者数(oi)			
患者数(cd)				患者数(oj)			
患者数(cd)				患者数(ok)			
患者数(cd)				患者数(ol)			
患者数(cd)				患者数(om)			
患者数(cd)				患者数(on)			
患者数(cd)				患者数(oo)			
患者数(cd)				患者数(op)			
患者数(cd)				患者数(oq)			
患者数(cd)				患者数(or)			
患者数(cd)				患者数(os)			
患者数(cd)				患者数(ot)			
患者数(cd)				患者数(ou)			
患者数(cd)				患者数(ov)			
患者数(cd)				患者数(ow)			
患者数(cd)				患者数(ox)			
患者数(cd)				患者数(oy)			
患者数(cd)				患者数(oz)			
患者数(cd)				患者数(pa)			
患者数(cd)				患者数(pb)			
患者数(cd)				患者数(pc)			
患者数(cd)				患者数(pd)			
患者数(cd)				患者数(pe)			
患者数(cd)				患者数(pf)			
患者数(cd)				患者数(pg)			
患者数(cd)				患者数(ph)			
患者数(cd)				患者数(pi)			
患者数(cd)				患者数(pj)			
患者数(cd)				患者数(pk)			
患者数(cd)				患者数(pl)			
患者数(cd)				患者数(pm)			
患者数(cd)				患者数(pn)			
患者数(cd)				患者数(po)			
患者数(cd)				患者数(pp)			
患者数(cd)				患者数(pq)			
患者数(cd)				患者数(pr)			
患者数(cd)				患者数(ps)			
患者数(cd)				患者数(pt)			
患者数(cd)				患者数(pu)			
患者数(cd)				患者数(pv)			
患者数(cd)				患者数(pw)			
患者数(cd)				患者数(px)			
患者数(cd)				患者数(py)			
患者数(cd)				患者数(pz)			
患者数(cd)				患者数(qa)			
患者数(cd)				患者数(qb)			
患者数(cd)				患者数(qc)			
患者数(cd)				患者数(qd)			
患者数(cd)				患者数(qe)			
患者数(cd)				患者数(qf)			
患者数(cd)				患者数(qg)			
患者数(cd)				患者数(qh)			
患者数(cd)				患者数(qi)			
患者数(cd)				患者数(qj)			
患者数(cd)				患者数(qk)			
患者数(cd)				患者数(ql)			
患者数(cd)				患者数(qm)			
患者数(cd)				患者数(qn)			
患者数(cd)				患者数(qo)			
患者数(cd)				患者数(qp)			
患者数(cd)				患者数(qq)			
患者数(cd)				患者数(qr)			
患者数(cd)				患者数(qs)			
患者数(cd)				患者数(qt)			
患者数(cd)				患者数(qu)			
患者数(cd)				患者数(qv)			
患者数(cd)				患者数(qw)			
患者数(cd)				患者数(qx)			
患者数(cd)				患者数(qy)			
患者数(cd)				患者数(qz)			
患者数(cd)				患者数(ra)			
患者数(cd)				患者数(rb)			
患者数(cd)				患者数(rc)			
患者数(cd)				患者数(rd)			
患者数(cd)				患者数(re)			
患者数(cd)				患者数(rf)			
患者数(cd)				患者数(rg)			
患者数(cd)				患者数(rh)			
患者数(cd)				患者数(ri)			
患者数(cd)				患者数(rj)			
患者数(cd)				患者数(rk)			
患者数(cd)				患者数(rl)			
患者数(cd)				患者数(rm)			
患者数(cd)				患者数(rn)			
患者数(cd)				患者数(ro)			
患者数(cd)				患者数(rp)			
患者数(cd)				患者数(rq)			
患者数(cd)				患者数(rr)			
患者数(cd)				患者数(rs)			
患者数(cd)				患者数(rt)			
患者数(cd)				患者数(ru)			
患者数(cd)				患者数(rv)			
患者数(cd)				患者数(rw)			
患者数(cd)				患者数(rx)			
患者数(cd)				患者数(ry)			
患者数(cd)				患者数(rz)			
患者数(cd)				患者数(sa)			
患者数(cd)				患者数(sb)			
患者数(cd)				患者数(sc)			
患者数(cd)				患者数(sd)			
患者数(cd)				患者数(se)			
患者数(cd)				患者数(sf)			
患者数(cd)				患者数(sg)			
患者数(cd)				患者数(sh)			
患者数(cd)				患者数(si)			
患者数(cd)				患者数(sj)			
患者数(cd)				患者数(sk)			
患者数(cd)				患者数(sl)			
患者数(cd)				患者数(sm)			
患者数(cd)				患者数(sn)			
患者数(cd)				患者数(so)			
患者数(cd)				患者数(sp)			
患者数(cd)				患者数(sq)			
患者数(cd)				患者数(sr)			
患者数(cd)				患者数(ss)			
患者数(cd)				患者数(st)			
患者数(cd)				患者数(su)			
患者数(cd)				患者数(sv)			
患者数(cd)				患者数(sw)			
患者数(cd)				患者数(sx)			
患者数(cd)				患者数(sy)			
患者数							

人口				軽 症		→ 重 症	
※令和2年国勢調査人口等基本集計				高血圧症治療中		脳血管疾患	
5389 人				(-)		(-)	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a
20代以下	1153	<20	-	0	-	0	-
30代	459	<20	-	0	-	0	-
40代	706	28	4	0	-	<20	-
50代	987	65	6.6	<20	-	<20	-
60代	1334	227	17	<20	-	24	10.6
70～74歳	750	223	29.7	<20	-	35	15.7
再掲	3777	再掲	543	再掲	-	67	12.3
40～74歳(Y)		40～74歳(g)	14.4		-	<20	-

レセプト		gのうち特定健診未受診の者(h)	
		311 人 (57.3 (h/g))	

特定健診		※40～74歳	
特定健診受診者(e)	高血圧症(f)	人数	k内での割合
1925人 (51)	140/90以上 (f/e)	137	67
	465人 (24.2)	54	-
	※上記「f高血圧症」に内服治療中の140/90未満は含まない	<20	-
		未治療(i)	81
		治療中(k)	39
		Ⅰ度	211
		Ⅱ度	39
		Ⅲ度	<20
		分類	Ⅰ内での割合

その他のリスク		脂質異常症	
血圧分類	肥満	BMI	LDL120以上
Ⅰ度	57 (42%)	25以上	HbA1c6.5以上
Ⅱ度	22 (41%)	21 (15%)	HDL40未満
Ⅲ度	<20 (-)	<20 (-)	TG150以上
		34 (63%)	
		<20 (-)	
		<20 (-)	
		47 (22%)	142 (67%)
		<20 (-)	20～38 (-)
		<20 (-)	<20 (-)
		<20 (-)	<20 (-)
		Ⅰ度	211
		Ⅱ度	39
		Ⅲ度	<20
		分類	Ⅰ内での割合

臓器障害		眼底検査有所見者	
詳細健診実施者(m)	眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	尿蛋白(+以上)
195 (10%)	883 (46%)	143 (69%)	-
検査実施者(n)	63 (31%)	43 (21%)	<20 (-)
実施率(n/k)	<20 (-)	<20 (-)	<20 (-)
有所見者(o)	67 (26%)	0 (0%)	<20 (-)
有所見率(o/k)	67 (26%)	0 (0%)	<20 (-)
検査実施者(p)	179 (89%)	65 (25%)	<20 (-)
実施率(p/l)	67 (26%)	65 (25%)	<20 (-)
有所見者(q)	0 (0%)	65 (25%)	<20 (-)
有所見率(q/l)	0 (0%)	65 (25%)	<20 (-)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

注：%を付けた()内の値は、小数点以下第1位を四捨五入して丸めた値

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie,いずれかの分類2以上の結果を所見者とした

※高血圧症の人が詳細健診をきちんと受けているか

(高血压症)

[illegible]

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 受診者(e/e/y)

535人 (53.8)

特定健診 受診者(f/f/e)

79人 (14.8)

※上記「f」高血圧症に内服治療中の140/90未満は含まない

高血圧症治療中(i)質問票服薬有 (セプト有)

209人 (39.1 (i/e))

分類	人数	k内での割合
I度	36	86
II度	<20	—
III度	<20	—

高血圧症(f)
140/90以上 (f/e)

79人 (14.8)

分類	人数	k内での割合
I度	32	86
II度	<20	—
III度	<20	—

未治療(i)

分類	人数	i内での割合
I度	32	86
II度	<20	—
III度	<20	—

脂質異常症

脂質異常症	人数	k内での割合
LDL120以上	36	86
HDL40未満	<20	—
TG150以上	<20	—

その他のリスク

リスク	人数	k内での割合
肥満 BMI 25以上	36	86
高血糖 HbA1c 6.5以上 空腹時126以上	<20	—
I度	<20 (-)	17~35 (-)
II度	<20 (-)	0 (-)
III度	0 (-)	<20 (-)

臓器障害

臓器障害	人数	k内での割合
網膜検査有所見者	168	31%
心電図結果有所見者	<20 (-)	—
尿蛋白(+/以上)	<20 (-)	—

検査実施者(n/n/k)

検査実施者(o/o/k)

検査実施者(p/p/k)

検査実施者(q/q/l)

検査実施者(r/r/l)

検査実施者(s/s/l)

検査実施者(t/t/l)

検査実施者(u/u/l)

検査実施者(v/v/l)

検査実施者(w/w/l)

検査実施者(x/x/l)

検査実施者(y/y/l)

検査実施者(z/z/l)

検査実施者(aa/aa/l)

検査実施者(ab/ab/l)

検査実施者(ac/ac/l)

検査実施者(ad/ad/l)

検査実施者(ae/ae/l)

検査実施者(af/af/l)

検査実施者(ag/ag/l)

検査実施者(ah/ah/l)

検査実施者(ai/ai/l)

検査実施者(aj/aj/l)

検査実施者(ak/ak/l)

検査実施者(al/al/l)

検査実施者(am/am/l)

検査実施者(an/an/l)

検査実施者(ao/ao/l)

検査実施者(ap/ap/l)

検査実施者(aq/aq/l)

検査実施者(ar/ar/l)

検査実施者(as/as/l)

検査実施者(at/at/l)

検査実施者(au/au/l)

検査実施者(av/av/l)

検査実施者(aw/aw/l)

検査実施者(ax/ax/l)

検査実施者(ay/ay/l)

検査実施者(az/az/l)

検査実施者(ba/ba/l)

検査実施者(bb/bb/l)

検査実施者(bc/bc/l)

検査実施者(bd/bd/l)

検査実施者(be/be/l)

検査実施者(bf/bf/l)

検査実施者(bg/bg/l)

検査実施者(bh/bh/l)

検査実施者(bi/bi/l)

検査実施者(bj/bj/l)

検査実施者(bk/bk/l)

検査実施者(bl/bl/l)

検査実施者(bm/bm/l)

検査実施者(bn/bn/l)

検査実施者(bo/bo/l)

検査実施者(bp/bp/l)

検査実施者(bq/bq/l)

検査実施者(br/br/l)

検査実施者(bs/bs/l)

検査実施者(bt/bt/l)

検査実施者(bu/bu/l)

検査実施者(bv/bv/l)

検査実施者(bw/bw/l)

検査実施者(bx/bx/l)

検査実施者(by/by/l)

検査実施者(bz/bz/l)

検査実施者(ca/ca/l)

検査実施者(cb/cb/l)

検査実施者(cc/cc/l)

検査実施者(cd/cd/l)

検査実施者(ce/ce/l)

検査実施者(cf/cf/l)

検査実施者(cg/cg/l)

検査実施者(ch/ch/l)

検査実施者(ci/ci/l)

検査実施者(cj/cj/l)

検査実施者(ck/ck/l)

検査実施者(cl/cl/l)

検査実施者(cm/cm/l)

検査実施者(cn/cn/l)

検査実施者(co/co/l)

検査実施者(cp/cp/l)

検査実施者(cq/cq/l)

検査実施者(cr/cr/l)

検査実施者(cs/cs/l)

検査実施者(ct/ct/l)

検査実施者(cu/cu/l)

検査実施者(cv/cv/l)

検査実施者(cw/cw/l)

検査実施者(cx/cx/l)

検査実施者(cy/cy/l)

検査実施者(cz/cz/l)

検査実施者(da/da/l)

検査実施者(db/db/l)

検査実施者(dc/dc/l)

検査実施者(dd/dd/l)

検査実施者(de/de/l)

検査実施者(df/df/l)

検査実施者(dg/dg/l)

検査実施者(dh/dh/l)

検査実施者(di/di/l)

検査実施者(dj/dj/l)

検査実施者(dk/dk/l)

検査実施者(dl/dl/l)

検査実施者(dm/dm/l)

検査実施者(dn/dn/l)

検査実施者(do/do/l)

検査実施者(dp/dp/l)

検査実施者(dq/dq/l)

検査実施者(dr/dr/l)

検査実施者(ds/ds/l)

検査実施者(dt/dt/l)

検査実施者(du/du/l)

検査実施者(dv/dv/l)

検査実施者(dw/dw/l)

検査実施者(dx/dx/l)

検査実施者(dy/dy/l)

検査実施者(dz/dz/l)

検査実施者(ea/ea/l)

検査実施者(eb/eb/l)

検査実施者(ec/ec/l)

検査実施者(ed/ed/l)

検査実施者(ee/ee/l)

検査実施者(ef/ef/l)

検査実施者(eg/eg/l)

検査実施者(eh/e

軽 症				重 症			
人口				脳血管疾患			
※令和2年国勢調査人口調査基本集計				虚血性心疾患			
14690 人				人工透析			
年代別	人数(T)	高血圧症治療中		患者数(b)	b/a	患者数(c)	c/a
20代以下	4362	患者数(a)	割合(a/T)	0	-	0	-
30代	1841	<20	-	<20	-	<20	-
40代	2276	<20	-	<20	-	<20	-
50代	2120	118	5.2	<20	-	<20	-
60代	2653	249	11.7	<20	-	51	20.5
70～74歳	1438	608	22.9	37	6.1	128	21.1
		504	35	50	9.9	114	22.6
再掲	8487			108	7.3	-	-
40～74歳(Y)		再掲	1479	17.4		-	-
40～74歳(X)						-	-

レセプト		gのうち特定健診未受診の者(h)	
		1085 人 (73.4 (h/g))	

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40～74 歳		その他のリスク	
高血圧症治療中(i)質問票(服薬有 レセプト有)		血圧分類	
1241 人 (25.7 (i/e))		肥満	
		高血糖	
		脂質異常症	
		HbA1c6.5以上	
		LDL120以上	
		HDL40未満	
		TG150以上	
		BMI	
		25以上	
		158 (47%)	
		57 (59%)	
		<20 (-)	
		<20 (-)	
		71 (74%)	
		7～25 (-)	
		188 (35%)	
		44 (8%)	
		395 (74%)	
		49 (43%)	
		<20 (-)	
		82 (72%)	
		23 (53%)	
		<20 (-)	
		24～42 (-)	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	
		III 度	
		I 度	
		II 度	

※令和3年度 多治見市(総数)

(高血圧症)

人口			軽 症		重 症
※令和2年国勢調査人口等基本集計			高血圧症治療中		人工透析
89260 人			19377 人 (21.7)		3066 人 (15.8)
年代別	人数(T)		年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	26138		20代以下	166	0.6
30代	10425		30代	380	3.6
40代	14406		40代	1519	10.5
50代	14769		50代	4116	27.9
60代	14577		60代	7020	48.2
70～74歳	8945		70～74歳	6176	69
再掲	52697		再掲	18831	35.7
40～74歳(Y)			40～74歳(g)		

レセプト

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

gのうち特定健診未受診の者(h)
13744 人 (73 (h/g))

特定健診 ※ 40 — 74 歳

高血圧症治療中(i)質問票回答者(レセプト有)				7107人(25.5(i/e))				その他のリスク				臓器障害				
		分類	人数	k内での割合				血圧分類		肥満	高血糖	脂質異常症	眼底検査有所見者	心電図検査有所見者	尿蛋白(+)以上)	
		治療中(k)	I度	1955	75			I度		BMI 25以上	HbA1c 6.5以上 空腹時126以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上	2411 (9%)	13856 (50%)		
			II度	514	20			II度		872 (45%)	363 (19%)	1229 (63%)				
			III度	129	5			III度		235 (46%)	85 (17%)	357 (69%)				
										76 (59%)	23 (18%)	100 (78%)				
		特定健診受診者(e) (e/Y)	6115人 (21.9)													
		27887人 (52.9)														
		高血圧症(f) 140/90以上 (f/e)	6115人 (21.9)													
		未治療(i)	I度	2717	77			I度		843 (31%)	226 (8%)	1944 (72%)	検査実施者(p) 実施率(p/l)	326 (9%)	1849 (53%)	3500 (100%)
			II度	633	18			II度		253 (40%)	74 (12%)	463 (73%)	有所見者(q) 有所見率(q/l)	36 (1%)	692 (20%)	144 (4%)
			III度	167	5			III度		72 (43%)	13 (8%)	128 (77%)				
			分類	人数	l内での割合											

※上記「f」高血圧症「j」に内服治療中の140/90未満は含まない

※高血圧症の人が詳細検査をきちんと受けているか眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類2以上の結果を所見有とした

※高血圧症の人が詳細検査をきちんと受けているか眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類2以上の結果を所見有とした

-165-

軽 症			重 症		
人口			脳血管疾患		
※令和2年国勢調査人口等基本集計			虚血性心疾患		
62231 人			1523 人 (12.5)		
年 代 別			患者数(d)		
20代以下			0		
30代			<10		
40代			<10		
50代			<10		
60代			36		
70～74歳			70		
再掲			63		
40～74歳(y)			12.5		
35703			-		
再掲			1491		
40～74歳(g)			-		
11905			-		
再掲			12.5		
40～74歳(h)			-		
6570 人 (55.2 (h/g))			-		

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

高血圧症治療中(①質問票、服薬有、セプト有)				5643 人 (28.3 (i/e))				その他のリスク				臓器障害			
		分類		人数		k内での割合		血圧分類		肥満		高血糖		脂質異常症	
特定健診受診者(e)		I 度		1687		72		BMI 25以上		HbA1c 6.5以上		LDL120以上		LDL120以上	
19971人 (55.9)		II 度		533		23		706 (42%)		空腹時126以上		HbA1c 6.5以上		HDL40未満	
		III 度		122		5		223 (42%)		TG150以上		1089 (65%)		383 (72%)	
								64 (52%)		24 (20%)		97 (80%)		177 (8%)	
														1450 (62%)	
														47 (2%)	
														636 (27%)	
														2333~2341 (-)	
														175 (7%)	

人口			軽 症			重 症		
※令和2年国勢調査人口等基本集計			高血圧症治療中			脳血管疾患		
38397 人			6562 人 (17.1)			虚血性心疾患		
年代別	人数(T)		年代別	患者数(a)	割合(a/T)	患者数(b)	b/a	
20代以下	11092		20代以下	144	1.3	<10	-	
30代	4223		30代	93	2.2	<10	-	
40代	6119		40代	412	6.7	12	2.9	
50代	5978		50代	1239	20.7	44	3.6	
60代	6924		60代	2466	35.6	126	5.1	
70～74歳	4061		70～74歳	2208	54.4	154	7	
再掲	23082		再掲	6325	27.4	336	5.3	
40～74歳(Y)			40～74歳(g)					
レセプト			gのうち特定健診未受診の者(h)			その他のリスク		
			3227 人 (51 (h/g))			血圧分類	肥満	高血糖
							BMI	HbA1c6.5以上
							25以上	空腹時126以上
						I度	441 (42%)	195 (19%)
						II度	144 (42%)	57 (17%)
						III度	32 (48%)	13 (20%)
						I度	398 (30%)	127 (9%)
						II度	108 (35%)	37 (12%)
						III度	34 (45%)	11 (14%)
						I度	1340	78
						II度	306	18
						III度	76	4
						分類	人数	I度での割合

人口		軽 症		重 症	
※令和2年国勢調査人口等基本集計		高血圧症治療中		脳血管疾患	
69013 人		12309 人 (17.8)		虚血性心疾患	
年 代 別		患者数(a)		患者数(c)	
20代以下		割合(a/T)		患者数(d)	
30代		20代以下		d/a	
40代		30代		-	
50代		40代		-	
60代		50代		-	
70～74歳		60代		-	
再掲		70～74歳		人工透析	
40793		3946		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(Y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳(y)		40～74歳(g)		-	
40793		12056		-	
再掲		再掲		-	
40～74歳					

-170-

人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計				軽 症				重 症					
1247 人				高血圧症治療中 － (－)				脳血管疾患 ＜20 (－)					
年代別		人数(T)		年代別		患者数(a)		割合(a/T)		虚血性心疾患 ＜20 (－)			
20代以下		387		20代以下		＜20		－		患者数(c)		c/a	
30代		152		30代		＜20		－		0		0	
40代		198		40代		＜20		－		0		0	
50代		177		50代		22		12.4		＜20		0	
60代		205		60代		44		21.5		＜20		0	
70～74歳		128		70～74歳		62		48.4		＜20		0	
再掲 40～74歳(Y)		708		再掲 40～74歳(g)		－		－		＜20		－	
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h) － (－)				注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。					
特定健診 ※40～74歳				その他のリスク				臓器障害					
特定健診 受診者(e) (e/Y)		79人 (16.8)		高血圧症治療中(i)※質問票 服薬者 レセプト有)		129 人 (27.5 (i/e))		血圧分類		肥満		脂質異常症 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上	
469人 (66.2)		79人 (16.8)		分類		人数		k内での割合		BMI 25以上		検査実施者(n) 実施率(n/k)	
				I度		29		74		＜20 (－)		＜20 (－)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		有所見者(o) 有所見率(o/k)	
				I度		29		73		＜20 (－)		＜20 (－)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		有所見者(q) 有所見率(q/l)	
				分類		人数		I内での割合		検査実施者(p) 実施率(p/l)		＜20 (－)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		＜20 (97%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		有所見率(r) 有所見率(r/l)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－		0 (－)		＜20 (0%)	
				I度		29		73		＜20 (－)		23 (58%)	
				II度		＜20		－		＜20 (－)		0	
				III度		0		－</					

(糖尿病)

※令和3年度 岐阜市(総数)

軽 症										重 症											
人口										人工透析											
※令和2年国勢調査人口等基本集計										糖尿病性腎症											
318007 人										1419 人 (1.6)											
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)		b/a		患者数(c)		c/a		d/a							
20代以下		99441				5.7		5		14		0.2		-							
30代		37806		5649		15		4.8		28		0.5		11							
40代		53593		5653		21.3		5.1		115		1		37							
50代		51861		11434		38.4		5.7		320		1.6		161							
60代		46582		19900		57.2		5.9		529		2		259							
70～74歳		28724		22240		77.4		6.1		413		1.9		227							
再掲		180760		80220		44.4		5.8		1377		1.7		684							
40～74歳(Y)				再掲		40～74歳(Z)		4656		5.8		1377		1.7		684					
gのうち特定健診未受診者(h)																					
47096 人 (58.7) (h/g)																					
注：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。																					
レセプト																					
特定健診 ※ 40 ～ 74 歳																					
特定健診受診者(e)										糖尿病性腎症病期分類											
98814人 (54.7)										eGFR		第1期		第2期		第3期		第4期			
										アルブミン尿		腎症前期		早期腎症期		顕性腎症期		腎不全期			
										正常		30未満		30以上		顕性		30未満			
										アルブミン尿		アルブミン尿		アルブミン尿		アルブミン尿		アルブミン尿			
										(30未満)		(30～299)		(300以上)		(300以上)		問わない			
										尿蛋白		(－)		(±)		(±)		問わない			
										尿蛋白		8486		758		635		60			
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											
										尿蛋白											

軽 症										重 症														
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析				
※令和2年国勢調査人口等基本集計					8943 人 (16)					(-)					(-)					-				
年代別					患者数(a)					患者数(b)					患者数(c)					患者数(d)				
20代以下					495					<10					<10					0				
30代					458					22					11					0				
40代					1080					45					28					0				
50代					1874					100					50					<10				
60代					2678					142					71					<10				
70～74歳					2358					146					34					<10				
再掲					7990					433					183					-				
40～74歳(Y)					25.3					5.4					2.3					-				

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)
4585 人 (57.4) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 受診者(e) (e/Y)		※ 糖尿病型(f) (f/e)		治療中(i) (質問票:服薬有 またはレセプト有)		※ コントロール 不良		その他のリスク		糖尿病性腎症病期分類	
16046人 (50.7)		4282人 (26.7)		4063 人 (95) (i/f)		805 (20)		高血圧 130/80 以上		eGFR	
				(質問票:服薬無かつレセプト無)		※ コントロール 良		脂質 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上		アルブミン尿 (30未満)	
						3258 (80)		570 (70.8)		正常 アルブミン尿 (30未満)	
								461 (57.3)		微量 アルブミン尿 (30～299)	
										腎性腎症期	
										30以上	
										腎不全期	
										30未満	
										問わない	
										問わない	
										<10	

※以下のいずれかに該当

- ・HbA1c6.5以上
- ・空腹時血糖126以上
- ・糖尿病治療中

(質問票 または レセプト)

特定健診 ※ 40 ～ 74 歳

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

※令和3年度 各務原市(総数)

(糖尿病)


軽 症										重 症														
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析				
※令和2年国勢調査人口等基本集計					17598 人 (14.4)					850 人 (4.8)					- (-)					-				
年代別		人数(T)			患者数(a)		割合(a/T)			患者数(b)		b/a			患者数(c)		c/a			患者数(d)		d/a		
20代以下		39341			750		1.9			17		2.3			<10		-			0		-		
30代		15485			923		6			33		3.6			<10		-			0		-		
40代		21405			2099		9.8			96		4.6			<10		-			<10		-		
50代		18310			3794		20.7			207		5.5			17		0.4			19		0.5		
60代		16283			5057		31.1			255		5			22		0.4			30		0.59		
70～74歳		11193			4975		44.4			242		4.9			40		0.8			40		0.8		
再掲		67191			再掲		15925			800		5			-		-			-		-		
40～74歳(Y)					40～74歳(g)					5					-					-				

gのうち特定健診未受診者(h)

8837 人 (55.5) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 受診者(e) (e/Y)		※ 糖尿病型(f) (f/e)		治療中(i) (質問票:服薬有 またはレセプト有)		※ コントロール 不良		その他のリスク		糖尿病性腎症病期分類							
34979人 (52.1)		9384人 (26.8)		8991 人 (96) (i/f)		1661 (18)		高血圧 130/80 以上 1149 (69.2)		肥満 BMI 25以上 899 (54.1)		脂質 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上 1139 (68.6)		第1期 腎症前期 正常 アルブミン尿 (30未満) 第2期 早期腎症期 顕性腎症期 第3期 顕性腎症期 第4期 腎不全期 30未満 問わない 問わない 13			
						※ コントロール 良								eGFR アルブミン尿 30以上 30～299 顕性 アルブミン尿 (300以上)			
														尿蛋白 (-) (±) (±)以上 問わない			
														2352 284 204 13			



軽 症										重 症																																												
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析																																		
※令和2年国勢調査人口等基本集計					4722 人 (9.6)					-					-					-																																		
49401 人										(-)					(-)					(d/a)																																		
年代別					患者数(a)					割合(a/T)					患者数(b)					b/a					患者数(c)					c/a																								
20代以下					217					1.2					<10					-					0					-																								
30代					246					3.5					<10					-					<10					-																								
40代					571					6.5					16					2.8					<10					-																								
50代					1024					15.4					33					3.2					11					1.1																								
60代					1470					26.5					45					3.1					19					1.3																								
70～74歳					1194					36.6					31					2.6					10					0.8																								
再掲					4259					17.6					125					2.9					-					-																								
40～74歳(Y)																																																						
gのうち特定健診未受診者(h)										2225 人 (52.2) (h/g)																																												
gのうちにレセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。																																																						
その他のリスク																																																						
高血圧					肥満					脂質					糖尿病性腎症病期分類					第1期					第2期					第3期					第4期																			
130/80 以上					BMI 25以上					LDL120以上 HDL40未満 TG150以上					eGFR					腎症前期					早期腎症期					顕性腎症期					腎不全期																			
336 (57.8)					334 (57.5)					375 (64.5)					アルブミン尿 (30未満)					正常 (30未満)					微量 (30～299)					顕性 アルブミン尿 (300以上)					間わない																			
※コントロール 不良					581 (18)					※コントロール 良					2656 (82)					-					(±)					(±)					(±)以上					間わない														
治療中(i)					3237 人 (96) (i/f)					1383 (52.1)					1012 (38.1)					1569 (59.1)					1074					80					75					<10														
(質問票:服薬有またはレセプト有)																																																						
※糖尿病型(f)					3389人 (25.8)					未治療(j)					152 人 (4) (j/f)																																							
(f/e)										(質問票:服薬無かつレセプト無)																																												
特定健診 受診者(e)					13115人 (54.2)																																																	
(e/Y)																																																						
※以下のいずれかに該当																																																						
・HbA1c6.5以上																																																						
・空腹時血糖126以上																																																						
・糖尿病治療中																																																						
(質問票 または レセプト)																																																						
特定健診 ※ 40 ～ 74 歳										※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定																																												

軽 症										重 症																																		
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析																								
※令和2年国勢調査人口等基本集計					2611 人 (9.4)					患者数(a)					割合(a/T)					患者数(c)					患者数(d)					d/a														
27780 人					年 代 別					20代以下					30代					40代					50代					60代					70～74歳									
年 代 別					8978					3066					4734					3963					4302					2737														
20代以下					30代					40代					50代					60代					70～74歳																			
再掲					40～74歳(Y)					再掲					40～74歳(g)					再掲					40～74歳(h)					再掲					40～74歳(i)									
15736					2460					15.6					1320 人 (53.7) (h/g)					再掲					40～74歳(j)					再掲					40～74歳(k)									
レセプト					gのうち特定健診未受診者(h)					1320 人 (53.7) (h/g)					その他のリスク					治療中(i)					未治療(j)					77 人 (3) (j/f)														
特定健診受診者(e)					8402人 (53.4)					※糖尿病病型(f)					2407人 (28.6)					※コントロール不良					413 (18)					※コントロール良					1917 (82)					※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)				
8402人 (53.4)					2407人 (28.6)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人 (97) (i/f)					2330 人									


軽 症										重 症														
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析				
※令和2年国勢調査人口等基本集計					5302 人 (23.5)					－ (－)					－ (－)					<10 (－)				
22557 人					患者数(a)					患者数(b)					患者数(c)					患者数(d)				
年代別					割合(a/T)					b/a					c/a					d/a				
20代以下					20代以下					<10					0					0				
30代					30代					20					0					0				
40代					40代					36					<10					0				
50代					50代					68					<10					0				
60代					60代					64					<10					<10				
70～74歳					70～74歳					35					<10					0				
1541					58.4					3.9					－					－				
再掲					再掲					203					21					0.5				
40～74歳(Y)					40～74歳(g)					4.7					<10					－				
11063					39.1																			

gのうち特定健診未受診者(h)

2534 人 (58.6) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40 ～ 74 歳		治療中(i)		その他のリスク		糖尿病性腎症病期分類				
特定健診 受診者(e)	5788人 (52.3)	治療中(i)	1465 人 (96) (i/f)	高血圧	肥満	脂質	第1期	第2期	第3期	第4期
(e/Y)	(52.3)	(質問票:服薬またはレセプト有)	(96) (i/f)	130/80 以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
				162 (65.3)	148 (59.7)	172 (69.4)	正常 アルブミン尿 (30未満)	30以上	顕性 アルブミン尿 (30～299)	30未満
							eGFR			
							アル ブミ ン尿			
							尿蛋白			
							尿蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			
							原蛋白			



注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

レセプト

特定健診 ※ 40～74 歳

軽 症										重 症																	
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析							
※令和2年国勢調査人口等基本集計					4058 人 (25.7)					-					<20 (-)					<20 (-)							
年代別		人数(T)			年代別		患者数(a)			割合(a/T)			患者数(b)		b/a			患者数(c)		c/a			患者数(d)		d/a		
20代以下		5306			20代以下		285			5.4			<20		-			0		-			0		-		
30代		2077			30代		321			15.5			<20		-			0		-			0		-		
40代		2799			40代		614			21.9			<20		-			0		-			0		-		
50代		2401			50代		907			37.8			21		2.3			0		-			<20		-		
60代		2048			60代		1065			52			26		2.4			<20		-			0		-		
70～74歳		1187			70～74歳		866			73			33		3.8			<20		-			0		-		
再掲		8435			再掲		3452			40.9			-		-			<20		-			<20		-		
40～74歳(Y)					40～74歳(g)								-		-			<20		-			<20		-		

gのうち特定健診未受診者(h)

2123 人 (61.5) (h/g)

※以下のいずれかに該当

- ・HbA1c6.5以上
- ・空腹時血糖126以上
- ・糖尿病治療中

(質問票:またはレセプト)

特定健診 受診者(e)

4177人 (49.5)

※糖尿病型(f)

1118人 (26.8)

治療中(i)

(質問票:服薬またはレセプト有)

1057 人 (95) (i/f)

※コントロール不良

170 (16)

※コントロール良

887 (84)

未治療(j)

(質問票:服薬無かつレセプト無)

61 人 (5) (j/f)

その他のリスク

高血圧	肥満	脂質
130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
116 (68.2)	93 (54.7)	106 (62.4)
462 (52.1)	308 (34.7)	591 (66.6)

糖尿病性腎症病期分類

eGFR	第1期	第2期	第3期	第4期
	腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
アルブミン尿 (30未満)	正常	微量	顕性	問わない
	アルブミン尿 (30～299)	アルブミン尿 (30～299)	アルブミン尿 (300以上)	問わない
尿蛋白	(-)	(±)	(±)以上	問わない
	437	34	31	<20


注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40～74 歳

軽 症										重 症									
人口										糖尿病治療中									
※令和2年国勢調査人口等基本集計										33191 人 (24.8)									
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)		患者数(b)		割合(b/a)		患者数(c)		割合(c/a)		患者数(d)		割合(d/a)	
20代以下		43137		1754		4.1		60		3.4		10		0.6		<10		-	
30代		17456		1974		11.3		76		3.9		31		1.6		<10		-	
40代		22764		4319		19		179		4.1		117		2.7		11		0.25	
50代		20614		6958		33.8		402		5.8		247		3.5		67		0.96	
60代		18841		9928		52.7		495		5		336		3.4		82		0.83	
70～74歳		11036		8258		74.8		394		4.8		308		3.7		92		1.11	
再掲		73255		29463		40.2		1470		5		1008		3.4		252		0.86	
40～74歳(Y)				40～74歳(g)															
レセプト										gのうち特定健診未受診者(h)									
										17893 人 (60.7) (h/g)									
注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。																			
特定健診 ※ 40～74 歳										その他のリスク									
特定健診受診者(e)		※糖尿病型(f)		治療中(i)		未治療(j)		※コントロール不良		※コントロール良		高血圧		肥満		脂質		糖尿病性腎症病期分類	
(e/Y)		(f/e)		(質問票:服薬有またはレセプト有)		(質問票:服薬無かつレセプト無)		1599 (18)		7514 (82)		130/80 以上		BMI 25以上		LDL120以上 HDL40未満 TG150以上		第1期 腎症前期	
36942人 (50.4)		9631人 (26.1)		9113 人 (95) (i/f)		518 人 (5) (j/f)						1083 (67.7)		921 (57.6)		1026 (64.2)		アルブミン尿 (30未満)	
																		正腎 アルブミン尿 (30～299)	
																		慢性腎症期	
																		アルブミン尿 (300以上)	
																		尿蛋白	
																		原蛋白	
																		第3期 慢性腎症期	
																		第4期 腎不全期	
																		30未満	
																		間わない	
																		間わない	
																		33	
※以下のいずれかに該当 ・HbA1c6.5以上 ・空腹時血糖126以上 ・糖尿病治療中 （質問票またはレセプト）										※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定									

(糖尿病)

注意: レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。



(糖尿病)

注意: しセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

※令和3年度 関ヶ原町(総数)

(糖尿病)

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

5198人

年代別	人数(T)
20代以下	1337
30代	500
40代	744
50代	861
60代	1061
70～74歳	695

再掲

40～74歳(Y)

3361

糖尿病治療中

-

(-)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	-
30代	27	5.4
40代	104	14
50代	225	26.1
60代	518	48.8
70～74歳	516	74.2

再掲

40～74歳(g)

1363

40.6

インスリン療法

-

(-)

患者数(b)	b/a
0	-
0	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-

28

2.1

糖尿病性腎症

<20

(-)

患者数(c)	c/a
0	-
<20	-
0	-
<20	-
0	-
<20	-

<20

-

<20

-

<20

-

<20

-

人工透析

<20

(-)

患者数(d)

d/a

0

-

0

-

<20

-

<20

-

軽症

重症

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)

873人(64)(h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※40～74歳

※糖尿病型(f)

(f/e)

564人

(34.7)

※以下のいずれかに該当

・HbA1c6.5以上

・空腹時血糖126以上

・糖尿病治療中

(質問票またはレセプト)

※コントロール不良

92

(17)

※コントロール良好

444

(83)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

※令和3年度 神戸市(総数)

(糖尿病)

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

15550 人

年代別

人数(T)

20代以下

4742

30代

1737

40代

2709

50代

2241

60代

2452

70～74歳

1669

再掲

40～74歳(Y)

9071

糖尿病治療中

1675 人
(10.8)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

76

1.6

30代

59

3.4

40代

165

6.1

50代

290

12.9

60代

550

22.4

70～74歳

535

32.1

再掲

40～74歳(g)

1540

17

インスリン療法

-
(-)

患者数(b)

b/a

<20

-

0

-

<20

-

<20

-

<20

-

35

2.3

糖尿病性腎症

<20
(-)

患者数(c)

c/a

0

-

<20

-

0

-

<20

-

<20

-

<20

-

<20

-

人工透析

<20
(-)

患者数(d)

d/a

0

-

0

-

0

-

<20

-

<20

-

<20

-

<20

-

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)
852 人 (55.3) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

その他のリスク

高血圧

130/80
以上

※コントロール
不良

219
(16)

脂質

LDL120以上
HDL40未満
TG150以上

150
(68.5)

BMI

25以上

124
(56.6)

690
(58.8)

427
(36.4)

700
(59.6)

治療中(i)
(質問票:服薬有またはレセプト有)

1393 人
(96) (i/f)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票またはレセプト)

1454人
(26.7)

特定健診
受診者(e)
(e/Y)

5453人
(60.1)

※糖尿病型(f)
(f/e)

未治療(j)
(質問票:服薬無かつレセプト無)

61 人 (4) (j/f)

特定健診 ※ 40 ～ 74 歳

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

軽 症				→ 重 症			
人口				糖尿病治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				-			
8415 人				患者数(a)			
年代別				割合(a/T)			
20代以下				2803			
30代				1117			
40代				1467			
50代				1093			
60代				1257			
70～74歳				678			
再掲				再掲			
40～74歳(Y)				40～74歳(g)			
4495				756		16.8	
レセプト				gのうち特定健診未受診者(h)			
				414 人 (54.8) (h/g)			
				注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。			
特定健診 ※ 40～74 歳				その他のリスク			
特定健診受診者(e)				高血圧			
2485人 (55.3)				130/80 以上			
※糖尿病型(f)				BMI			
685人 (27.6)				25以上			
※以下のいずれかに該当				※コントロール不良			
・HbA1c6.5以上				123 (19)			
・空腹時血糖126以上				※コントロール良			
・糖尿病治療中				533 (81)			
(質問票:またはレセプト)				治療中(i)			
				(質問票:服薬有またはレセプト有)			
				656 人 (96) (i/f)			
				未治療(j)			
				(質問票:服薬無かつレセプト無)			
				29 人 (4) (j/f)			
				※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定			
				糖尿病性腎症病期分類			
				eGFR			
				アルブミン尿			
				正常			
				アルブミン尿 (30～299)			
				微量			
				アルブミン尿 (300以上)			
				顕性			
				アルブミン尿 (300以上)			
				腎不全期			
				第1期			
				第2期			
				第3期			
				第4期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			
				腎不全期			

※令和3年度 安八町(総数)

(糖尿病)

軽 症										重 症															
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析					
※令和2年度調査人口等基本集計					－ (－)					－ (－)					<20 (－)					<20 (－)					
年代別	人数(T)				年代別	患者数(a)	割合(a/T)				患者数(b)	b/a				患者数(c)	c/a				患者数(d)	d/a			
20代以下	3919				20代以下	<20	－				0	－				0	－				0	－			
30代	1367				30代	<20	－				0	－				0	－				0	－			
40代	2259				40代	71	3.1				<20	－				<20	－				<20	－			
50代	1805				50代	143	7.9				<20	－				<20	－				<20	－			
60代	1774				60代	218	12.3				<20	－				<20	－				<20	－			
70～74歳	1145				70～74歳	221	19.3				<20	－				<20	－				<20	－			
再掲 40～74歳(Y)	6983				再掲 40～74歳(g)	653	9.4				20	3.1				<20	－				<20	－			
レセプト					gのうち特定健診未受診者(h)					20					<20					<20					
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人 (49.3) (h/g)																				
					gのうち特定健診未受診者(h)																				
					322 人																				

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

15579 人

年代別

人数(T)

20代以下

4266

30代

1510

40代

2381

50代

2422

60代

3073

70～74歳

1927

再掲

40～74歳(Y)

9803

糖尿病治療中

3280 人
(21.1)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

125

2.9

30代

90

6

40代

267

11.2

50代

532

22

60代

1120

36.4

70～74歳

1146

59.5

再掲

40～74歳(g)

3065

31.3

インスリン療法

－
(－)

患者数(b)

b/a

<20

－

<20

－

20

7.5

32

6

65

5.8

62

5.4

糖尿病性腎症

－
(－)

患者数(c)

c/a

<20

－

<20

－

<20

－

36

3.2

56

4.9

人工透析

－
(－)

患者数(d)

d/a

0

－

0

－

<20

－

<20

－

<20

－

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)
1781 人 (58.1) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※ 40 ～ 74 歳

その他のリスク

高血圧

脂質

130/80 以上

LDL120以上
HDL40未満
TG150以上

180
(67.4)

139
(52.1)

156
(58.4)

※コントロール不良

267
(20)

※コントロール良

1084
(80)

治療中(i)
(質問票:服薬有 または レセプト有)

1351 人
(96) (i/f)

※糖尿病型(f)
(f/e)

1404人
(26.9)

特定健診受診者(e)
(e/Y)

5210人
(53.1)

未治療(j)
(質問票:服薬無かつレセプト無)

53 人 (4) (j/f)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票 または レセプト)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

eGFR

アルブミン尿

正常

アルブミン尿 (30～299)

微量

顕性

アルブミン尿 (300以上)

第1期

腎症前期

第2期

早期腎症期

第3期

顕性腎症期

第4期

腎不全期

30未満

問わない

377

(－)

(±)

(±)以上

28

<20

軽 症										重 症																			
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析									
※令和2年国勢調査人口等基本集計					1330 人 (7.1)					- (-)					<20 (-)					<20 (-)									
年代別	人数(T)	年代別	患者数(a)	割合(a/T)	年代別	患者数(b)	b/a	年代別	患者数(c)	c/a	年代別	患者数(d)	d/a	人工透析															
20代以下	5918	20代以下	40	0.7	20代以下	0	-	20代以下	<20	-	20代以下	0	-	-															
30代	2015	30代	31	1.5	30代	0	-	30代	0	-	30代	0	-	-															
40代	3136	40代	106	3.4	40代	<20	-	40代	0	-	40代	0	-	-															
50代	2959	50代	244	8.2	50代	<20	-	50代	<20	-	50代	<20	-	-															
60代	2931	60代	445	15.2	60代	<20	-	60代	<20	-	60代	<20	-	-															
70～74歳	1792	70～74歳	464	25.9	70～74歳	<20	-	70～74歳	<20	-	70～74歳	<20	-	-															
再掲 40～74歳(Y)	10818	再掲 40～74歳(g)	1259	11.6	再掲 40～74歳	26	2.1	再掲 40～74歳	<20	-	再掲 40～74歳	<20	-	-															
レセプト															gのうち特定健診未受診者(h) 647 人 (51.4) (h/g)														
特定健診 ※ 40～74 歳															注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。														
特定健診受診者(e) (e/Y)					※ 糖尿病型(f) (f/e)					治療中(i) (質問票:服薬有 またはレセプト有)					※ コントロール不良					その他のリスク									
5390人 (49.8)					1489人 (27.6)					1438 人 (97) (i/f)					248 (17)					高血圧 130/80以上									
															※ コントロール良					脂質 LDL120以上 HDL40未満 TG150以上									
															1190 (83)					165 (66.5)									
																				121 (48.8)									
																				713 (59.9)									
																				446 (37.5)									
																				696 (58.5)									

軽 症										重 症																			
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析									
※令和2年国勢調査人口等基本集計					1721 人 (8.7)					- (-)					<20 (-)					<20 (-)									
年代別		人数(T)			年代別		患者数(a)			割合(a/T)			患者数(b)		b/a			患者数(c)		c/a			患者数(d)		d/a				
20代以下		6437			20代以下		51			0.8			<20		-			0		-			0		-				
30代		2176			30代		58			2.7			<20		-			0		-			0		-				
40代		3338			40代		175			5.2			<20		-			0		-			0		-				
50代		3044			50代		346			11.4			<20		-			<20		-			0		-				
60代		2990			60代		595			19.9			<20		-			<20		-			<20		-				
70～74歳		1833			70～74歳		496			27.1			<20		-			0		-			0		-				
再掲		11205			再掲		1612			14.4			51		3.2		<20		-			<20		-					
40～74歳(Y)					40～74歳(g)																								
レセプト										gのうち特定健診未受診者(h)										その他のリスク									
										1163 人 (72.1) (h/g)										高血圧									
																				130/80 以上									
																				※コントロール不良									
																				198 (18)									
																				※コントロール良									
																				933 (82)									
																				545 (58.4)									
																				392 (42)									
																				567 (60.8)									

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

71562 人

年代別

人数(T)

20代以下

22282

30代

8252

40代

11702

50代

10702

60代

11781

70～74歳

6843

再掲

40～74歳(Y)

41028

糖尿病治療中

12826 人
(17.9)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

628

2.8

30代

722

8.7

40代

1448

12.4

50代

2392

22.4

60代

4123

35

70～74歳

3513

51.3

再掲

40～74歳(g)

11476

28

インスリン療法

607 人
(4.7)

患者数(b)

b/a

23

3.7

17

2.4

58

4

117

4.9

211

5.1

181

5.2

再掲

40～74歳(h)

567

4.9

糖尿病性腎症

－
(－)

患者数(c)

c/a

<10

－

10

1.4

40

2.8

75

3.1

136

3.3

115

3.3

再掲

40～74歳(i)

366

3.2

人工透析

－
(－)

患者数(d)

d/a

<10

－

0

－

13

0.9

14

0.59

29

0.7

23

0.65

再掲

40～74歳(j)

79

0.69

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)
6717 人 (58.5) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40～74 歳

特定健診受診者(e)
(e/Y)

20113人
(49)

※糖尿病型(f)
(f/e)

5261人
(26.2)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票またはレセプト)

治療中(i)
(質問票:服薬有 またはレセプト有)

5043 人
(96) (i/f)

※コントロール不良

1016
(20)

※コントロール良

4027
(80)

未治療(j)
(質問票:服薬無かつレセプト無)

218 人 (4) (j/f)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

その他のリスク

高血圧

130/80
以上

672
(66.1)

※コントロール不良

1016
(20)

※コントロール良

4027
(80)

LDL120以上
HDL40未満
TG150以上

687
(67.6)

2374
(59)

1479
(36.7)

2511
(62.4)

糖尿病性腎症病期分類

eGFR

アルブミン尿
(30未満)

正常
アルブミン尿
(30～299)

顕性
アルブミン尿
(300以上)

第1期
腎症前期

第2期
早期腎症期

第3期
顕性腎症期

第4期
腎不全期

尿蛋白

－

(±)

(±)

(±)以上

問わない

問わない

問わない

1924

219

127

<10

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

30848 人

年代別

人数(T)

20代以下

8153

30代

3442

40代

4652

50代

5130

60代

6193

70～74歳

3278

再掲

40～74歳(Y)

19253

糖尿病治療中

4758 人
(15.4)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

128

1.6

30代

155

4.5

40代

407

8.7

50代

910

17.7

60代

1716

27.7

70～74歳

1442

44

再掲

40～74歳(g)

4475

23.2

インスリン療法

患者数(b)

b/a

<10

-

<10

-

30

7.4

41

4.5

67

3.9

54

3.7

患者数(c)

c/a

<10

-

10

6.5

24

5.9

57

6.3

125

7.3

127

8.8

糖尿病性腎症

患者数(d)

d/a

0

-

0

-

0

-

<10

-

10

0.58

10

0.69

患者数(e)

7.4

7.4

333

7.4

人工透析

患者数(f)

f/a

0

-

0

-

<10

-

10

0.58

10

0.69

患者数(g)

7.4

7.4

333

7.4

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)
2029 人 (45.3) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40 ～ 74 歳

特定健診受診者(e)
(e/Y)

11984人
(62.2)

※糖尿病型(f)
(f/e)

3228人
(26.9)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票 または レセプト)

治療中(i)
(質問票:服薬有 または レセプト有)

3074 人
(95) (i/f)

未治療(j)
(質問票:服薬無かつレセプト無)

154 人 (5) (j/f)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

その他のリスク

高血圧

130/80以上

344
(60.2)

※コントロール不良

571
(19)

※コントロール良

2503
(81)

脂質

LDL120以上
HDL40未満
TG150以上

364
(63.7)

899
(35.9)

1476
(59)

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

47507人

年代別	人数(T)
20代以下	16617
30代	6589
40代	8228
50代	6728
60代	6005
70～74歳	3340
再掲	24301
40～74歳(Y)	

糖尿病治療中

12421人
(26.1)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	439	2.6
30代	614	9.3
40代	1527	18.6
50代	2742	40.8
60代	3983	66.3
70～74歳	3116	93.3
再掲	11368	46.8
40～74歳(g)		

インスリン療法

721人
(5.8)

患者数(b)	b/a
19	4.3
38	6.2
93	6.1
163	5.9
222	5.6
186	6
再掲	5.8
40～74歳(h)	

糖尿病性腎症

-
(-)

患者数(c)	c/a
<10	-
10	1.6
23	1.5
51	1.9
70	1.8
59	1.9
再掲	1.8
40～74歳(i)	

人工透析

-
(-)

患者数(d)	d/a
<10	-
<10	-
<10	-
23	0.84
41	1.03
38	1.22
再掲	-
40～74歳(j)	

軽症

重症

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)

6955人 (61.2) (h/g)

特定健診

※40～74歳

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票またはレセプト)

特定健診受診者(e)
(e/Y)

12840人
(52.8)

※糖尿病型(f)
(f/e)

2896人
(22.6)

治療中(i)
(質問票:服薬有またはレセプト有)

2742人
(95) (i/f)

※コントロール不良

485
(18)

高血圧

130/80以上

BMI

25以上

LDL120以上

HDL40未満

TG150以上

脂質

その他のリスク

糖尿病性腎症病期分類

eGFR	第1期	第2期	第3期	第4期
アルブミン尿 (30未満)	正常 アルブミン尿 (30未満)	微量 アルブミン尿 (30～299)	顕性 アルブミン尿 (300以上)	腎不全期
尿蛋白	(-)	(土)	(土)以上	問われない
尿蛋白	945	96	77	11

(糖尿病)

注意: しセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

6940 人

年代別	人数(T)
20代以下	2219
30代	925
40代	1079
50代	970
60代	1129
70～74歳	618
再掲	3796
40～74歳(Y)	

糖尿病治療中

334 人
(4.8)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	-
30代	<20	-
40代	<20	-
50代	61	6.3
60代	127	11.2
70～74歳	118	19.1
再掲	-	-
40～74歳(g)		

インスリン療法

<20
(-)

患者数(b)	b/a
0	-
0	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
再掲	-
40～74歳	

糖尿病性腎症

<20
(-)

患者数(c)	c/a
0	-
0	-
<20	-
0	-
0	-
0	-
再掲	-
40～74歳	

人工透析

<20
(-)

患者数(d)	d/a
0	-
0	-
0	-
<20	-
0	-
再掲	-
40～74歳	

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)

- (-)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40～74 歳

その他のリスク

※糖尿病型(f)

509人
(26)

※コントロール不良

100
(21)

※コントロール良

382
(79)

27 人 (5) (j/f)

治療中(i)

(質問票:服薬有 または レセプト有)

482 人
(95) (i/f)

未治療(j)

(質問票:服薬無かつレセプト無)

27 人 (5) (j/f)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票 または レセプト)

特定健診受診者(e)

1957人
(51.6)

※糖尿病型(f)

509人
(26)

治療中(i)

(質問票:服薬有 または レセプト有)

482 人
(95) (i/f)

未治療(j)

(質問票:服薬無かつレセプト無)

27 人 (5) (j/f)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

糖尿病性腎症病期分類

第1期
腎症前期

第2期
早期腎症期

第3期
顕性腎症期

第4期
腎不全期

eGFR

アルブミン尿
(30未満)

正常
アルブミン尿
(30～299)

顕性
アルブミン尿
(300以上)

尿蛋白

(-)

(土)

(土)以上

問わない

271

<20

21

<20

軽 症

重 症

人口

※ 令和2年国勢調査人口等基本集計

4678 人

年代別	人数(T)
20代以下	1444
30代	634
40代	726
50代	625
60代	771
70～74歳	478
再掲	2600
40～74歳(Y)	

糖尿病治療中

-

(-)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	-
30代	<20	-
40代	25	3.4
50代	53	8.5
60代	135	17.5
70～74歳	124	25.9
再掲	337	13
40～74歳(g)		

インスリン療法

<20

(-)

患者数(b)	b/a
0	-
0	-
0	-
<20	-
<20	-
0	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

8185人

年代別	人数(T)
20代以下	2547
30代	992
40代	1239
50代	1283
60代	1358
70～74歳	766

再掲

40～74歳(Y)

4646

糖尿病治療中

—
(—)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	—
30代	22	2.2
40代	63	5.1
50代	116	9
60代	183	13.5
70～74歳	186	24.3

再掲

40～74歳(g)

548

11.8

インスリン療法

<20
(—)

患者数(b)	b/a
0	—
0	—
<20	—
<20	—
<20	—
<20	—

<20

糖尿病性腎症

<20
(—)

患者数(c)	c/a
0	—
0	—
0	—
<20	—
<20	—
<20	—

<20

人工透析

—
(—)

患者数(d)

d/a

0

—

0

—

0

—

0

—

軽 症

重 症

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)

324人 (59.1) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40 ～ 74 歳

※糖尿病型(f)

(f/e)

626人
(24.4)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票またはレセプト)

特定健診
受診者(e)

(e/Y)

2567人
(55.3)

治療中(i)

(質問票:服薬有またはレセプト有)

599人
(96) (i/f)

未治療(j)

(質問票:服薬無かつレセプト無)

27人 (4) (j/f)

その他のリスク

高血圧	肥満	脂質
130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
69 (61.6)	58 (51.8)	78 (69.6)
※コントロール不良 112 (19)		
※コントロール良 487 (81)		
278 (57.1)	166 (34.1)	294 (60.4)

糖尿病性腎症病期分類

第1期	第2期	第3期	第4期
腎症前期	早期腎症期	顕性腎症期	腎不全期
正常 アルブミン尿 (30未満)	微量 アルブミン尿 (30～299)	顕性 アルブミン尿 (300以上)	問わない
アルブミン尿	30以上		
尿蛋白			
(—)	(±)	(±)以上	問わない
371	32	28	<20

軽 症										重 症														
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析				
※令和2年国勢調査人口等基本集計					-					<20 (-)					<20 (-)					<20 (-)				
5389 人					患者数(a)					患者数(b)					患者数(c)					患者数(d)				
人数(T)					割合(a/T)					患者数(b)					患者数(c)					患者数(d)				
年代別					20代以下					0					0					0				
1153					<20					-					-					-				
30代					30代					0					0					0				
459					<20					-					-					-				
706					29					<20					<20					<20				
40代					4.1					-					-					-				
987					76					<20					<20					<20				
50代					7.7					-					-					-				
1334					226					<20					<20					<20				
60代					16.9					-					-					-				
750					224					<20					<20					<20				
70～74歳					29.9					-					-					-				
再掲					再掲					<20					<20					<20				
3777					555					<20					<20					<20				
40～74歳(Y)					40～74歳(g)					-					-					-				
					14.7					<20					<20					<20				

gのうち特定健診未受診者(h)

296 人 (53.3) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診受診者(e)		治療中(i)		その他のリスク		eGFR		第1期		第2期		第3期		第4期	
(e/Y)		(i/f)		(f/e)		(f/e)		腎症前期		早期腎症期		顕性腎症期		腎不全期	
1925人(51)		554～572 (-)		81 (15)		52 (64.2)		130/80以上		30以上		30未満		30未満	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	
		554～572 (-)		44 (54.3)		27 (33.3)		正常アルブミン尿(30未満)		正常アルブミン尿(30～299)		顕性アルブミン尿(300以上)		顕性アルブミン尿(300以上)	

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

1463 人

年代別	人数(T)
20代以下	330
30代	138
40代	185
50代	304
60代	321
70～74歳	185

再掲

40～74歳(Y)

995

糖尿病治療中

-

(-)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	<20	-
30代	<20	-
40代	<20	-
50代	52	17.1
60代	122	38
70～74歳	134	72.4

再掲

40～74歳(g)

-

-

インスリン療法

<20

(-)

患者数(b)	b/a
0	-
0	-
<20	-
<20	-
0	-
<20	-

<20

(-)

糖尿病性腎症

-

(-)

患者数(c)	c/a
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-

-

(-)

人工透析

-

(-)

患者数(d)	d/a
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-

-

(-)

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)

-

(-)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40～74 歳

※糖尿病型(f)

(f/e)

217～235

(-)

※HbA1c6.5以上

・空腹時血糖126以上

・糖尿病治療中

(質問票またはレセプト)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

その他のリスク

高血圧

130/80以上

<20

(-)

脂質

LDL120以上

HDL40未満

TG150以上

<20

(-)

肥満

BMI 25以上

<20

(-)

※コントロール不良

<20

(-)

※コントロール良

197～215

(-)


107

(-)

軽 症										→ 重 症														
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析				
※令和2年国勢調査人口等基本集計					20212 人 (22.6)					978 人 (4.8)					798 人 (3.9)					-				
年代別					患者数(a)					患者数(b)					患者数(c)					患者数(d)				
20代以下					977					113					25					<10				
30代					1071					55					44					<10				
40代					2114					113					79					10				
50代					4112					166					181					44				
60代					6460					264					242					73				
70～74歳					5478					267					227					92				
再掲 40～74歳(Y)					再掲 40～74歳(g)					810					729					219				
52697					18164					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5					4.5					4					1.21				
再掲 40～74歳(Y)					34.5																			

※令和3年度 瑞浪市(総数)

(糖尿病)



人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

45636 人

年代別	人数(T)
20代以下	13534
30代	5537
40代	7432
50代	7418
60代	7295
70～74歳	4420

再掲
40～74歳(Y)

26565

糖尿病治療中

8001 人
(17.5)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	281	2.1
30代	387	7
40代	843	11.3
50代	1570	21.2
60代	2617	35.9
70～74歳	2303	52.1

再掲
40～74歳(g)

7333

27.6

gのうち特定健診未受診者(h)

5241 人 (71.5) (h/g)

軽 症

重 症

インスリン療法

-
(-)

患者数(b)	b/a
<10	-
<10	-
34	4
56	3.6
66	2.5
68	3

224

3.1

糖尿病性腎症

-
(-)

患者数(c)	c/a
<10	-
<10	-
<10	-
17	1.1
29	1.1
24	1

-

-

人工透析

-
(-)

患者数(d)	d/a
0	-
0	-
<10	-
15	0.96
26	0.99
13	0.56

-

-

レセプト

特定健診 ※ 40～74 歳

特定健診受診者(e)
(e/Y)

15006人
(56.5)

※糖尿病型(f)
(f/e)

3187人
(21.2)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票またはレセプト)

治療中(i)
(質問票:服薬有またはレセプト有)

2893 人
(91) (i/f)

未治療(j)
(質問票:服薬無かつレセプト無)

294 人 (9) (j/f)

その他のリスク

高血圧	肥満	脂質
130/80以上	BMI 25以上	LDL120以上 HDL40未満 TG150以上
434 (70.5)	354 (57.5)	399 (64.8)
※コントロール不良 616 (21)		
※コントロール良 2277 (79)		
1456 (63.9)	826 (36.3)	1355 (59.5)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

※令和3年度 中津川市(総数)

(糖尿病)

[illegible]

軽 症										重 症																			
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析									
※令和2年度調査人口等基本集計					6125 人 (16)					(-)					(-)					(-)									
年代別		人数(T)			年代別		患者数(a)			割合(a/T)			患者数(b)		b/a			患者数(c)		c/a			患者数(d)		d/a				
20代以下		11092			20代以下		185			1.7			<10		-			<10		-			0		-				
30代		4223			30代		207			4.9			<10		-			10		4.8			<10		-				
40代		6119			40代		516			8.4			17		3.3			17		3.3			0		-				
50代		5978			50代		1257			21			47		3.7			46		3.7			<10		-				
60代		6924			60代		2182			31.5			89		4.1			90		4.1			<10		-				
70～74歳		4061			70～74歳		1778			43.8			84		4.7			92		5.2			<10		-				
再掲		23082			再掲		5733			24.8			237		4.1			245		4.3			-		-				
レセプト					gのうち特定健診未受診者(h)					その他のリスク					糖尿病性腎症病期分類														
					2954 人 (51.5) (h/g)																								
特定健診 ※ 40～74 歳					治療中(i)					第1期					第2期					第3期					第4期				
特定健診受診者(e)		(e/Y)			(質問票:服薬有 または レセプト有)		腎症前期			早期腎症期			腎不全期		腎不全期			腎不全期			腎不全期			腎不全期					
12701人		(55)			3328 人		(95) (i/f)			eGFR			30以上			30未満			300以上			300以上			30未満				
※		糖尿病型(f)			※コントロール不良		619			(19)			高血圧			脂質			正常			微量			顕性				
		(f/e)			※コントロール良		2709			(81)			130/80以上			BMI			アルブミン尿			アルブミン尿			アルブミン尿				
							1716			(63.3)			427			(69)			25以上			387			(62.5)				
							894			(33)									308			387			(62.5)				
							1586			(58.5)									427			387			(62.5)				
							187 人 (5) (j/f)			(質問票:服薬無かつレセプト無)									尿蛋白			尿蛋白			尿蛋白				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												(-)			(±)			(±)以上				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				
							187 人 (5) (j/f)												1126			111			58				

※令和3年度 高山市(総数)

(糖尿病)

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

69013 人

年代別	人数(T)
20代以下	20106
30代	8114
40代	11693
50代	10818
60代	11150
70～74歳	7132
再掲	40793
40～74歳(Y)	

糖尿病治療中

12863 人
(18.6)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	587	2.9
30代	604	7.4
40代	1409	12
50代	2658	24.6
60代	4029	36.1
70～74歳	3576	50.1
再掲	11672	28.6
40～74歳(g)		

インスリン療法

677 人
(5.3)

患者数(b)	b/a
36	6.1
28	4.6
55	3.9
135	5.1
227	5.6
196	5.5
613	5.3

糖尿病性腎症

-
(-)

患者数(c)	c/a
0	-
<10	-
23	1.6
57	2.1
93	2.3
77	2.2
250	2.1

人工透析

-
(-)

患者数(d)	d/a
0	-
<10	-
<10	-
14	0.53
22	0.55
31	0.87
-	-

軽 症

→ 重 症

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)
5630 人 (48.2) (h/g)

特定健診 ※ 40～74 歳

※ 糖尿病型(f)
(f/e)

5957人
(24.3)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票またはレセプト)

特定健診受診者(e)
(e/Y)

24542人
(60.2)

治療中(i)
(質問票:服薬有またはレセプト有)

5684 人
(95) (i/f)

未治療(j)
(質問票:服薬無かつレセプト無)

273 人 (5) (j/f)

※HbA1c7.0以上と未満または空腹時血糖130以上と未満で不良と良を判定

その他のリスク

高血圧

130/80以上

BMI

25以上

脂質

LDL120以上
HDL40未満
TG150以上

※コントロール不良

975
(17)

474
(48.6)

614
(63)

※コントロール良

4709
(83)

2498
(53)

1521
(32.3)

2654
(56.4)

糖尿病性腎症病期分類

eGFR

アルブミン尿
(30未満)

微量
アルブミン尿
(30～299)

顕性
アルブミン尿
(300以上)

第1期
腎症前期

30以上

第2期
早期腎症期

第3期
顕性腎症期

第4期
腎不全期

腎不全期

30未満

問われない

問われない

12

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

23127 人

年代別

人数(T)

20代以下

5984

30代

2344

40代

3543

50代

3925

60代

4554

70～74歳

2777

再掲

40～74歳(Y)

14799

糖尿病治療中

3926 人
(17)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

112

1.9

30代

105

4.5

40代

272

7.7

50代

750

19.1

60代

1408

30.9

70～74歳

1279

46.1

再掲

40～74歳(g)

3709

25.1

インスリン療法

(-)

患者数(b)

b/a

<10

-

<10

-

11

4

32

4.3

77

5.5

54

4.2

174

4.7

糖尿病性腎症

(-)

患者数(c)

c/a

<10

-

17

16.2

32

11.8

104

13.9

159

11.3

142

11.1

437

11.8

人工透析

(-)

患者数(d)

d/a

0

-

0

-

<10

-

<10

-

<10

-

12

0.94

25

0.67

レセプト

gのうち特定健診未受診者(h)
1744 人 (47) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診 ※ 40～74 歳

※糖尿病型(f)
(f/e)

2472人
(27.9)

※以下のいずれかに該当
・HbA1c6.5以上
・空腹時血糖126以上
・糖尿病治療中
(質問票またはレセプト)

特定健診
受診者(e)
(e/Y)

8874人
(60)

その他のリスク

高血圧

130/80
以上

BMI

25以上

258
(67.4)

383
(16)

※コントロール
不良

217
(56.7)

172
(44.9)

※コントロール
良

脂質

LDL120以上
HDL40未満
TG150以上

1126
(56.4)

587
(29.4)

1125
(56.4)

治療中(i)
(質問票:服薬有またはレセプト有)

2379 人
(96) (i/f)

未治療(j)
(質問票:服薬無かつレセプト無)

93 人 (4) (j/f)

糖尿病性腎症病期分類

eGFR

アルブミン尿

尿蛋白

第1期

腎症前期

第2期

早期腎症期

第3期

顕性腎症期

第4期

腎不全期

30以上

30未満

顕性
アルブミン尿
(30～299)

顕性
アルブミン尿
(300以上)

(-)

(±)

(±)

834

127

38

<10

軽 症										重 症																																		
人口					糖尿病治療中					インスリン療法					糖尿病性腎症					人工透析																								
※令和2年国勢調査人口等基本集計					-					<20 (-)					-					-																								
1247 人					(-)					患者数(b)					患者数(c)					患者数(d)																								
年代別					患者数(a)					割合(a/T)					患者数(b)					患者数(c)					患者数(d)																			
20代以下					0					-					0					-					0																			
30代					0					-					0					-					0																			
40代					<20					-					0					-					0																			
50代					<20					-					0					-					0																			
60代					<20					-					<20					-					0																			
70～74歳					26					20.3					<20					-					0																			
再掲					再掲					53					7.5					-					-																			
40～74歳(Y)					40～74歳(g)					36 人 (67.9) (h/g)					<20					-					-																			
gのうち特定健診未受診者(h)																																												
36 人 (67.9) (h/g)																																												
注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。																																												
その他のリスク																																												
高血圧					肥満					脂質					第1期					第2期					第3期					第4期														
130/80以上					BMI 25以上					LDL120以上 HDL40未満 TG150以上					腎症前期					早期腎症期					顕性腎症期					腎不全期														
<20 (-)					<20 (-)					<20 (-)					正常 アルブミン尿 (30未満)					30以上					顕性 アルブミン尿 (300以上)					30未満														
22 (35)					21～39 (-)					21～39 (-)					※ コントロール 不良					アルブミン尿 (30～299)					尿蛋白					問わない														
40 (65)					21～39 (-)					21～39 (-)					※ コントロール 良					尿蛋白					尿蛋白					問わない														
62 人 (81) (i/f)					62 人 (81) (i/f)					62 人 (81) (i/f)					治療中(i) (質問票:服薬有またはレセプト有)					32					<20					<20					0									
63～81 (-)					63～81 (-)					63～81 (-)					治療中(f) (f/e)					30以上					顕性 アルブミン尿 (300以上)					30未満														
469人 (66.2)					469人 (66.2)					469人 (66.2)					特定健診 受診者(e) (e/Y)					eGFR					アルブミン尿 (30未満)					正常 アルブミン尿 (30～299)					顕性 アルブミン尿 (300以上)					問わない				
40～74歳					40～74歳					40～74歳					40～74歳					40～74歳					40～74歳					40～74歳					40～74歳					40～74歳				
再掲					再掲					再掲					再掲					再掲					再掲					再掲					再掲					再掲				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					708					708					708					708					708				
708					708					708					708					7																								

※令和3年度 岐阜市（総数）

（脂質異常症）

軽 症

重 症

人口

※ 令和2年国勢調査人口等基本集計

318007 人

年代別

人数(T)

20代以下

99441

30代

37806

40代

53593

50代

51861

60代

46582

70～74歳

28724

再掲

40～74歳(Y)

180760

脂質異常症治療中

57931 人

(18.2)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

3175

3.2

30代

3272

8.7

40代

6744

12.6

50代

12978

25

60代

17696

38

70～74歳

14066

49

再掲

40～74歳(g)

51484

28.5

脳血管疾患

3674 人

(6.3)

患者数(b)

b/a

41

1.3

61

1.9

261

3.9

636

4.9

1196

6.8

1479

10.5

虚血性心疾患

11783 人

(20.3)

患者数(c)

c/a

126

4

214

6.5

797

11.8

2233

17.2

4195

23.7

4218

30

人工透析

-

(-)

患者数(d)

d/a

<10

-

<10

-

21

0.31

98

0.76

175

0.99

138

0.98

レセプト

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※ 40～74 歳

特定健診受診者(e)

(e/Y)

98814人

(54.7)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

180以上(f)

(f/e)

13042人

(13.2)

4732人

(4.8)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

25394 人 (25.7) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

2914 人

22 (j/f)

1247 人

26 (k/f)

180以上(k)

10128 人

78 (l/f)

3485 人

74 (m/f)

未治療(l, m)

その他のリスク

肥満

BMI 25以上

986人

(33.8)

3327人

(32.8)

高血糖

HbA1c6.5以上空腹時

305人

(10.5)

569人

(5.6)

高血圧

I 度高血圧以上

815人

(28)

2586人

(25.5)

臓器障害

眼底検査有所見者

8016

(8.1)

検査実施者(n)

240

(8.2)

有所見者(o)

35

(1.2)

検査実施者(p)

855

(8.4)

有所見者(q)

96

(0.9)

心電図結果有所見者

44127

(44.7)

検査実施者(n)

1214

(41.7)

有所見者(o)

434

(14.9)

検査実施者(p)

5166

(51)

有所見者(q)

1612

(15.9)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Schieieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした

(脂質異常症)

軽 症

重 症

人口	
※令和2年国勢調査人口等基本集計	
20688 人	
年代別	人数(T)
20代以下	5773
30代	2062
40代	3163
50代	3264
60代	4076
70～74歳	2350
再掲 40～74歳(Y)	12853

脂質異常症治療中	
2438 人 (11.8)	
年代別	患者数(a) 割合(a/T)
20代以下	54 0.9
30代	77 3.7
40代	244 7.7
50代	434 13.3
60代	852 20.9
70～74歳	777 33.1
再掲 40～74歳(g)	2307 17.9

脳血管疾患	
－ (－)	
患者数(b)	b/a
0	－
<10	－
11	4.5
23	5.3
54	6.3
83	10.7
171	7.4

虚血性心疾患	
－ (－)	
患者数(c)	c/a
<10	－
<10	－
16	6.6
28	6.5
123	14.4
141	18.1
308	13.4

人工透析	
<10 (－)	
患者数(d)	d/a
0	－
0	－
0	－
<10	－
<10	－
<10	－

レセプト

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

gのうち特定健診未受診の者(h)
1278 人（55.4）(h/g)

脂質異常(LDL-C)	
160以上(f) (f/e)	180以上(f') (f'/e)
738人 (11.9)	246人 (4)
特定健診 受診者(e) (e/Y)	6179人 (48.1)

脂質異常症治療中(i) (質問票・服薬有 レセプト有)	
1756 人 (28.4) (i/e)	
合計(j)	LDL160以上
146 人	180以上(k)
20 (j/f)	54 人
20 (j/f)	22 (k/f)
592 人	192 人
80 (l/f)	78 (m/f)
未治療(l, m)	

その他のリスク		
肥満 BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	高血糖 I 度高血圧 以上
61人 (41.8)	20人 (13.7)	40人 (27.4)
177人 (29.9)	38人 (6.4)	153人 (25.8)

臓器障害		
眼底検査有所見者	詳細健診実施者(m)	心電図結果素所見者
576 (9.3)	3095 (50.1)	3095 (50.1)
：	：	：
検査率施者(n)	検査率施者(o)	検査率施者(p)
実施率(n/j)	実施率(o/l)	実施率(p/i)
<10 (－)	<10 (－)	<10 (－)
有所見者(o)	有所見者(o)	有所見者(o)
有所見率(o/j)	有所見率(o/l)	有所見率(o/i)
<10 (－)	<10 (－)	<10 (－)
検査率施者(n)	検査率施者(o)	検査率施者(p)
実施率(n/j)	実施率(o/l)	実施率(p/i)
68 (46.6)	52 (8.8)	308 (52)
有所見者(o)	有所見者(o)	有所見者(o)
有所見率(o/j)	有所見率(o/l)	有所見率(o/i)
31 (21.2)	<10 (－)	98 (16.6)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、
Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした

特定健診 ※40～74歳

軽 症				→ 重 症			
人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計				脂質異常症治療中			
49401 人				4196 人 (8.5)			
年代別	人数(T)			年代別	患者数(a)	割合(a/T)	
20代以下	18124			20代以下	172	0.9	
30代	7085			30代	205	2.9	
40代	8721			40代	544	6.2	
50代	6663			50代	912	13.7	
60代	5549			60代	1311	23.6	
70～74歳	3259			70～74歳	1052	32.3	
再掲 40～74歳(Y)	24192	再掲 40～74歳(g)	3819	15.8	gのうち特定健診未受診の者(h)		
				1819 人 (47.6) (h/g)			
レセプト				その他のリスク			
				肥満	高血糖	高血圧	
				BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上	I 度高血圧 以上	
				126人 (37.3)	35人 (10.4)	88人 (26)	
				492人 (36.3)	73人 (5.4)	345人 (25.5)	
				臓器障害			
				眼底検査有所見者			
				心電図結果有所見者			
				1124 (8.6)			
				5920 (45.1)			
				詳細健診実施者(m)			
				(m/e)			
				検査実施者(n)			
				実施率(n/j)			
				31 (9.2)			
				152 (45)			
				有所見者(o)			
				有所見率(o/j)			
				<10 (-)			
				43 (12.7)			
				検査実施者(p)			
				実施率(p/l)			
				125 (9.2)			
				694 (51.3)			
				有所見者(q)			
				有所見率(q/l)			
				20 (1.5)			
				185 (13.7)			
				※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか 眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、 Scheie、いずれかの分類で2以上の結果を所見有とします			

特定健診 受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	180以上(f) (f/e)
13115人 (54.2)	1692人 (12.9)	610人 (4.7)

特定健診 ※ 40～74 歳	脂質異常症治療中(i) (質問票 服薬有 レセプト有)	3087 人 (23.5) (i/e)
	合計(j)	
	LDL160以上	180以上(k)
	338 人	147 人
	20 (j/f)	24 (k/f)
	1354 人	463 人
	80 (l/f)	76 (m/f)
	未治療(l, m)	

gのうち特定健診未受診の者(h)
1819 人 (47.6) (h/g)

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

※令和3年度 本巢市（総数）

（脂質異常症）

軽 症		重 症	
人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計 27780 人		脂質異常症治療中 2045 人 (7.4)	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	8978	49	0.5
30代	3066	47	1.5
40代	4734	170	3.6
50代	3963	441	11.1
60代	4302	694	16.1
70～74歳	2737	644	23.5
再掲 40～74歳(Y)	15736	再掲 40～74歳(g)	12.4
レセプト		gのうち特定健診未受診の者(h) 950 人 (48.7) (h/g)	
		注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。	
特定健診 ※ 40～74 歳		脂質異常症治療中(i) (質問票 服薬有 レセプト有) 2051 人 (24.4) (i/e)	
特定健診 受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	合計(j) LDL160以上 207 人 21 (j/f)	180以上(k) 77 人 25 (k/f)
8402人 (53.4)	967人 (11.5)	309人 (3.7)	
		760 人 79 (i/f)	232 人 75 (m/f)
		未治療(l, m)	
		その他のリスク	
		肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上
		80人 (38.6)	22人 (10.6)
			46人 (22.2)
		269人 (35.4)	30人 (3.9)
		173人 (22.8)	
		臓器障害	
		詳細健診実施者(m)	眼底検査有所見者 心電図結果有所見者
		(m/e)	586 (7) 3825 (45.5)
		検査実施者(n) 実施率(n/j)	10 (4.8) 84 (40.6)
		有所見者(o) 有所見率(o/j)	<10 (-) 31 (15)
		検査実施者(p) 実施率(p/l)	62 (8.2) 426 (56.1)
		有所見者(q) 有所見率(q/l)	<10 (-) 130 (17.1)
		※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか 眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、 Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見とした	

※令和3年度 岐南町(総数)

(脂質異常症)

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

22557 人

年代別

人数(T)

20代以下

8030

30代

3464

40代

3933

50代

3092

60代

2497

70～74歳

1541

再掲

40～74歳(Y)

11063

レセプト

軽 症

脂質異常症治療中

3194 人
(14.2)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

94

1.2

30代

222

6.4

40代

546

13.9

50代

867

28

60代

875

35

70～74歳

590

38.3

再掲

40～74歳(g)

2878

26

gのうち特定健診未受診の者(h)

1485 人 (51.6) (h/g)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人

(14)

高血圧

I 度高血圧
以上

52人

(28)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

1357 人 (23.4) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

186 人

78 人

23 (j/f)

25 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)

(f/e)

810人

(14)

313人

(5.4)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

5788人

(52.3)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

72人

(38.7)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹

※令和3年度 笠松町(総数)

(脂質異常症)

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

18530 人

年代別

人数(T)

20代以下

6036

30代

2391

40代

3313

50代

2887

60代

2368

70～74歳

1535

再掲

40～74歳(Y)

10103

脂質異常症治療中

5017 人
(27.1)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

84

1.4

30代

163

6.8

40代

516

15.6

50代

1136

39.3

60代

1662

70.2

70～74歳

1456

94.9

再掲

40～74歳(g)

4770

47.2

脳血管疾患

-
(-)

患者数(b)

b/a

<20

-

<20

-

29

5.6

89

7.8

183

11

191

13.1

虚血性心疾患

-
(-)

患者数(c)

c/a

<20

-

<20

-

64

12.4

208

18.3

344

20.7

420

28.8

人工透析

-
(-)

患者数(d)

d/a

0

-

0

-

<20

-

<20

-

29

1.74

27

1.85

再掲

40～74歳

79

1.66

レセプト

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※40～74歳

特定健診受診者(e)
(e/Y)

5193人
(51.4)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)
(f/e)

692人
(13.3)

180以上(f')
(f'/e')

233人
(4.5)

合計(j)

LDL160以上

185 人

27 (j/f)

180以上(k)

76 人

33 (k/f)

脂質異常(LDL-C)

180以上(f')
(f'/e')

233人
(4.5)

507 人

73 (l/f)

157 人

67 (m/f)

未治療(l, m)

その他のリスク

肥満

BMI 25以上

70人
(37.8)

173人
(34.1)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

26人
(14.1)

<20
(-)

高血圧

I 度高血圧
以上

48人
(25.9)

133人
(26.2)

臓器障害

眼底検査有所見者

心電図結果有所見者

詳細健診実施者(m)
(m/e)

342
(6.6)

2818
(54.3)

検査実施者(n)
実施率(n/j)

<20
(-)

92
(49.7)

有所見者(o)
有所見率(o/j)

<20
(-)

20
(10.8)

検査実施者(p)
実施率(p/l)

31
(6.1)

280
(55.2)

有所見者(q)
有所見率(q/l)

<20
(-)

91
(17.9)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、
Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした

軽 症				重 症			
人口				脂質異常症治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				1735 人 (11)			
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)	
20代以下		5306		51		1	
30代		2077		57		2.7	
40代		2799		184		6.6	
50代		2401		392		16.3	
60代		2048		580		28.3	
70～74歳		1187		471		39.7	
再掲		8435		再掲		1627	
40～74歳(Y)				40～74歳(g)		19.3	
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h)			
				1008 人 (62) (h/g)			
注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。							
特定健診 ※ 40～74 歳				その他のリスク			
特定健診受診者(e) (e/Y)		脂質異常(LDL-C)		肥満		高血糖	
160以上(f) (f/e)		180以上(f) (f/e)		BMI 25以上		HbA1c6.5以上 空腹時126以上	
4177人 (49.5)		545人 (13)		29人 (31.9)		<20 (-)	
		209人 (5)		29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20 (-)	
				29人 (31.9)		<20	

軽 症										重 症									
人口										脂質異常症治療中									
※令和2年国勢調査人口等基本集計										22372 人 (16.7)									
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)		患者数(b)		b/a		患者数(c)		c/a		患者数(d)		d/a	
20代以下		43137		838		1.9		11		1.3		69		8.2		0		-	
30代		17456		1181		6.8		30		2.5		136		11.5		<10		-	
40代		22764		2725		12		87		3.2		393		14.4		<10		-	
50代		20614		4755		23.1		238		5		940		19.8		50		1.05	
60代		18841		7039		37.4		451		6.4		1908		27.1		50		0.71	
70～74歳		11036		5834		52.9		570		9.8		2012		34.5		53		0.91	
再掲		73255		20353		27.8		1346		6.6		5253		25.8		-		-	
40～74歳(Y)				40～74歳(g)															
レセプト										gのうち特定健診未受診の者(h)									
										11957 人 (58.7) (h/g)									
注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。																			

※令和3年度海津市(総数)

(脂質異常症)

軽症

重症

人口
※令和2年国勢調査人口等基本集計

27349人

年代別	人数(T)
20代以下	7367
30代	2928
40代	4298
50代	4382
60代	5367
70～74歳	3007

再掲	17054
40～74歳(Y)	

脂質異常症治療中

2700人(9.9)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	39	0.5
30代	72	2.5
40代	250	5.8
50代	523	11.9
60代	1006	18.7
70～74歳	810	26.9

再掲	2589	15.2
40～74歳(g)		

脳血管疾患

-(-)

患者数(b)	b/a
0	-
<10	-
<10	-
18	3.4
52	5.2
61	7.5

虚血性心疾患

-(-)

患者数(c)	c/a
<10	-
<10	-
27	10.8
81	15.5
178	17.7
182	22.5

人工透析

<10(-)

患者数(d)	d/a
0	-
<10	-
<10	-
<10	-
<10	-
<10	-

レセプト

注意・レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※40～74歳

特定健診受診者(e)(e/Y)	脂質異常(LDL-C)
8135人(47.7)	160以上(f)(f/e) 989人(12.2)
	180以上(f')(f'/e') 353人(4.3)

脂質異常症治療中(i)(質問票・服薬有・レセプト有)2195人(27)(i/e)	その他のリスク
合計(j) LDL160以上	肥満BMI25以上
186人	HbA1c6.5以上空腹時126以上
19(j/f)	高血糖
21(k/f)	高血圧I度高血圧以上
803人	67人(36)
81(l/f)	29人(15.6)
79(m/f)	56人(30.1)
未治療(l,m)	290人(36.1)
	53人(6.6)
	247人(30.8)

脂質異常症治療中(i)	臓器障害
(質問票・服薬有・レセプト有)2195人(27)(i/e)	眼底検査有所見者
合計(j) LDL160以上	詳細健診実施者(m)(m/e)
186人	517(6.4)
19(j/f)	4211(51.8)
21(k/f)	
803人	検査実施者(n)(n/i)
81(l/f)	11(5.9)
79(m/f)	84(45.2)
未治療(l,m)	有所見者(o)(o/j)
	<10
	有所見率(o'/j')
	(-)(22.6)
	検査実施者(p)(p/l)
	63(7.8)
	422(52.6)
	有所見者(q)(q/l)
	12(1.5)
	136(16.9)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした

※令和3年度 養老町(総数)

(脂質異常症)

軽症

重症

人口
※令和2年国勢調査人口等基本集計

22484人

年代別	人数(T)
20代以下	6244
30代	2361
40代	3599
50代	3486
60代	4345
70～74歳	2449

再掲 40～74歳(Y)	13879
-----------------	-------

脂質異常症治療中

2573人(11.4)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	52	0.8
30代	78	3.3
40代	243	6.8
50代	502	14.4
60代	938	21.6
70～74歳	760	31

再掲 40～74歳(g)	2443	17.6
-----------------	------	------

脳血管疾患

-(-)

患者数(b)	b/a
<10	-
<10	-
<10	-
21	4.2
104	11.1
97	12.8

虚血性心疾患

-(-)

患者数(c)	c/a
<10	-
<10	-
17	7
72	14.3
209	22.3
235	30.9

人工透析

-(-)

患者数(d)	d/a
0	-
0	-
<10	-
<10	-
<10	-
<10	-

レセプト

gのうち特定健診未受診の者(h)
1324人(54.2)(h/g)

注意・レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

脂質異常(LDL-C)

特定健診受診者(e)(e/Y)	7017人(50.6)
160以上(f)(f/e)	875人(12.5)
180以上(f')(f'/e')	307人(4.4)

脂質異常症治療中(i)
(質問票・服薬有・レセプト有)
1796人(25.6)(i/e)

合計(j)	LDL160以上	180以上(k)
186人	67人	22(k/f)
21(j/f)	22(k/f)	

再掲	689人	240人
79(l/f)	78(m/f)	
未治療(l,m)		

その他のリスク

肥満BMI25以上	高血糖HbA1c6.5以上空腹時126以上	高血圧I度高血圧以上
80人(43)	28人(15.1)	75人(40.3)

検査実施者(o)	15(8.1)
実施率(o/j)	(46.2)
有所見者(o)	0
有所見率(o/j)	(18.3)

検査実施者(p)	63(9.1)
実施率(p/l)	(51.4)
有所見者(q)	<10
有所見率(q/l)	(17.1)

臓器障害

眼底検査有所見者	589(8.4)
詳細健診実施者(m)	3297(47)

検査実施者(r)	15(8.1)
実施率(r/i)	(46.2)
有所見者(s)	0
有所見率(s/i)	(18.3)

検査実施者(u)	63(9.1)
実施率(u/v)	(51.4)
有所見者(w)	<10
有所見率(w/v)	(17.1)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした

軽 症				→ 重 症			
人口				脂質異常症治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				1934 人 (8.7)			
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)	
20代以下		6775		15		0.2	
30代		2611		49		1.9	
40代		3736		169		4.5	
50代		3296		382		11.6	
60代		3534		709		20.1	
70～74歳		2242		610		27.2	
再掲		12808		再掲		1870	
40～74歳(Y)				40～74歳(g)		14.6	
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h)			
				1386 人 (74.1) (h/g)			
特定健診 ※ 40～74 歳				その他のリスク			
特定健診受診者(e) (e/Y)		脂質異常(LDL-C)		肥満		高血糖	
160以上(f) (f/e)		180以上(f) (f/e)		BMI 25以上		HbA1c6.5以上 空腹時126以上	
6101人 (47.6)		850人 (13.9)		62人 (45.3)		15人 (10.9)	
		311人 (5.1)				32人 (23.4)	
				265人 (37.2)		39人 (5.5)	
						214人 (30)	
臓器障害				虚血性心疾患			
				詳細健診実施者(m) (m/e)		患者数(c) c/a	
				942 (15.4)		-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	

※令和3年度 輪之内町（総数）

（脂質異常症）

軽 症				重 症			
人口				脂質異常症治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				-			
8415 人				(-)			
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)	
20代以下		2803		<20		-	
30代		1117		<20		-	
40代		1467		49		3.3	
50代		1093		105		9.6	
60代		1257		244		19.4	
70～74歳		678		225		33.2	
再掲		4495		再掲		623 13.9	
40～74歳(Y)				40～74歳(g)			
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h)			
				332 人 (53.3) (h/g)			
				注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。			
特定健診 ※ 40～74 歳				脂質異常症治療中(i)			
				(質問票 服薬有 レセプト有)			
				589 人 (23.7) (i/e)			
				合計(j)			
				LDL160以上			
				180以上(k)			
				63 人			
				29 人			
				21 (j/f)			
				27 (k/f)			
				241 人			
				80 人			
				79 (l/f)			
				73 (m/f)			
				未治療(l, m)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				304人			
				109人			
				2485人			
				(55.3)			

軽 症										重 症									
人口										脂質異常症治療中									
※令和2年国勢調査人口等基本集計										1327 人 (10.8)									
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)		患者数(b)		b/a		患者数(c)		c/a		患者数(d)		d/a	
20代以下		3919		28		0.7		<20		-		<20		-		0		-	
30代		1367		32		2.3		<20		-		<20		-		0		-	
40代		2259		122		5.4		<20		-		<20		-		<20		-	
50代		1805		286		15.8		<20		-		20		7		0		-	
60代		1774		445		25.1		27		6.1		51		11.5		<20		-	
70～74歳		1145		414		36.2		34		8.2		64		15.5		0		-	
再掲		6983		1267		18.1		73		5.8		-		-		<20		-	
40～74歳(Y)				40～74歳(g)															
レセプト										gのうち特定健診未受診の者(h)									
										579 人 (45.7) (h/g)									
注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。																			
特定健診 ※ 40～74 歳										その他のリスク									
特定健診受診者(e)(e/Y)		160以上(f)(f/e)		180以上(f')(f'/e')		合計(j)		BMI 25以上		HbA1c6.5以上 空腹時126以上		高血糖		高血圧		臓器障害		眼底検査者所見者 心電図結果者所見者	
3957人 (56.7)		522人 (13.2)		190人 (4.8)		LDL160以上		53人 (41.4)		20人 (15.6)		20人 (15.6)		37人 (28.9)		検査実施者(n) 実施率(n/j)		220 (5.6)	
						128 人										<20 (-)		2258 (57.1)	
						25 (j/f)										<20 (-)			
						394 人										検査実施者(p) 実施率(p/l)			
						75 (l/f)										<20 (-)		27 (6.9)	
						未治療(l, m)										有所見者(q) 有所見率(q/l)		214 (54.3)	
																<20 (-)		66 (16.8)	
※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか										眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheie、いずれかの分類で2以上の結果を所見とした									

※令和3年度 揖斐川町（総数）

（脂質異常症）

軽 症				重 症			
人口				脂質異常症治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				2307 人 (14.8)			
15579 人				脳血管疾患			
年代別		人数(T)		患者数(b)		患者数(c)	
20代以下		4266		<20		<20	
30代		1510		<20		<20	
40代		2381		<20		<20	
50代		2422		<20		<20	
60代		3073		46		160	
70～74歳		1927		61		218	
再掲 40～74歳(Y)		9803		132		455	
再掲 40～74歳(g)		2171		6.1		21	
再掲 40～74歳(h)		22.1		35		1.61	
レセプト				人工透析			
				患者数(d)			
				0			
				患者数(e)			
				<20			
				患者数(f)			
				<20			
				患者数(g)			
				23			
				11.5			
				54			
				13.1			
				160			
				20.3			
				218			
				28.4			
				患者数(h)			
				218			
				28.4			
				患者数(i)			
				218			
				28.4			
				患者数(j)			
				218			
				28.4			
				患者数(k)			
				218			
				28.4			
				患者数(l)			
				218			
				28.4			
				患者数(m)			
				218			
				28.4			
				患者数(n)			
				218			
				28.4			
				患者数(o)			
				218			
				28.4			
				患者数(p)			
				218			
				28.4			
				患者数(q)			
				218			
				28.4			
				患者数(r)			
				218			
				28.4			
				患者数(s)			
				218			
				28.4			
				患者数(t)			
				218			
				28.4			
				患者数(u)			
				218			
				28.4			
				患者数(v)			
				218			
				28.4			
				患者数(w)			
				218			
				28.4			
				患者数(x)			
				218			
				28.4			
				患者数(y)			
				218			
				28.4			
				患者数(z)			
				218			
				28.4			
				患者数(aa)			
				218			
				28.4			
				患者数(ab)			
				218			
				28.4			
				患者数(ac)			
				218			
				28.4			
				患者数(ad)			
				218			
				28.4			
				患者数(ae)			
				218			
				28.4			
				患者数(af)			
				218			
				28.4			
				患者数(ag)			
				218			
				28.4			
				患者数(ah)			
				218			
				28.4			
				患者数(ai)			
				218			
				28.4			
				患者数(aj)			
				218			
				28.4			
				患者数(ak)			
				218			
				28.4			
				患者数(al)			
				218			
				28.4			
				患者数(am)			
				218			
				28.4			
				患者数(an)			
				218			
				28.4			
				患者数(ao)			
				218			
				28.4			
				患者数(ap)			
				218			
				28.4			
				患者数(aq)			
				218			
				28.4			
				患者数(ar)			
				218			
				28.4			
				患者数(as)			
				218			
				28.4			
				患者数(at)			
				218			
				28.4			
				患者数(au)			
				218			
				28.4			
				患者数(av)			
				218			
				28.4			
				患者数(aw)			
				218			
				28.4			
				患者数(ax)			
				218			
				28.4			
				患者数(ay)			
				218			
				28.4			
				患者数(az)			
				218			
				28.4			
				患者数(ba)			
				218			
				28.4			
				患者数(bb)			
				218			
				28.4			
				患者数(bc)			
				218			
				28.4			
				患者数(bd)			
				218			
				28.4			
				患者数(be)			
				218			
				28.4			
				患者数(bf)			
				218			
				28.4			
				患者数(bg)			
				218			
				28.4			
				患者数(bh)			
				218			
				28.4			
				患者数(bi)			
				218			
				28.4			
				患者数(bj)			
				218			
				28.4			
				患者数(bk)			
				218			
				28.4			
				患者数(bl)			
				218			
				28.4			
				患者数(bm)			
				218			
				28.4			
				患者数(bn)			
				218			
				28.4			
				患者数(bo)			
				218			
				28.4			
				患者数(bp)			
				218			
				28.4			
				患者数(bq)			
				218			
				28.4			
				患者数(br)			
				218			
				28.4			
				患者数(bs)			
				218			
				28.4			
				患者数(bt)			
				218			
				28.4			
				患者数(bu)			
				218			
				28.4			
				患者数(bv)			
				218			
				28.4			
				患者数(bw)			
				218			
				28.4			
				患者数(bx)			
				218			
				28.4			
				患者数(by)			
				218			
				28.4			
				患者数(bz)			
				218			
				28.4			
				患者数(ca)			
				218			
				28.4			
				患者数(cb)			
				218			
				28.4			
				患者数(cc)			
				218			
				28.4			
				患者数(cd)			
				218			
				28.4			
				患者数(ce)			
				218			
				28.4			
				患者数(cf)			
				218			
				28.4			
				患者数(cg)			
				218			
				28.4			
				患者数(ch)			
				218			
				28.4			
				患者数(ci)			
				218			
				28.4			
				患者数(cj)			
				218			
				28.4			
				患者数(ck)			
				218			
				28.4			
				患者数(cl)			
				218			
				28.4			
				患者数(cm)			
				218			
				28.4			
				患者数(cn)			
				218			
				28.4			
				患者数(co)			
				218			
				28.4			
				患者数(cp)			
				218			
				28.4			
				患者数(cq)			
				218			
				28.4			
				患者数(cr)			
				218			
				28.4			
				患者数(cs)			
				218			
				28.4			
				患者数(ct)			
				218			
				28.4			
				患者数(cu)			
				218			
				28.4			
				患者数(cv)			
				218			
				28.4			
				患者数(cw)			
				218			
				28.4			
				患者数(cx)			
				218			
				28.4			
				患者数(cy)			
				218			
				28.4			
				患者数(cz)			
				218			
				28.4			
				患者数(da)			
				218			
				28.4			
				患者数(db)			
				218			
				28.4			
				患者数(dc)			
				218			
				28.4			
				患者数(dd)			
				218			
				28.4			
				患者数(de)			
				218			
				28.4			
				患者数(df)			
				218			
				28.4			
				患者数(dg)			
				218			
				28.4			
				患者数(dh)			
				218			
				28.4			
				患者数(di)			
				218			
				28.4			
				患者数(dj)			
				218			
				28.4			
				患者数(dk)			
				218			
				28.4			
				患者数(dl)			
				218			
				28.4			
				患者数(dm)			
				218			
				28.4			
				患者数(dn)			
				218			
				28.4			
				患者数(do)			
				218			
				28.4			
				患者数(dp)			
				218			
				28.4			
				患者数(dq)			
				218			
				28.4			
				患者数(dr)			
				218			
				28.4			
				患者数(ds)			
				218			
				28.4			
				患者数(dt)			
				218			
				28.4			
				患者数(du)			
				218			
				28.4			
				患者数(dv)			
				218			
				28.4			
				患者数(dw)			
				218			
				28.4			
				患者数(dx)			
				218			
				28.4			
				患者数(dy)			
				218			
				28.4			
				患者数(dz)			
				218			
				28.4			
				患者数(ea)			
				218			
				28.4			
				患者数(eb)			
				218			
				28.4			
				患者数(ec)			
				218			
				28.4			
				患者数(ed)			
				218			
				28.4			
				患者数(ee)			
				218			
				28.4			
				患者数(ef)			
				218			
				28.4			
				患者数(eg)			
				218			
				28.4			
				患者数(eh)			
				218			
				28.4			
				患者数(ei)			
				218			
				28.4			
				患者数(ej)			
				218			
				28.4			
				患者数(ek)			
				218			
				28.4			
				患者数(el)			
				218			
				28.4			
				患者数(em)			
				218			
				28.4			
				患者数(en)			
				218			
				28.4			
				患者数(eo)			
				218			
				28.4			
				患者数(ep)			
				218			
				28.4			
				患者数(eq)			
				218			
				28.4			
				患者数(er)			
				218			
				28.4			
				患者数(es)			
				218			
				28.4			
				患者数(et)			
				218			
				28.4			
				患者数(eu)			
				218			
				28.4			
				患者数(ev)			
				218			
				28.4			
				患者数(ew)			
				218			
				28.4			
				患者数(ex)			
				218			
				28.4			
				患者数(ey)			
				218			
				28.4			
				患者数(ez)			
				218			
				28.4			
				患者数(fa)			
				218			
				28.4			
				患者数(fb)			
				218			
				28.4			
				患者数(fc)			
				218			
				28.4			
				患者数(fd)			
				218			
				28.4			
				患者数(fe)			
				218			
				28.4			
				患者数(ff)			
				218			
				28.4			
				患者数(fg)			
				218			
				28.4			
				患者数(fh)			
				218			
				28.4			
				患者数(fi)			
				218			
				28.4			
				患者数(fj)			
				218			
				28.4			
				患者数(fk)			
				218			
				28.4			
				患者数(fl)			
				218			
				28.4			
				患者数(fm)			
				218			
				28.4			
				患者数(fn)			
				218			
				28.4			
				患者数(fo)			
				218			
				28.4			
				患者数(fp)			
				218			
				28.4			
				患者数(fq)			
				218			
				28.4			
				患者数(fr)			
				218			
				28.4			
				患者数(fs)			
				218			
				28.4			
				患者数(ft)			
				218			

※令和3年度 大野町(総数)

(脂質異常症)

軽 症										重 症													
人口										脂質異常症治療中													
※令和2年国勢調査人口等基本集計										1292 人 (6.9)													
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)				年代別		患者数(b)		b/a		患者数(c)		c/a		患者数(d)		d/a	
20代以下		5918		44		0.7				20代以下		<20		-		<20		-		0		-	
30代		2015		38		1.9				30代		<20		-		<20		-		0		-	
40代		3136		106		3.4				40代		<20		-		<20		-		0		-	
50代		2959		248		8.4				50代		<20		-		35		14.1		<20		-	
60代		2931		456		15.6				60代		<20		-		81		17.8		0		-	
70～74歳		1792		400		22.3				70～74歳		26		6.5		93		23.3		0		-	
再掲		10818		1210		11.2				再掲		48		4		-		-		<20		-	
40～74歳(Y)										40～74歳(g)													
レセプト										gのうち特定健診未受診の者(h)													
										603 人 (49.8) (h/g)													
特定健診 ※ 40～74 歳										その他のリスク													
特定健診受診者(e)(e/Y)		160以上(f)(f/e)		180以上(f')(f'/e')		脂質異常(LDL-C)				肥満		高血糖		高血圧		臓器障害							
5390人 (49.8)		753人 (14)		268人 (5)						BMI 25以上		HbA1c6.5以上空腹時126以上		I 度高血圧以上		眼底検査有所見者		心電図結果有所見者					
										55人 (32.5)		<20 (-)		56人 (33.1)		検査実施者(n)実施率(n/j)		347 (6.4)		2509 (46.5)			
										22 (j/f)		25 (k/f)				有所見者(o)有所見率(o/j)		:		:			
										584 人		68 人				検査実施者(p)実施率(p/l)		:		:			
										78 (l/f)		200 人				有所見者(q)有所見率(q/l)		:		:			
										未治療(l, m)		75 (m/f)				46 (7.9)		:		:			
										※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか 眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Schieie いずれの分類で2以上の結果を所見有として													

※令和3年度 池田町(総数)

(脂質異常症)

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

19818 人

年代別	人数(T)
20代以下	6437
30代	2176
40代	3338
50代	3044
60代	2990
70～74歳	1833

再掲

40～74歳(Y)

11205

脂質異常症治療中

577 人 (2.9)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	24	0.4
30代	24	1.1
40代	64	1.9
50代	117	3.8
60代	175	5.9
70～74歳	173	9.4

再掲

40～74歳(g)

529

4.7

脳血管疾患

- (-)

患者数(b)	b/a
0	-
0	-
<20	-
<20	-
<20	-
<20	-

24

4.5

虚血性心疾患

- (-)

患者数(c)	c/a
<20	-
0	-
<20	-
<20	-
29	16.6
33	19.1

84

15.9

人工透析

<20 (-)

患者数(d)	d/a
0	-
0	-
0	-
0	-
0	-
<20	-

<20

レセプト

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※ 40 ～ 74 歳

特定健診受診者(e)(e/Y)

5653 人 (50.5)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)(f/e)

696 人 (12.3)

239 人 (4.2)

脂質異常症治療中(i)(質問票、脂質有 レセプト有)

1062 人 (18.8) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

96 人

14 (j/f)

180以上(k)

46 人

19 (k/f)

600 人

86 (l/f)

193 人

81 (m/f)

未治療(l, m)

その他のリスク

肥満	高血糖	高血圧
BMI 25以上	HbA1c6.5以上空腹時126以上	I 度高血圧以上
45人 (46.9)	<20 (-)	25人 (26)

219人 (36.5)

26人 (4.3)

179人 (29.8)

臓器障害

眼底検査有所見者	心電図結果有所見者	
詳細健診実施者(m)(m/e)	415 (7.3)	3142 (55.6)
検査実施者(n)実施率(n/j)	<20 (-)	55 (57.3)
有所見者(o)有所見率(o/j)	<20 (-)	<20 (-)
検査実施者(p)実施率(p/i)	43 (7.2)	357 (59.5)
有所見者(q)有所見率(q/i)	<20 (-)	116 (19.3)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした。

※令和3年度 美濃市（総数）

（脂質異常症）

軽 症				重 症					
人口				脂質異常症治療中					
※令和2年国勢調査人口等基本集計				1971 人 (12.5)					
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)			
20代以下		4320		36		0.8			
30代		1792		39		2.2			
40代		2328		181		7.8			
50代		2404		332		13.8			
60代		3137		731		23.3			
70～74歳		1764		652		37			
再掲		9633		再掲		1896			
40～74歳(Y)				40～74歳(g)		19.7			
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h)					
				1055 人 (55.6) (h/g)					
				注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。					
特定健診 ※ 40～74 歳				脂質異常症治療中(i)					
				(質問票 服薬有 レセプト有)					
				1239 人 (27) (i/e)					
				合計(j)					
				LDL160以上		180以上(k)			
				137 人		65 人			
				20 (j/f)		25 (k/f)			
				565 人		193 人			
				80 (l/f)		75 (m/f)			
				未治療(l, m)					
				脂質異常(LDL-C)					
				160以上(f)		180以上(f)			
				702人 (f/e)		258人 (f/e)			
				4591人 (e/Y)		258人 (5.6)			
				特定健診受診者(e)					
				4591人 (47.7)					
				その他のリスク					
				肥満		高血糖			
				BMI 25以上		HbA1c6.5以上 空腹時126以上			
				38人 (27.7)		<20 (-)			
				42人 (30.7)		I 度高血圧以上			
				163人 (28.8)		20人 (3.5)			
				164人 (29)		高血圧			
				臓器障害					
				詳細健診実施者(m)		眼底検査有所見者			
				(m/e)		心電図結果有所見者			
				404 (8.8)		2576 (56.1)			
				検査実施者(n)		<20 (-)			
				71 (51.8)		検査実施率(n/j)			
				24 (17.5)		有所見者(o)			
				検査実施者(p)		49 (8.7)			
				343 (60.7)		検査実施率(p/q)			
				116 (20.5)		有所見者(q)			
				205 (37.8)		検査実施率(q/r)			
				205 (37.8)		205 (37.8)			

※令和3年度 郡上市(総数)

(脂質異常症)

[illegible]

(脂質異常症)

[illegible]

軽 症				重 症			
人口				脂質異常症治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				-			
6940 人				(-)			
年代別	人数(T)			年代別	患者数(a)	割合(a/T)	
20代以下	2219			20代以下	<20	-	
30代	925			30代	<20	-	
40代	1079			40代	48	4.4	
50代	970			50代	82	8.5	
60代	1129			60代	112	9.9	
70～74歳	618			70～74歳	86	13.9	
再掲	3796			再掲	328	8.6	
40～74歳(Y)				40～74歳(g)			
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h)			
				182 人 (55.5) (h/g)			
				注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。			
特定健診 ※ 40 ～ 74 歳				脂質異常症治療中(i)			
				(質問票 服薬有 レセプト有)			
				465 人 (23.8) (i/e)			
				合計(j)			
				LDL160以上			
				180以上(k)			
				48 人			
				20 人			
				19 (j/f)			
				23 (k/f)			
				199 人			
				67 人			
				81 (l/f)			
				77 (m/f)			
				未治療(l, m)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				180以上(f)			
				(f/e)			
				247人			
				87人			
				(12.6)			
				(4.4)			
				特定健診受診者(e)			
				(e/Y)			
				1957人			
				(51.6)			
				その他のリスク			
				肥満			
				BMI 25以上			
				HbA1c6.5以上			
				空腹時126以上			
				20人			
				(41.7)			
				高血糖			
				I 度高血圧以上			
				<20			
				(-)			
				高血圧			
				51人			
				(25.6)			
				臓器障害			
				眼底検査有所見者			
				心電図結果有所見者			
				詳細健診実施者(m)			
				236			
				(12.1)			
				検査実施者(n)			
				<20			
				(-)			
				26			
				(54.2)			
				有所見者(o)			
				<20			
				(-)			
				<20			
				(-)			
				検査実施者(p)			
				21			
				(10.6)			
				115			
				(57.8)			
				有所見者(q)			
				0			
				(-)			
				31			
				(15.6)			
				※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか			
				眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見有としない			

軽 症		重 症	
人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計 4678 人		脂質異常症治療中 - (-)	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	1444	<20	-
30代	634	<20	-
40代	726	<20	-
50代	625	38	6.1
60代	771	59	7.7
70～74歳	478	85	17.8
再掲 40～74歳(Y)	2600	-	-
レセプト		gのうち特定健診未受診の者(h) 94 人 (48.2) (h/g)	
		注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。	
特定健診 ※ 40～74 歳		脂質異常症治療中(i) (質問票 服薬有 レセプト有) 412 人 (28.7) (i/e)	
特定健診 受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	合計(j) LDL160以上	180以上(k)
1435人 (55.2)	161人 (11.2)	33 人	<20
		20 (j/f)	-
		128 人	52 人
		80 (l/f)	80 (m/f)
		未治療(l, m)	
		その他のリスク	
		肥満	高血糖
		BMI 25以上	HbA1c6.5以上 空腹時126以上
		<20 (-)	<20 (-)
		46人 (35.9)	35人 (27.3)
		臓器障害	
		詳細健診実施者(m)	眼底検査有所見者
		(m/e)	137 (9.5)
		検査実施者(n)	心電図結果有所見者
		実施率(n/j)	701 (48.9)
		有所見者(o)	<20 (-)
		有所見率(o/j)	<20 (-)
		検査実施者(p)	<20 (-)
		実施率(p/l)	61 (47.7)
		有所見者(q)	0
		有所見率(q/l)	20 (15.6)
		※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか 眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、 Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした	

軽 症				重 症			
人口				脂質異常症治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				-			
8185 人				患者数(a)			
年 代 別				割合(a/T)			
20代以下				20代以下			
2547				21			
992				30代			
1239				40代			
1283				50代			
1358				60代			
766				70～74歳			
再掲				再掲			
40～74歳(Y)				40～74歳(g)			
4646				660			
14.2				14.2			
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h)			
				363 人 (55) (h/g)			
				注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。			
特定健診 ※ 40～74 歳				脂質異常症治療中(i)			
(真間票 服薬有 レセプト有)				621 人 (24.2) (i/e)			
脂質異常(LDL-C)				合計(j)			
160以上(f)				LDL160以上			
(f/e)				180以上(k)			
338人				60 人			
(13.2)				18 (j/f)			
特定健診				278 人			
受診者(e)				82 (l/f)			
(e/Y)				未治療(l, m)			
2567人				96 人			
(55.3)				81 (m/f)			
				脂質異常(LDL-C)			
				160以上(f)			
				(f/e)			
				180以上(f)			
				(f/e)			
				118人			
				(4.6)			
				その他のリスク			
				肥満			
				BMI			
				25以上			
				22人			
				(36.7)			
				HbA1c6.5以上			
				空腹時126以上			
				<20			
				(-)			
				高血圧			
				I 度高血圧			
				以上			
				<20			
				(-)			
				臓器障害			
				眼底検査有所見者			
				273			
				(10.6)			
				心電図結果有所見者			
				1148			
				(44.7)			
				虚血性心疾患			
				患者数(c)			
				c/a			
				0			
				-			
				<20			
				-			
				<20			
				-			
				23			
				9.2			
				20			
				11.4			
				61			
				9.2			
				-			
				人工透析			
				患者数(d)			
				d/a			
				0			
				-			
				<20			
				-			
				<20			
				-			
				20			
				0			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
</							

軽 症		重 症	
人口 ※令和2年国勢調査人口等基本集計 2533 人		脂質異常症治療中 - (-)	
年代別	人数(T)	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	605	<20	-
30代	207	0	-
40代	313	<20	-
50代	426	<20	-
60代	630	29	4.6
70～74歳	352	36	10.2
再掲 40～74歳(Y)	1721	81	4.7
レセプト		gのうち特定健診未受診の者(h) 50 人 (61.7) (h/g)	
特定健診 ※ 40 ～ 74 歳		脂質異常症治療中(i) (質問票 服薬有 レセプト有) 207 人 (21.2) (i/e)	
特定健診 受診者(e) (e/Y)	脂質異常(LDL-C) 160以上(f) (f/e)	合計(j) LDL160以上	180以上(k)
978人 (56.8)	100～118 (-)	<20	<20
	28～46 (-)	-	-
		99 人	27 人
		91 (l/f)	93 (m/f)
		未治療(l, m)	
		その他のリスク	
		肥満 BMI 25以上	高血糖 HbA1c6.5以上 空腹時126以上
		<20 (-)	<20 (-)
		28人 (28.3)	29人 (29.3)
		臓器障害	
		詳細健診実施者(m)	眼底検査有所見者 心電図結果有所見者
		(m/e)	167 (17.1)
		検査実施者(n) 実施率(n/j)	<20 (-)
		有所見者(o) 有所見率(o/j)	0 (-)
		検査実施者(p) 実施率(p/l)	<20 (-)
		有所見者(q) 有所見率(q/l)	0 (-)
		62 (62.6)	<20 (-)
		※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか 眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、 Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした	

軽 症				重 症			
人口				脂質異常症治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				(-)			
7975 人				患者数(a) 割合(a/T)			
年代別				患者数(b) b/a			
20代以下				21 1			
30代				<20 -			
40代				33 2.9			
50代				71 5.5			
60代				163 9.6			
70～74歳				156 16.2			
再掲				再掲			
40～74歳(Y)				40～74歳(g)			
5103				423 8.3			
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h)			
				208 人 (49.2) (h/g)			
				注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。			
特定健診 ※ 40～74 歳				脂質異常(LDL-C)			
特定健診受診者(e)				160以上(f)			
(e/Y)				(f/e)			
2706人				180以上(f)			
(53)				(f/e)			
				359人			
				(13.3)			
				133人			
				(4.9)			
				合計(j)			
				LDL160以上			
				58 人			
				25 人			
				16 (j/f)			
				19 (k/f)			
				301 人			
				108 人			
				84 (l/f)			
				81 (m/f)			
				未治療(l, m)			
				その他のリスク			
				肥満			
				BMI			
				25以上			
				20人			
				(34.5)			
				HbA1c6.5以上			
				空腹時126以上			
				<20			
				(-)			
				高血圧			
				I 度高血圧			
				以上			
				<20			
				(-)			
				臓器障害			
				眼底検査有所見者			
				296			
				(10.9)			
				詳細健診実施者(m)			
				(m/e)			
				1290			
				(47.7)			
				検査実施者(n)			
				<20			
				(-)			
				27			
				(46.6)			
				有所見者(o)			
				0			
				<20			
				(-)			
				検査実施者(p)			
				28			
				(9.3)			
				165			
				(54.8)			
				有所見者(q)			
				<20			
				(-)			
				53			
				(17.6)			
				※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか 眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、 Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした			

※令和3年度 白川町(総数)

(脂質異常症)

軽 症		重 症	
人口		脂質異常症治療中	
※令和2年国勢調査人口等基本集計		－ (－)	
5389 人		患者数(a) 割合(a/T)	
年代別	人数(T)	－	
20代以下	1153	－	
30代	459	－	
40代	706	4.2	
50代	987	7	
60代	1334	13.3	
70～74歳	750	20.8	
再掲	3777	432	
40～74歳(Y)		11.4	
再掲		40～74歳(g)	
246 人 (56.9) (h/g)		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	
再掲		14.8	
再掲		24	
再掲		5.6	
再掲		64	

軽 症				重 症			
人口				脂質異常症治療中			
※令和2年国勢調査人口等基本集計				-			
14690 人				(-)			
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)	
20代以下		4362		<20		-	
30代		1841		24		1.3	
40代		2276		87		3.8	
50代		2120		175		8.3	
60代		2653		459		17.3	
70～74歳		1438		384		26.7	
再掲		40～74歳(Y)		再掲		40～74歳(g)	
8487				1105		13	
レセプト				gのうち特定健診未受診の者(h)			
				812 人 (73.5) (h/g)			
特定健診 ※ 40～74 歳				その他のリスク			
特定健診受診者(e) (e/Y)		脂質異常(LDL-C)		肥満		高血糖	
160以上(f) (f/e)		180以上(f) (f/e)		BMI 25以上		HbA1c6.5以上 空腹時126以上	
4834人 (57)		242人 (5)		44人 (35.2)		<20 (-)	
						39人 (31.2)	
				163人 (33.3)		28人 (5.7)	
						123人 (25.1)	

※令和3年度 多治見市（総数）

（脂質異常症）

軽 症										重 症									
人口										人工透析									
※ 令和2年国勢調査人口等基本集計										-									
89260 人										(-)									
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)		患者数(b)		b/a		患者数(c)		c/a		患者数(d)		d/a	
20代以下		26138		1033		4		41		4		65		6.3		0		-	
30代		10425		783		7.5		41		5.2		89		11.4		<10		-	
40代		14406		1827		12.7		97		5.3		214		11.7		<10		-	
50代		14769		3698		25		196		5.3		534		14.4		18		0.49	
60代		14577		5388		37		370		6.9		893		16.6		29		0.54	
70～74歳		8945		4381		49		450		10.3		977		22.3		48		1.1	
再掲		52697		15294		29		1113		7.3		2618		17.1		-		-	
40～74歳(Y)																			
レセプト										gのうち特定健診未受診の者(h)									
										10584 人 (69.2) (h/g)									
注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。																			
特定健診 ※ 40～74 歳										臓器障害									
脂質異常(LDL-C)										眼底検査有所見者 心電図結果有所見者									
特定健診受診者(e) (e/Y)		160以上(f) (f/e)		180以上(f) (f/e)		合計(j)		HbA1c6.5以上空腹時126以上		高血圧 I 度高血圧以上		詳細健診実施者(m) (m/e)		2411 (8.6)		13856 (49.7)			
27887人 (52.9)		3531人 (12.7)		1291人 (4.6)		LDL160以上		57人 (8.7)		185人 (28.4)									
						652 人		220人 (33.7)		220人 (33.7)									
						18 (j/f)													
						259 人													
						20 (k/f)													
						2879 人													
						1032 人													
						82 (l/f)													
						80 (m/f)													
						未治療(l, m)													
						検査実施者(n) 実施率(n/j)													
						65 (10)													
						有所見者(o) 有所見率(o/j)													
						<10 (-)													
						379 (58.1)													
						検査実施者(o) 実施率(o/l)													
						243 (8.4)													
						有所見者(q) 有所見率(q/l)													
						22 (0.8)													
						451 (15.7)													
※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか 眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした																			

(脂質異常症)

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

30683 人

年代別

人数(T)

20代以下

9592

30代

3808

40代

4767

50代

4800

60代

4869

70～74歳

2847

再掲

40～74歳(Y)

17283

軽 症

脂質異常症治療中

4027 人
(13.1)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

252

2.6

30代

212

5.6

40代

461

9.7

50代

824

17.2

60代

1273

26.1

70～74歳

1005

35.3

再掲

40～74歳(g)

3563

20.6

gのうち特定健診未受診の者(h)

2218 人 (62.3) (h/g)

重 症

脳血管疾患

350 人
(8.7)

患者数(b)

b/a

11

4.4

21

9.9

23

5

51

6.2

89

7

155

15.4

318

8.9

虚血性心疾患

-
(-)

患者数(c)

c/a

<10

-

13

6.1

43

9.3

99

12

177

13.9

222

22.1

541

15.2

人工透析

-
(-)

患者数(d)

d/a

0

-

<10

-

<10

-

<10

-

<10

-

14

1.39

29

0.81

レセプト

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

脂質異常(LDL-C)

特定健診受診者(e)
(e/Y)

9320人
(53.9)

160以上(f)
(f/e)

1269人
(13.6)

180以上(f)
(f/e)

431人
(4.6)

脂質異常症治療中(i)
(質問票 服薬有 レセプト有)
1933 人 (20.7) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

220 人

17 (j/f)

180以上(k)

81 人

19 (k/f)

肥満

BMI
25以上

81人
(36.8)

320人
(30.5)

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

30人
(13.6)

65人
(6.2)

高血圧

I 度高血圧
以上

74人
(33.6)

292人
(27.8)

その他のリスク

臓器障害

眼底検査有所見者

詳細健診実施者(m)
(m/e)

626
(6.7)

4959
(53.2)

検査実施者(n)
実施率(n/j)

18
(8.2)

108
(49.1)

有所見者(o)
有所見率(o/j)

<10
(-)

32
(14.5)

検査実施者(p)
実施率(p/l)

83
(7.9)

568
(54.1)

有所見者(q)
有所見率(q/l)

<10
(-)

169
(16.1)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした

※令和3年度 土岐市（総数）

（脂質異常症）

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

45636 人

年代別	人数(T)
20代以下	13534
30代	5537
40代	7432
50代	7418
60代	7295
70～74歳	4420
再掲 40～74歳(Y)	26565

脂質異常症治療中

5488 人
(12)

年代別	患者数(a)	割合(a/T)
20代以下	188	1.4
30代	193	3.5
40代	485	6.5
50代	1101	14.8
60代	1891	25.9
70～74歳	1630	36.9
再掲 40～74歳(g)	5107	19.2

脳血管疾患

－
(－)

患者数(b)	b/a
<10	－
<10	－
20	4.1
43	3.9
110	5.8
121	7.4
294	5.8

虚血性心疾患

－
(－)

患者数(c)	c/a
<10	－
10	5.2
28	5.8
97	8.8
203	10.7
247	15.2
575	11.3

人工透析

－
(－)

患者数(d)	d/a
0	－
<10	－
<10	－
<10	－
12	0.74
38	0.74

レセプト

gのうち特定健診未受診の者(h)

3580 人 (70.1) (h/g)

注意：レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、
そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※ 40 歳以上 74 歳未満

特定健診受診者(e)
(e/Y)

15006人
(56.5)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)
(f/e)

2034人
(13.6)

180以上(f)
(f/e)

745人
(5)

脂質異常症治療中(i)
(質問票 脂質有 レセプト有)

3174 人 (21.2) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

341 人

17 (j/f)

180以上(k)

129 人

17 (k/f)

1693 人

83 (l/f)

616 人

83 (m/f)

未治療(l, m)

その他のリスク

肥満

BMI
25以上

133人
(39)

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

49人
(14.4)

高血糖

105人
(30.8)

高血圧
I 度高血圧
以上

468人
(27.6)

546人
(32.3)

86人
(5.1)

468人
(27.6)

臓器障害

眼底検査有所見者

949
(6.3)

詳細健診実施者(m)
(m/e)

7898
(52.6)

心電図結果有所見者

27
(7.9)

検査実施者(n)
実施率(n/j)

196
(57.5)

<10
(－)

有所見者(o)
有所見率(o/j)

63
(18.5)

117
(6.9)

検査実施者(p)
実施率(p/l)

380
(52)

15
(0.9)

有所見者(q)
有所見率(q/l)

308
(18.2)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、
Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした

※令和3年度 高山市（総数）

（脂質異常症）

軽 症										重 症											
人口										脂質異常症治療中											
※令和2年国勢調査人口等基本集計										8819 人 (12.8)											
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)				患者数(b)		b/a		患者数(c)		c/a		患者数(d)		d/a	
20代以下		20106		242		1.2				<10		-		<10		-		0		-	
30代		8114		346		4.3				<10		-		16		4.6		<10		-	
40代		11693		1059		9.1				20		1.9		76		7.2		<10		-	
50代		10818		2006		18.5				63		3.1		197		9.8		14		0.7	
60代		11150		2853		25.6				165		5.8		388		13.6		18		0.63	
70～74歳		7132		2313		32.4				188		8.1		404		17.5		16		0.69	
再掲		40793		8231		20.2		436		5.3		1065		12.9		-		-		-	
40～74歳(Y)																					
レセプト										gのうち特定健診未受診の者(h)											
										3714 人 (45.1) (h/g)											

※令和3年度 飛騨市(総数)

(脂質異常症)

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

17257 人

年代別

人数(T)

20代以下

4379

30代

1821

40代

2816

50代

2920

60代

3220

70～74歳

2101

再掲

40～74歳(Y)

11057

脂質異常症治療中

2065 人
(12)

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

34

0.8

30代

50

2.7

40代

194

6.9

50代

399

13.7

60代

727

22.6

70～74歳

661

31.5

再掲

40～74歳(g)

1981

17.9

脳血管疾患

－
(－)

患者数(b)

b/a

0

－

<20

－

<20

－

<20

－

<20

－

39

5.9

虚血性心疾患

－
(－)

患者数(c)

c/a

<20

－

<20

－

<20

－

24

6

71

9.8

91

13.8

人工透析

<20
(－)

患者数(d)

d/a

0

－

0

－

0

－

0

－

<20

－

<20

－

軽 症

重 症

レセプト

注意・レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

脂質異常(LDL-C)

特定健診受診者(e)

(e/Y)

7335人

(66.3)

160以上(f)

(f/e)

800人

(10.9)

180以上(f)

(f/e)

265人

(3.6)

脂質異常症治療中(i)

(質問票 服薬有 レセプト有)

2101 人 (28.6) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

230 人

85 人

29 (j/f)

32 (k/f)

570 人

180 人

71 (l/f)

68 (m/f)

未治療(l, m)

その他のリスク

肥満

BMI 25以上

64人

(27.8)

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

35人

(15.2)

高血糖

高血圧

I 度高血圧
以上

65人

(28.3)

臓器障害

眼底検査有
所見者

1110

(15.1)

詳細健診実施者(m)

(m/e)

3200

(43.6)

検査実施者(n)

42

(18.3)

実施率(n/j)

<20

(－)

検査実施者(p)

80

(14)

実施率(p/l)

<20

(－)

検査実施者(q)

111

(19.5)

実施率(q/l)

<20

(－)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか

眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした

軽 症										重 症									
人口										脂質異常症治療中									
※令和2年国勢調査人口等基本集計										3348 人 (14.5)									
年代別		人数(T)		患者数(a)		割合(a/T)		患者数(b)		b/a		患者数(c)		c/a		患者数(d)		d/a	
20代以下		5984		75		1.3		<10		-		<10		-		0		-	
30代		2344		129		5.5		<10		-		<10		-		0		-	
40代		3543		278		7.8		10		3.6		20		7.2		<10		-	
50代		3925		720		18.3		30		4.2		47		6.5		<10		-	
60代		4554		1177		25.8		84		7.1		116		9.9		<10		-	
70～74歳		2777		969		34.9		76		7.8		152		15.7		<10		-	
再掲		14799		3144		21.2		200		6.4		335		10.7		14		0.45	
40～74歳(Y)				40～74歳(g)															
レセプト										gのうち特定健診未受診の者(h)									
										1315 人 (41.8) (h/g)									
レセプト										注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、 そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。									
特定健診 ※ 40～74 歳										脂質異常症治療中(i)									
										(質問票 服薬有 レセプト有)									
										2769 人 (31.2) (i/e)									
										合計(j)									
										LDL160以上									
										180以上(k)									
										243 人									
										88 人									
										25 (j/f)									
										27 (k/f)									
										714 人									
										238 人									
										75 (l/f)									
										73 (m/f)									
										未治療(l, m)									
										207 人									
										(29)									
										40 人									
										(5.6)									
										170 人									
										(23.8)									
										検査実施者(p)									
										60									
										(8.4)									
										検査実施率(q/l)									
										<10									
										有所見率(q/l)									
										<10									
										有所見率(q/l)									
										32									
										(13.2)									
										検査実施率(n/j)									
										138									
										(56.8)									
										有所見者(o)									
										<10									
										有所見率(o/j)									
										58									
										(23.9)									
										961									
										(10.8)									
										詳細健診実施者(m)									
										4402									
										(49.6)									
										眼底検査有所見者									
										心電図結果有所見者									
										※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか 眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、 Scheie.いずれかの分類で2以上の結果を所見とした									

※令和3年度 白川村(総数)

(脂質異常症)

軽 症

重 症

人口

※令和2年国勢調査人口等基本集計

1247 人

年代別

人数(T)

20代以下

387

30代

152

40代

198

50代

177

60代

205

70～74歳

128

再掲

40～74歳(Y)

708

脂質異常症治療中

年代別

患者数(a)

割合(a/T)

20代以下

0

-

30代

0

-

40代

<20

-

50代

<20

-

60代

<20

-

70～74歳

<20

-

再掲

40～74歳(g)

22

3.1

脳血管疾患

-

(-)

患者数(b)

b/a

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

虚血性心疾患

<20

(-)

患者数(c)

c/a

0

-

0

-

0

-

<20

-

0

-

<20

-

人工透析

-

(-)

患者数(d)

d/a

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

レセプト

注意:レセプトは医療機関の所在地を基にした集計であり、そのため当該地域以外の患者情報も含まれている可能性があります。

特定健診

※ 40～74 歳

特定健診受診者(e)
(e/Y)

469人
(66.2)

脂質異常(LDL-C)

160以上(f)
(f/e)

180以上(f)
(f/e)

65～83
(-)

25人
(5.3)

脂質異常症治療中(i)
(質問票、脂質有、レセプト有)

56 人 (11.9) (i/e)

合計(j)

LDL160以上

180以上(k)

<20

0 人

-

64 人

25 人

96 (l/f)

100 (m/f)

未治療(l, m)

その他のリスク

肥満

BMI 25以上

<20
(-)

23人
(35.9)

高血糖

HbA1c6.5以上
空腹時126以上

<20
(-)

<20
(-)

高血圧

I 度高血圧以上

<20
(-)

<20
(-)

臓器障害

眼底検査有所見者

心電図結果有所見者

詳細健診実施者(m)
(m/e)

<20
(-)

235
(50.1)

検査実施者(n)
実施率(n/j)

0
(-)

<20
(-)

検査実施者(o)
有所見率(o/j)

0
(-)

<20
(-)

検査実施者(p)
実施率(p/l)

<20
(-)

37
(57.8)

有所見者(q)
有所見率(q/l)

0
(-)

<20
(-)

※高血圧の人が詳細健診をきちんと受けているか
眼底検査についてはWong-Mitchell、Keith-Wagener、Scheieいずれかの分類で2以上の結果を所見とした。