

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 17964 | 大垣市上石津町地内   | R8.3.29 | 捕獲 | 雄  | 約 87 cm  | R8.4.3  | 陰性   |
| 17965 | 大垣市上石津町地内   | R8.4.1  | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.4.3  | 陽性   |
| 17966 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.3.30 | 捕獲 | 雄  | 約 97 cm  | R8.4.3  | 陰性   |
| 17967 | 各務原市各務地内    | R8.4.1  | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.3  | 陰性   |
| 17968 | 可児市久々利地内    | R8.4.2  | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.4.7  | 陰性   |
| 17969 | 可児市大森地内     | R8.4.2  | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.4.7  | 陰性   |
| 17970 | 高山市越後町地内    | R8.4.4  | 捕獲 | 雌  | 約 92 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17971 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.5  | 捕獲 | 雄  | 約 92 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17972 | 美濃加茂市下米田町地内 | R8.4.4  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.4.7  | 陰性   |
| 17973 | 可児市大森地内     | R8.4.4  | 捕獲 | 雌  | 約 113 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17974 | 可児市西帷子地内    | R8.4.5  | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.4.7  | 陰性   |
| 17975 | 各務原市鵜沼地内    | R8.4.2  | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17976 | 郡上市明宝地内     | R8.4.3  | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17977 | 郡上市明宝地内     | R8.4.3  | 捕獲 | 雌  | 約 50 cm  | R8.4.7  | 陰性   |
| 17978 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17979 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 79 cm  | R8.4.10 | 陰性   |
| 17980 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.4.10 | 陰性   |
| 17981 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.10 | 陰性   |
| 17982 | 中津川市落合地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17983 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17984 | 揖斐川町乙原地内    | R8.4.6  | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.4.10 | 陰性   |
| 17985 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17986 | 高山市越後町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17987 | 郡上市高鷲町地内    | R8.4.7  | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17988 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.7  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17989 | 美濃加茂市下米田町地内 | R8.4.8  | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17990 | 白川町切井地内     | R8.4.6  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17991 | 郡上市大和町地内    | R8.4.4  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17992 | 可児市西帷子地内    | R8.4.7  | 捕獲 | 雄  | 約 119 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17993 | 郡上市美並町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.10 | 陰性   |
| 17994 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.4.14 | 陰性   |
| 17995 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.8  | 捕獲 | 雌  | 約 79 cm  | R8.4.14 | 陰性   |
| 17996 | 可児市大森地内     | R8.4.9  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.4.14 | 陰性   |
| 17997 | 可児市長洞地内     | R8.4.9  | 捕獲 | 雌  | 約 102 cm | R8.4.14 | 陰性   |
| 17998 | 高山市朝日町地内    | R8.4.11 | 捕獲 | 雄  | 約 94 cm  | R8.4.14 | 陰性   |
| 17999 | 美濃加茂市牧野地内   | R8.4.10 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.4.14 | 陰性   |
| 18000 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.12 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18001 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.12 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18002 | 各務原市鵜沼地内    | R8.4.13 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18003 | 八百津町上飯田地内   | R8.4.13 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18004 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.4.11 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18005 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.4.11 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18006 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.4.13 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18007 | 可児市久々利地内    | R8.4.13 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18008 | 白川町切井地内     | R8.4.12 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18009 | 下呂市金山町地内    | R8.4.14 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18010 | 飛騨市古川町地内    | R8.4.13 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18011 | 郡上市大和町地内    | R8.4.9  | 捕獲 | 雄  | 約 99 cm  | R8.4.17 | 陰性   |
| 18012 | 郡上市大和町地内    | R8.4.12 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.4.17 | 陰性   |
| 18013 | 各務原市鵜沼地内    | R8.4.14 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.4.17 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所   | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-----------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18014 | 下呂市萩原町地内  | R8.4.14 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.20 | 陰性   |
| 18015 | 下呂市萩原町地内  | R8.4.15 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.4.20 | 陰性   |
| 18016 | 美濃加茂市牧野地内 | R8.4.16 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.20 | 陰性   |
| 18017 | 可児市西帷子地内  | R8.4.16 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.4.20 | 陰性   |
| 18018 | 土岐市泉町地内   | R8.4.16 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.20 | 陰性   |
| 18019 | 飛騨市古川町地内  | R8.4.16 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.20 | 陰性   |
| 18020 | 郡上市高鷲町地内  | R8.4.16 | 捕獲 | 雌  | 約 118 cm | R8.4.23 | 陽性   |
| 18021 | 可児市久々利地内  | R8.4.17 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18022 | 八百津町野上地内  | R8.4.17 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18023 | 飛騨市古川町地内  | R8.4.17 | 捕獲 | 雌  | 約 94 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18024 | 飛騨市古川町地内  | R8.4.17 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18025 | 八百津町野上地内  | R8.4.18 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18026 | 本巣市根尾樽見地内 | R8.4.19 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18027 | 郡上市八幡町地内  | R8.4.19 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18028 | 郡上市大和町地内  | R8.4.19 | 捕獲 | 雄  | 約 99 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18029 | 郡上市高鷲町地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18030 | 土岐市白川町地内  | R8.4.18 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18031 | 高山市越後町地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18032 | 瑞浪市釜戸町地内  | R8.4.18 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18033 | 大垣市上石津町地内 | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 109 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18034 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 91 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18035 | 恵那市串原地内   | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.23 | 陰性   |
| 18036 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 101 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18037 | 恵那市明智町地内  | R8.4.20 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.4.23 | 陰性   |
| 18038 | 山県市谷合地内   | R8.4.20 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.28 | 陽性   |
| 18039 | 土岐市泉町地内   | R8.4.20 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18040 | 土岐市泉町地内   | R8.4.21 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18041 | 本巣市文殊地内   | R8.4.21 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18042 | 中津川市落合地内  | R8.4.22 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18043 | 八百津町久田見地内 | R8.4.23 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18044 | 瑞浪市日吉町地内  | R8.4.23 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18045 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.23 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18046 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.23 | 捕獲 | 雄  | 約 90 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18047 | 高山市越後町地内  | R8.4.24 | 捕獲 | 雌  | 約 123 cm | R8.5.1  | 陰性   |
| 18048 | 八百津町久田見地内 | R8.4.24 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18049 | 大垣市青墓町地内  | R8.4.24 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18050 | 可児市久々利地内  | R8.4.24 | 捕獲 | 雌  | 約 97 cm  | R8.4.28 | 陰性   |
| 18051 | 中津川市蛭川地内  | R8.4.24 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.4.28 | 陰性   |
| 18052 | 関市下有知地内   | R8.4.25 | 捕獲 | 雄  | 約 38 cm  | R8.5.1  | 陰性   |
| 18053 | 郡上市八幡町地内  | R8.4.25 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.1  | 陰性   |
| 18054 | 海津市南濃町地内  | R8.4.27 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.5.1  | 陽性   |
| 18055 | 郡上市高鷲町地内  | R8.4.26 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.5.1  | 陰性   |
| 18056 | 八百津町上飯田地内 | R8.4.28 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.1  | 陰性   |
| 18057 | 中津川市落合地内  | R8.4.29 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.5.1  | 陰性   |
| 18058 | 各務原市鵜沼地内  | R8.4.30 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.5.8  | 陰性   |
| 18059 | 郡上市高鷲町地内  | R8.4.29 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.5.8  | 陰性   |
| 18060 | 恵那市明智町地内  | R8.5.6  | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.5.8  | 陰性   |
| 18061 | 飛騨市古川町地内  | R8.5.1  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.8  | 陰性   |
| 18062 | 可児市久々利地内  | R8.5.2  | 捕獲 | 雄  | 約 68 cm  | R8.5.8  | 陰性   |
| 18063 | 可児市久々利地内  | R8.5.4  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.5.8  | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所   | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-----------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18064 | 可児市西帷子地内  | R8.5.3  | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.5.8  | 陰性   |
| 18065 | 郡上市高鷺町地内  | R8.5.2  | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.5.12 | 陰性   |
| 18066 | 白川町切井地内   | R8.5.3  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.12 | 陰性   |
| 18067 | 可児市久々利地内  | R8.5.7  | 捕獲 | 雄  | 約 114 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18068 | 飛騨市古川町地内  | R8.5.6  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18069 | 大垣市上石津町地内 | R8.5.8  | 捕獲 | 雄  | 約 118 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18070 | 可児市久々利地内  | R8.5.8  | 捕獲 | 雄  | 約 148 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18071 | 恵那市山岡町地内  | R8.5.9  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18072 | 本巣市根尾能郷地内 | R8.5.8  | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.5.12 | 陰性   |
| 18073 | 可児市久々利地内  | R8.5.8  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18074 | 関市下之保地内   | R8.5.8  | 捕獲 | 雄  | 約 112 cm | R8.5.12 | 陰性   |
| 18075 | 恵那市山岡町地内  | R8.5.9  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18076 | 高山市久々野町地内 | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18077 | 瑞浪市釜戸町地内  | R8.5.8  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18078 | 瑞浪市釜戸町地内  | R8.5.9  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18079 | 郡上市八幡町地内  | R8.5.10 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18080 | 可児市西帷子地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 135 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18081 | 坂祝町黒岩地内   | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18082 | 飛騨市古川町地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.5.14 | 陽性   |
| 18083 | 中津川市蛭川地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 86 cm  | R8.5.14 | 陰性   |
| 18084 | 中津川市蛭川地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18085 | 恵那市山岡町地内  | R8.5.9  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.14 | 陰性   |
| 18086 | 郡上市八幡町地内  | R8.5.12 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18087 | 八百津町野上地内  | R8.5.12 | 捕獲 | 雄  | 約 92 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18088 | 関市迫間地内    | R8.5.12 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18089 | 郡上市高鷺町地内  | R8.5.12 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18090 | 郡上市高鷺町地内  | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18091 | 高山市大洞町地内  | R8.5.12 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18092 | 可児市久々利地内  | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18093 | 可児市西帷子地内  | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 108 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18094 | 大垣市青墓町地内  | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18095 | 揖斐川町檜原地内  | R8.5.11 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.5.15 | 陰性   |
| 18096 | 中津川市加子母地内 | R8.5.13 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.15 | 陰性   |
| 18097 | 本巣市根尾能郷地内 | R8.5.13 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.19 | 陰性   |
| 18098 | 本巣市根尾能郷地内 | R8.5.13 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18099 | 高山市久々野町地内 | R8.5.13 | 捕獲 | 雌  | 約 92 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18100 | 中津川市蛭川地内  | R8.5.14 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.5.19 | 陽性   |
| 18101 | 恵那市笠置町地内  | R8.5.14 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18102 | 可児市大森地内   | R8.5.14 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.19 | 陰性   |
| 18103 | 関市下有知地内   | R8.5.14 | 捕獲 | 雄  | 約 43 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18104 | 郡上市八幡町地内  | R8.5.14 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18105 | 恵那市串原地内   | R8.5.14 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18106 | 関市下有知地内   | R8.5.14 | 捕獲 | 雌  | 約 36 cm  | R8.5.19 | 陰性   |
| 18107 | 恵那市上矢作町地内 | R8.5.16 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18108 | 恵那市山岡町地内  | R8.5.18 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18109 | 関市志津野地内   | R8.5.16 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18110 | 中津川市蛭川地内  | R8.5.16 | 捕獲 | 雄  | 約 91 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18111 | 関市倉知地内    | R8.5.18 | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18112 | 可児市久々利地内  | R8.5.18 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.21 | 陰性   |
| 18113 | 可児市久々利地内  | R8.5.18 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.21 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18114 | 下呂市金山町地内    | R8.5.18 | 捕獲 | 雄  | 約 84 cm  | R8.5.21 | 陰性   |
| 18115 | 高山市朝日町地内    | R8.5.20 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.5.22 | 陰性   |
| 18116 | 関市神野地内      | R8.5.19 | 捕獲 | 雌  | 約 128 cm | R8.5.22 | 陰性   |
| 18117 | 可児市今地内      | R8.5.20 | 捕獲 | 雄  | 約 102 cm | R8.5.22 | 陰性   |
| 18118 | 郡上市高鷺町地内    | R8.5.19 | 捕獲 | 雄  | 約 90 cm  | R8.5.22 | 陰性   |
| 18119 | 本巣市法林寺地内    | R8.5.20 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.22 | 陰性   |
| 18120 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.20 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.26 | 陰性   |
| 18121 | 恵那市明智町地内    | R8.5.22 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.26 | 陰性   |
| 18122 | 郡上市高鷺町地内    | R8.5.22 | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.5.26 | 陰性   |
| 18123 | 高山市朝日町地内    | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18124 | 恵那市上矢作町地内   | R8.5.22 | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18125 | 恵那市明智町地内    | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18126 | 可児市久々利地内    | R8.5.25 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18127 | 白川町赤河地内     | R8.5.24 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18128 | 白川町赤河地内     | R8.5.24 | 捕獲 | 雌  | 約 40 cm  | R8.5.28 | 陰性   |
| 18129 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.5.24 | 捕獲 | 雄  | 約 113 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18130 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.5.24 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18131 | 岐阜市長良志段見地内  | R8.5.23 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18132 | 岐阜市長良志段見地内  | R8.5.22 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.28 | 陰性   |
| 18133 | 岐阜市岩井地内     | R8.5.21 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18134 | 恵那市明智町地内    | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18135 | 郡上市高鷺町地内    | R8.5.23 | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18136 | 美濃加茂市牧野地内   | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.5.28 | 陰性   |
| 18137 | 八百津町野上地内    | R8.5.26 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18138 | 揖斐川町小津地内    | R8.5.22 | 捕獲 | 雌  | 約 72 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18139 | 揖斐川町東津汲地内   | R8.5.23 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18140 | 岐阜市岩井地内     | R8.5.26 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18141 | 本巣市外山地内     | R8.5.26 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.5.29 | 陰性   |
| 18142 | 八百津町錦織地内    | R8.5.26 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.5.29 | 陰性   |
| 18143 | 八百津町錦織地内    | R8.5.26 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18144 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.27 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.5.29 | 陰性   |
| 18145 | 可児市久々利地内    | R8.5.27 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.5.29 | 陰性   |
| 18146 | 岐阜市岩井地内     | R8.5.25 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.5.29 | 陰性   |
| 18147 | 可児市大森地内     | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18148 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.6.2  | 陰性   |
| 18149 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雄  | 約 103 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18150 | 可児市皐ヶ丘地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18151 | 郡上市八幡町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.6.2  | 陰性   |
| 18152 | 恵那市明智町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.2  | 陰性   |
| 18153 | 恵那市明智町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18154 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18155 | 中津川市中津川地内   | R8.5.29 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18156 | 恵那市明智町地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18157 | 恵那市明智町地内    | R8.5.31 | 捕獲 | 雄  | 約 98 cm  | R8.6.2  | 陰性   |
| 18158 | 恵那市山岡町地内    | R8.5.31 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18159 | 恵那市明智町地内    | R8.5.31 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18160 | 岐阜市打越地内     | R8.5.30 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.6.2  | 陰性   |
| 18161 | 岐阜市山県岩地内    | R8.5.28 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18162 | 八百津町久田見地内   | R8.5.30 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18163 | 本巣市神海地内     | R8.6.1  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.4  | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18164 | 土岐市土岐津町地内  | R8.6.1  | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.6.4  | 陰性   |
| 18165 | 郡上市高鷲町地内   | R8.5.30 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18166 | 郡上市高鷲町地内   | R8.5.30 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18167 | 飛騨市古川町地内   | R8.5.30 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18168 | 中津川市手賀野地内  | R8.5.31 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.4  | 陰性   |
| 18169 | 中津川市手賀野地内  | R8.5.31 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18170 | 岐阜市岩井地内    | R8.5.31 | 捕獲 | 雌  | 約 103 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18171 | 関市下之保地内    | R8.6.1  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18172 | 関市下之保地内    | R8.6.1  | 捕獲 | 雄  | 約 127 cm | R8.6.4  | 陰性   |
| 18173 | 本巣市外山地内    | R8.6.2  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18174 | 本巣市日当地内    | R8.6.2  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18175 | 八百津町野上地内   | R8.6.2  | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.6.5  | 陰性   |
| 18176 | 白川村小白川地内   | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18177 | 郡上市八幡町地内   | R8.6.1  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.6.5  | 陰性   |
| 18178 | 恵那市山岡町地内   | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18179 | 恵那市明智町地内   | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18180 | 中津川市上野地内   | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.6.5  | 陰性   |
| 18181 | 関市下有知地内    | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 42 cm  | R8.6.5  | 陰性   |
| 18182 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.6.3  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.9  | 陰性   |
| 18183 | 瑞浪市日吉町地内   | R8.6.4  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18184 | 関市迫間地内     | R8.6.5  | 捕獲 | 不明 | 約 105 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18185 | 土岐市泉町地内    | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18186 | 恵那市明智町地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.9  | 陰性   |
| 18187 | 恵那市明智町地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18188 | 川辺町下川辺地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.9  | 陰性   |
| 18189 | 川辺町鹿塩地内    | R8.6.5  | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.6.9  | 陰性   |
| 18190 | 八百津町和知地内   | R8.6.6  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.11 | 陰性   |
| 18191 | 郡上市高鷲町地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雌  | 約 140 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18192 | 中津川市蛭川地内   | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 103 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18193 | 土岐市泉町地内    | R8.6.8  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18194 | 岐阜市岩井地内    | R8.6.5  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18195 | 岐阜市長良志段見地内 | R8.6.7  | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18196 | 本巣市山口地内    | R8.6.8  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18197 | 高山市越後町地内   | R8.6.8  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.11 | 陰性   |
| 18198 | 恵那市串原地内    | R8.6.8  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.11 | 陰性   |
| 18199 | 恵那市山岡町地内   | R8.6.9  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18200 | 郡上市白鳥町地内   | R8.6.9  | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.6.12 | 陰性   |
| 18201 | 本巣市根尾能郷地内  | R8.6.9  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18202 | 白川町切井地内    | R8.6.5  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18203 | 本巣市根尾高尾地内  | R8.6.10 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18204 | 中津川市蛭川地内   | R8.6.10 | 捕獲 | 雄  | 約 103 cm | R8.6.12 | 陰性   |
| 18205 | 中津川市加子母地内  | R8.6.9  | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.6.12 | 陰性   |
| 18206 | 八百津町上飯田地内  | R8.6.9  | 捕獲 | 雌  | 約 94 cm  | R8.6.12 | 陰性   |
| 18207 | 岐阜市達目洞地内   | R8.6.10 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18208 | 本巣市木知原地内   | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18209 | 土岐市泉町地内    | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18210 | 土岐市土岐津町地内  | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18211 | 恵那市明智町地内   | R8.6.10 | 捕獲 | 雄  | 約 92 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18212 | 恵那市山岡町地内   | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18213 | 八百津町久田見地内  | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.16 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18214 | 土岐市曾木町地内    | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18215 | 可児市柿下地内     | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 49 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18216 | 中津川市川上地内    | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.17 | 陰性   |
| 18217 | 郡上市美並町地内    | R8.6.12 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18218 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.6.12 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18219 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.6.11 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18220 | 恵那市山岡町地内    | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18221 | 可児市久々利地内    | R8.6.13 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.16 | 陰性   |
| 18222 | 可児市久々利地内    | R8.6.13 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.6.16 | 陰性   |
| 18223 | 恵那市上矢作町地内   | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 91 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18224 | 恵那市明智町地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18225 | 可児市久々利地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18226 | 可児市久々利地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18227 | 可児市久々利地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18228 | 郡上市大和町地内    | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 119 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18229 | 岐阜市岩井地内     | R8.6.13 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18230 | 岐阜市達目洞地内    | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18231 | 白川町切井地内     | R8.6.12 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18232 | 美濃加茂市伊深町地内  | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18233 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18234 | 瑞浪市日吉町地内    | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18235 | 坂祝町勝山地内     | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 46 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18236 | 恵那市串原地内     | R8.6.13 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.18 | 陰性   |
| 18237 | 岐阜市岩井地内     | R8.6.14 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.18 | 陰性   |
| 18238 | 恵那市明智町地内    | R8.6.16 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.19 | 陰性   |
| 18239 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.6.19 | 陰性   |
| 18240 | 八百津町和知地内    | R8.6.16 | 捕獲 | 雄  | 約 94 cm  | R8.6.19 | 陰性   |
| 18241 | 八百津町八百津地内   | R8.6.16 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.19 | 陰性   |
| 18242 | 土岐市泉町地内     | R8.6.16 | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.6.19 | 陰性   |
| 18243 | 土岐市泉町地内     | R8.6.16 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.6.19 | 陰性   |
| 18244 | 中津川市中津川地内   | R8.6.15 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.6.19 | 陰性   |
| 18245 | 中津川市蛭川地内    | R8.6.16 | 捕獲 | 雌  | 約 117 cm | R8.6.19 | 陰性   |
| 18246 | 岐阜市岩井地内     | R8.6.16 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.6.19 | 陰性   |
| 18247 | 郡上市八幡町地内    | R8.6.16 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.6.19 | 陰性   |
| 18248 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.6.13 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.19 | 陰性   |
| 18249 | 本巣市山口地内     | R8.6.17 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.6.19 | 陰性   |
| 18250 | 美濃加茂市伊深町地内  | R8.6.18 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.6.22 | 陰性   |
| 18251 | 恵那市山岡町地内    | R8.6.18 | 捕獲 | 雄  | 約 94 cm  | R8.6.23 | 陰性   |
| 18252 | 郡上市大和町地内    | R8.6.16 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.6.22 | 陰性   |
| 18253 | 岐阜市岩井地内     | R8.6.17 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.6.22 | 陰性   |
| 18254 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.6.17 | 捕獲 | 雄  | 約 135 cm | R8.6.22 | 陰性   |
| 18255 | 岐阜市打越地内     | R8.6.18 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.6.22 | 陰性   |
| 18256 | 可児市久々利地内    | R8.6.18 | 捕獲 | 雌  | 約 118 cm | R8.6.22 | 陰性   |
| 18257 | 土岐市駄知町地内    | R8.6.19 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.6.22 | 陰性   |
| 18258 | 川辺町下川辺地内    | R8.6.19 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.22 | 陰性   |
| 18259 | 土岐市駄知町地内    | R8.6.19 | 捕獲 | 雄  | 約 63 cm  | R8.6.22 | 陰性   |
| 18260 | 土岐市駄知町地内    | R8.6.19 | 捕獲 | 雄  | 約 86 cm  | R8.6.22 | 陰性   |
| 18261 | 本巣市根尾神所地内   | R8.6.18 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.23 | 陰性   |
| 18262 | 川辺町下川辺地内    | R8.6.19 | 捕獲 | 雌  | 約 98 cm  | R8.6.23 | 陰性   |
| 18263 | 恵那市山岡町地内    | R8.6.19 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.23 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18264 | 恵那市明智町地内   | R8.6.19 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.23 | 陰性   |
| 18265 | 郡上市白鳥町地内   | R8.6.18 | 捕獲 | 雄  | 約 101 cm | R8.6.23 | 陰性   |
| 18266 | 可児市柿下地内    | R8.6.20 | 捕獲 | 雄  | 約 54 cm  | R8.6.23 | 陰性   |
| 18267 | 坂祝町勝山地内    | R8.6.20 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.6.23 | 陰性   |
| 18268 | 中津川市山口地内   | R8.6.20 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.23 | 陰性   |
| 18269 | 恵那市上矢作町地内  | R8.6.21 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.25 | 陰性   |
| 18270 | 可児市塩河地内    | R8.6.22 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.25 | 陰性   |
| 18271 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.6.19 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.6.25 | 陰性   |
| 18272 | 岐阜市城田寺地内   | R8.6.21 | 捕獲 | 雌  | 約 145 cm | R8.6.25 | 陰性   |
| 18273 | 川辺町鹿塩地内    | R8.6.21 | 捕獲 | 雌  | 約 97 cm  | R8.6.25 | 陰性   |
| 18274 | 土岐市土岐津町地内  | R8.6.22 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.6.25 | 陰性   |
| 18275 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.6.20 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.6.25 | 陰性   |
| 18276 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.6.21 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.6.25 | 陰性   |
| 18277 | 恵那市明智町地内   | R8.6.22 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.25 | 陰性   |
| 18278 | 中津川市坂下地内   | R8.6.20 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.6.25 | 陰性   |
| 18279 | 恵那市上矢作町地内  | R8.6.24 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.26 | 陰性   |
| 18280 | 郡上市白鳥町地内   | R8.6.22 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.6.26 | 陰性   |
| 18281 | 本巣市根尾能郷地内  | R8.6.23 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.26 | 陰性   |
| 18282 | 郡上市大和町地内   | R8.6.23 | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.6.26 | 陰性   |
| 18283 | 八百津町和知地内   | R8.6.23 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.6.26 | 陰性   |
| 18284 | 可児市長洞地内    | R8.6.24 | 捕獲 | 雄  | 約 112 cm | R8.6.26 | 陰性   |
| 18285 | 瑞浪市日吉町地内   | R8.6.24 | 捕獲 | 雄  | 約 85 cm  | R8.6.26 | 陰性   |
| 18286 | 土岐市曾木町地内   | R8.6.24 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.6.26 | 陰性   |
| 18287 | 郡上市高鷲町地内   | R8.6.20 | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.6.26 | 陰性   |
| 18288 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.6.23 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.26 | 陰性   |
| 18289 | 郡上市八幡町地内   | R8.6.25 | 捕獲 | 雌  | 約 113 cm | R8.6.26 | 陰性   |
| 18290 | 八百津町久田見地内  | R8.6.25 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.30 | 陰性   |
| 18291 | 八百津町上飯田地内  | R8.6.25 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.6.30 | 陰性   |
| 18292 | 可児市久々利地内   | R8.6.25 | 捕獲 | 雌  | 約 123 cm | R8.6.30 | 陰性   |
| 18293 | 郡上市大和町地内   | R8.6.24 | 捕獲 | 雄  | 約 99 cm  | R8.6.30 | 陰性   |
| 18294 | 郡上市大和町地内   | R8.6.26 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.6.30 | 陰性   |
| 18295 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.6.26 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18296 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.6.27 | 捕獲 | 雄  | 約 108 cm | R8.6.30 | 陰性   |
| 18297 | 可児市今地内     | R8.6.27 | 捕獲 | 雌  | 約 66 cm  | R8.6.30 | 陰性   |
| 18298 | 可児市久々利地内   | R8.6.28 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.6.30 | 陰性   |
| 18299 | 恵那市串原地内    | R8.6.26 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.6.30 | 陰性   |
| 18300 | 高山市片野町地内   | R8.6.27 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.6.30 | 陰性   |
| 18301 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.6.27 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18302 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.6.28 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18303 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.6.28 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18304 | 川辺町鹿塩地内    | R8.6.28 | 捕獲 | 雌  | 約 99 cm  | R8.7.1  | 陰性   |
| 18305 | 八百津町錦織地内   | R8.6.29 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18306 | 八百津町錦織地内   | R8.6.29 | 捕獲 | 雌  | 約 45 cm  | R8.7.1  | 陰性   |
| 18307 | 川辺町上川辺地内   | R8.6.28 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18308 | 恵那市山岡町地内   | R8.6.27 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18309 | 恵那市山岡町地内   | R8.6.29 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18310 | 恵那市山岡町地内   | R8.6.29 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.1  | 陰性   |
| 18311 | 郡上市明宝地内    | R8.6.23 | 捕獲 | 雌  | 約 150 cm | R8.7.1  | 陰性   |
| 18312 | 岐阜市達目洞地内   | R8.6.29 | 捕獲 | 雄  | 約 117 cm | R8.7.3  | 陰性   |
| 18313 | 郡上市八幡町地内   | R8.6.29 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.7.3  | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18314 | 坂祝町勝山地内     | R8.6.29 | 捕獲 | 雄  | 約 85 cm  | R8.7.3  | 陰性   |
| 18315 | 岐阜市達目洞地内    | R8.6.30 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.7.3  | 陰性   |
| 18316 | 関市下之保地内     | R8.6.30 | 捕獲 | 雄  | 約 102 cm | R8.7.3  | 陰性   |
| 18317 | 可児市大森地内     | R8.6.30 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.7.3  | 陰性   |
| 18318 | 郡上市八幡町地内    | R8.7.1  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.7.7  | 陰性   |
| 18319 | 土岐市曾木町地内    | R8.7.1  | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.7.3  | 陰性   |
| 18320 | 土岐市曾木町地内    | R8.7.1  | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.7.3  | 陰性   |
| 18321 | 土岐市泉町地内     | R8.7.1  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.3  | 陰性   |
| 18322 | 八百津町上飯田地内   | R8.6.30 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.7.3  | 陰性   |
| 18323 | 恵那市明智町地内    | R8.7.1  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.7.3  | 陰性   |
| 18324 | 本巣市根尾能郷地内   | R8.7.1  | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.7.3  | 陰性   |
| 18325 | 下呂市萩原町地内    | R8.7.2  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.7  | 陰性   |
| 18326 | 中津川市蛭川地内    | R8.7.2  | 捕獲 | 雌  | 約 128 cm | R8.7.7  | 陰性   |
| 18327 | 川辺町下吉田地内    | R8.7.2  | 捕獲 | 不明 | 約 40 cm  | R8.7.7  | 陰性   |
| 18328 | 川辺町鹿塩地内     | R8.7.2  | 捕獲 | 雄  | 約 123 cm | R8.7.7  | 陰性   |
| 18329 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.7.2  | 捕獲 | 雄  | 約 90 cm  | R8.7.7  | 陰性   |
| 18330 | 海津市南濃町地内    | R8.7.2  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.7.7  | 陰性   |
| 18331 | 恵那市明智町地内    | R8.7.3  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.7  | 陰性   |
| 18332 | 八百津町野上地内    | R8.7.3  | 捕獲 | 雌  | 約 96 cm  | R8.7.7  | 陰性   |
| 18333 | 八百津町久田見地内   | R8.7.3  | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.7.7  | 陽性   |
| 18334 | 可児市西帷子地内    | R8.7.3  | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.7.7  | 陰性   |
| 18335 | 坂祝町勝山地内     | R8.7.3  | 捕獲 | 雌  | 約 72 cm  | R8.7.7  | 陰性   |
| 18336 | 岐阜市城田寺地内    | R8.7.4  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.7  | 陰性   |
| 18337 | 可児市大森地内     | R8.7.3  | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.7  | 陰性   |
| 18338 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.7.2  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.7.7  | 陰性   |
| 18339 | 岐阜市打越地内     | R8.7.4  | 捕獲 | 雌  | 約 71 cm  | R8.7.7  | 陰性   |
| 18340 | 岐阜市石谷地内     | R8.7.4  | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.7.7  | 陰性   |
| 18341 | 恵那市串原地内     | R8.7.6  | 捕獲 | 雄  | 約 98 cm  | R8.7.9  | 陰性   |
| 18342 | 恵那市明智町地内    | R8.7.6  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.7.9  | 陰性   |
| 18343 | 本巣市日当地内     | R8.7.6  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.9  | 陰性   |
| 18344 | 瑞浪市土岐町地内    | R8.7.5  | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.7.9  | 陰性   |
| 18345 | 八百津町久田見地内   | R8.7.7  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18346 | 土岐市泉町地内     | R8.7.7  | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18347 | 土岐市泉町地内     | R8.7.7  | 捕獲 | 雌  | 約 55 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18348 | 岐阜市達目洞地内    | R8.7.4  | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18349 | 郡上市白鳥町地内    | R8.7.4  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18350 | 郡上市白鳥町地内    | R8.7.4  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18351 | 郡上市大和町地内    | R8.7.4  | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18352 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.7.4  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18353 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.7.6  | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18354 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.7.7  | 捕獲 | 0  | 約 100 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18355 | 瑞浪市土岐町地内    | R8.7.7  | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18356 | 可児市今地内      | R8.7.8  | 捕獲 | 雌  | 約 67 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18357 | 八百津町久田見地内   | R8.7.8  | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18358 | 八百津町野上地内    | R8.7.8  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18359 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.7.8  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18360 | 恵那市山岡町地内    | R8.7.7  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18361 | 恵那市山岡町地内    | R8.7.8  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18362 | 土岐市妻木町地内    | R8.7.8  | 捕獲 | 雌  | 約 117 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18363 | 土岐市妻木町地内    | R8.7.8  | 捕獲 | 雄  | 約 73 cm  | R8.7.10 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18364 | 土岐市駄知町地内   | R8.7.8  | 捕獲 | 雄  | 約 68 cm  | R8.7.10 | 陰性   |
| 18365 | 中津川市川上地内   | R8.7.3  | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.10 | 陰性   |
| 18366 | 恵那市明智町地内   | R8.7.9  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18367 | 川辺町上川辺地内   | R8.7.9  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.7.14 | 陰性   |
| 18368 | 可児市姫ヶ丘地内   | R8.7.9  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.7.14 | 陰性   |
| 18369 | 可児市姫ヶ丘地内   | R8.7.9  | 捕獲 | 雄  | 約 62 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18370 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.7.9  | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.7.15 | 陰性   |
| 18371 | 本巣市根尾大井地内  | R8.7.10 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18372 | 坂祝町勝山地内    | R8.7.10 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18373 | 恵那市山岡町地内   | R8.7.10 | 捕獲 | 雄  | 約 99 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18374 | 恵那市明智町地内   | R8.7.10 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18375 | 恵那市明智町地内   | R8.7.10 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18376 | 可児市柿下地内    | R8.7.10 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.7.14 | 陰性   |
| 18377 | 可児市柿下地内    | R8.7.10 | 捕獲 | 不明 | 約 60 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18378 | 岐阜市城田寺地内   | R8.7.10 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.7.14 | 陰性   |
| 18379 | 可児市西帷子地内   | R8.7.11 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.7.14 | 陰性   |
| 18380 | 可児市大森地内    | R8.7.10 | 捕獲 | 雌  | 約 113 cm | R8.7.14 | 陰性   |
| 18381 | 八百津町野上地内   | R8.7.11 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.7.15 | 陰性   |
| 18382 | 八百津町野上地内   | R8.7.11 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18383 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.7.12 | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.7.15 | 陰性   |
| 18384 | 可児市久々利地内   | R8.7.13 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18385 | 岐阜市福富地内    | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 145 cm | R8.7.15 | 陰性   |
| 18386 | 岐阜市太郎丸野田地内 | R8.7.12 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.15 | 陰性   |
| 18387 | 海津市南濃町地内   | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 104 cm | R8.7.15 | 陰性   |
| 18388 | 関市西神野地内    | R8.7.12 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18389 | 関市西神野地内    | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 52 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18390 | 関市神野地内     | R8.7.12 | 捕獲 | 雌  | 約 96 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18391 | 関市志津野地内    | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18392 | 関市志津野地内    | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 54 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18393 | 八百津町八百津地内  | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 98 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18394 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 30 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18395 | 瑞浪市土岐町地内   | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18396 | 飛騨市古川町地内   | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.7.15 | 陰性   |
| 18397 | 可児市久々利地内   | R8.7.13 | 捕獲 | 雌  | 約 59 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18398 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.7.13 | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.7.15 | 陰性   |
| 18399 | 中津川市中津川地内  | R8.7.13 | 捕獲 | 不明 | 約 50 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18400 | 瑞浪市土岐町地内   | R8.7.10 | 捕獲 | 雄  | 約 85 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18401 | 瑞浪市土岐町地内   | R8.7.10 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.15 | 陰性   |
| 18402 | 瑞浪市土岐町地内   | R8.7.13 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18403 | 土岐市駄知町地内   | R8.7.13 | 捕獲 | 雌  | 約 74 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18404 | 山県市谷合地内    | R8.7.14 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18405 | 郡上市白鳥町地内   | R8.7.11 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18406 | 岐阜市太郎丸地内   | R8.7.13 | 捕獲 | 雄  | 約 97 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18407 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.7.13 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18408 | 土岐市泉町地内    | R8.7.13 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18409 | 土岐市泉町地内    | R8.7.13 | 捕獲 | 雌  | 約 55 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18410 | 岐阜市太郎丸地内   | R8.7.14 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.7.17 | 陰性   |
| 18411 | 関市中之保地内    | R8.7.14 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18412 | 関市中之保地内    | R8.7.14 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18413 | 関市下之保地内    | R8.7.14 | 捕獲 | 雄  | 約 94 cm  | R8.7.17 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18414 | 関市下之保地内    | R8.7.14 | 捕獲 | 雄  | 約 135 cm | R8.7.17 | 陰性   |
| 18415 | 瑞浪市土岐町地内   | R8.7.14 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18416 | 土岐市菅木町地内   | R8.7.14 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18417 | 関市倉知地内     | R8.7.15 | 捕獲 | 雄  | 約 94 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18418 | 飛騨市古川町地内   | R8.7.15 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18419 | 恵那市山岡町地内   | R8.7.13 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18420 | 恵那市明智町地内   | R8.7.12 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.17 | 陰性   |
| 18421 | 土岐市駄知町地内   | R8.7.15 | 捕獲 | 雄  | 約 116 cm | R8.7.17 | 陰性   |
| 18422 | 岐阜市太郎丸地内   | R8.7.15 | 捕獲 | 雄  | 約 119 cm | R8.7.21 | 陰性   |
| 18423 | 坂祝町取組地内    | R8.7.15 | 捕獲 | 雄  | 約 56 cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 18424 | 大垣市青墓町地内   | R8.7.16 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 18425 | 可児市久々利地内   | R8.7.16 | 捕獲 | 雌  | 約 99 cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 18426 | 可児市久々利地内   | R8.7.16 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.21 | 陰性   |
| 18427 | 可児市久々利地内   | R8.7.16 | 捕獲 | 雌  | 約 50 cm  | R8.7.21 | 陰性   |
| 18428 | 各務原市須衛町地内  | R8.7.16 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.21 | 陰性   |
| 18429 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.7.17 | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.7.23 | 陰性   |
| 18430 | 八百津町久田見地内  | R8.7.17 | 捕獲 | 雌  | 約 103 cm | R8.7.23 | 陰性   |
| 18431 | 岐阜市打越地内    | R8.7.17 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18432 | 可児市久々利地内   | R8.7.17 | 捕獲 | 雌  | 約 59 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18433 | 可児市久々利地内   | R8.7.17 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18434 | 恵那市山岡町地内   | R8.7.17 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18435 | 恵那市串原地内    | R8.7.18 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18436 | 恵那市笠置町地内   | R8.7.20 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18437 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.7.16 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.7.23 | 陰性   |
| 18438 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.7.16 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18439 | 恵那市明智町地内   | R8.7.16 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18440 | 中津川市中津川地内  | R8.7.17 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.23 | 陰性   |
| 18441 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.7.18 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18442 | 恵那市明智町地内   | R8.7.18 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18443 | 下呂市金山町地内   | R8.7.18 | 捕獲 | 雄  | 約 102 cm | R8.7.23 | 陰性   |
| 18444 | 岐阜市城田寺地内   | R8.7.19 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.7.23 | 陰性   |
| 18445 | 可児市西帷子地内   | R8.7.18 | 捕獲 | 雄  | 約 56 cm  | R8.7.23 | 陰性   |
| 18446 | 可児市土田地内    | R8.7.18 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.7.23 | 陰性   |
| 18447 | 恵那市明智町地内   | R8.7.22 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18448 | 中津川市蛭川地内   | R8.7.18 | 捕獲 | 雌  | 約 104 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18449 | 八百津町西洞地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雌  | 約 94 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18450 | 恵那市上矢作町地内  | R8.7.23 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18451 | 恵那市上矢作町地内  | R8.7.20 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18452 | 岐阜市太郎丸地内   | R8.7.18 | 捕獲 | 雌  | 約 113 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18453 | 岐阜市長良古津地内  | R8.7.18 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18454 | 郡上市八幡町地内   | R8.7.18 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18455 | 郡上市白鳥町地内   | R8.7.19 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18456 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.7.19 | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18457 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.7.19 | 捕獲 | 雌  | 約 40 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18458 | 飛騨市古川町地内   | R8.7.19 | 捕獲 | 雄  | 約 134 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18459 | 岐阜市長良古津地内  | R8.7.20 | 捕獲 | 雌  | 約 62 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18460 | 各務原市蘇原地内   | R8.7.20 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18461 | 大垣市青墓町地内   | R8.7.20 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18462 | 関市下之保地内    | R8.7.20 | 捕獲 | 雄  | 約 122 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18463 | 郡上市八幡町地内   | R8.7.20 | 捕獲 | 雄  | 約 85 cm  | R8.7.24 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18464 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.7.20 | 捕獲 | 雄  | 約 55 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18465 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.7.20 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.7.24 | 陰性   |
| 18466 | 土岐市泉町地内    | R8.7.20 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18467 | 岐阜市長良古津地内  | R8.7.21 | 捕獲 | 雌  | 約 56 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18468 | 関市倉知地内     | R8.7.21 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18469 | 関市倉知地内     | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 43 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18470 | 関市下之保地内    | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 83 cm  | R8.7.24 | 陰性   |
| 18471 | 郡上市大和町地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 101 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18472 | 可児市西帷子地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18473 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18474 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雌  | 約 40 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18475 | 土岐市駄知町地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18476 | 本巣市山口地内    | R8.7.22 | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18477 | 大垣市上石津町地内  | R8.7.22 | 捕獲 | 雄  | 約 103 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18478 | 八百津町和知地内   | R8.7.22 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18479 | 瑞浪市土岐町地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18480 | 恵那市明智町地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18481 | 本巣市根尾大井地内  | R8.7.17 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18482 | 瑞浪市土岐町地内   | R8.7.17 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18483 | 郡上市高鷲町地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18484 | 岐阜市長良志段見地内 | R8.7.22 | 捕獲 | 雌  | 約 102 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18485 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.7.22 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18486 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.7.22 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18487 | 郡上市美並町地内   | R8.7.23 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18488 | 可児市長洞地内    | R8.7.23 | 捕獲 | 雌  | 約 108 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18489 | 土岐市泉町地内    | R8.7.23 | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18490 | 土岐市泉町地内    | R8.7.23 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18491 | 岐阜市打越地内    | R8.7.23 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18492 | 郡上市白鳥町地内   | R8.7.21 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18493 | 岐阜市長良志段見地内 | R8.7.24 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.7.30 | 陰性   |
| 18494 | 大垣市上石津町地内  | R8.7.24 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18495 | 垂井町平尾地内    | R8.7.24 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18496 | 関市上大野地内    | R8.7.24 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.7.30 | 陰性   |
| 18497 | 八百津町八百津地内  | R8.7.24 | 捕獲 | 雄  | 約 55 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18498 | 恵那市明智町地内   | R8.7.23 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18499 | 恵那市明智町地内   | R8.7.23 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18500 | 恵那市明智町地内   | R8.7.24 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18501 | 恵那市山岡町地内   | R8.7.24 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18502 | 八百津町久田見地内  | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.7.30 | 陽性   |
| 18503 | 可児市今地内     | R8.7.26 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18504 | 中津川市山口地内   | R8.7.26 | 捕獲 | 雌  | 約 140 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18505 | 中津川市山口地内   | R8.7.26 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18506 | 関市下之保地内    | R8.7.25 | 捕獲 | 雌  | 約 106 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18507 | 中津川市手賀野地内  | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18508 | 可児市柿下地内    | R8.7.25 | 捕獲 | 不明 | 約 59 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18509 | 可児市久々利地内   | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 58 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18510 | 坂祝町勝山地内    | R8.7.23 | 捕獲 | 雄  | 約 88 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18511 | 坂祝町勝山地内    | R8.7.23 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.7.28 | 陰性   |
| 18512 | 郡上市明宝地内    | R8.7.23 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18513 | 可児市久々利地内   | R8.7.26 | 捕獲 | 雄  | 約 135 cm | R8.7.28 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18514 | 可児市久々利地内    | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 51 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18515 | 可児市久々利地内    | R8.7.24 | 捕獲 | 雄  | 約 79 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18516 | 可児市西帷子地内    | R8.7.25 | 捕獲 | 雌  | 約 63 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18517 | 可児市西帷子地内    | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.7.28 | 陰性   |
| 18518 | 関市下之保地内     | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18519 | 坂祝町勝山地内     | R8.7.23 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18520 | 恵那市明智町地内    | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.7.31 | 陰性   |
| 18521 | 恵那市山岡町地内    | R8.7.26 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18522 | 可児市長洞地内     | R8.7.27 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.7.30 | 陰性   |
| 18523 | 本巣市根尾大井地内   | R8.7.24 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.7.31 | 陰性   |
| 18524 | 中津川市中津川地内   | R8.7.26 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18525 | 可児市大森地内     | R8.7.27 | 捕獲 | 雄  | 約 82 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18526 | 可児市柿下地内     | R8.7.27 | 捕獲 | 雌  | 約 58 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18527 | 土岐市土岐津町地内   | R8.7.26 | 捕獲 | 雄  | 約 89 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18528 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.7.26 | 捕獲 | 雄  | 約 53 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18529 | 本巣市山口地内     | R8.7.27 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18530 | 八百津町錦織地内    | R8.7.27 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18531 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.7.27 | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18532 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.7.26 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.7.30 | 陰性   |
| 18533 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.7.26 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.7.30 | 陰性   |
| 18534 | 土岐市鶴里町地内    | R8.7.27 | 捕獲 | 雌  | 約 135 cm | R8.7.30 | 陰性   |
| 18535 | 土岐市鶴里町地内    | R8.7.27 | 捕獲 | 雄  | 約 45 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18536 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.7.22 | 捕獲 | 雄  | 約 85 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18537 | 岐阜市打越地内     | R8.7.26 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.7.30 | 陰性   |
| 18538 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.7.27 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18539 | 岐阜市山県北野地内   | R8.7.23 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.7.31 | 陰性   |
| 18540 | 岐阜市彦坂地内     | R8.7.28 | 死亡 | 不明 | 約 30 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18541 | 可児市久々利地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18542 | 可児市久々利地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.7.31 | 陰性   |
| 18543 | 可児市久々利地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18544 | 可児市久々利地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.7.31 | 陰性   |
| 18545 | 恵那市明智町地内    | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.7.31 | 陰性   |
| 18546 | 坂祝町勝山地内     | R8.7.27 | 捕獲 | 雄  | 約 94 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18547 | 可児市東帷子地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18548 | 郡上市白鳥町地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18549 | 関市下之保地内     | R8.7.29 | 捕獲 | 雄  | 約 128 cm | R8.7.31 | 陰性   |
| 18550 | 瑞浪市土岐町地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18551 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.7.29 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18552 | 土岐市妻木町地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雌  | 約 78 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18553 | 関市中之保地内     | R8.7.29 | 捕獲 | 雌  | 約 93 cm  | R8.7.31 | 陰性   |
| 18554 | 海津市南濃町地内    | R8.7.29 | 捕獲 | 雄  | 約 104 cm | R8.7.31 | 陰性   |
| 18555 | 土岐市妻木町地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 18556 | 土岐市鶴里町地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 18557 | 可児市久々利地内    | R8.7.29 | 捕獲 | 雌  | 約 109 cm | R8.8.4  | 陰性   |
| 18558 | 恵那市明智町地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 18559 | 恵那市山岡町地内    | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.4  | 陽性   |
| 18560 | 坂祝町取組地内     | R8.7.29 | 捕獲 | 雌  | 約 59 cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 18561 | 坂祝町取組地内     | R8.7.29 | 捕獲 | 雄  | 約 63 cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 18562 | 本巣市根尾能郷地内   | R8.7.29 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.4  | 陰性   |
| 18563 | 郡上市八幡町地内    | R8.7.24 | 捕獲 | 雌  | 約 84 cm  | R8.8.4  | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日    | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|--------|------|
| 18564 | 郡上市八幡町地内   | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 51 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18565 | 郡上市八幡町地内   | R8.7.25 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18566 | 郡上市八幡町地内   | R8.7.27 | 捕獲 | 雄  | 約 113 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18567 | 下呂市金山町地内   | R8.7.28 | 捕獲 | 雄  | 約 118 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18568 | 可児市柿田地内    | R8.7.30 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18569 | 岐阜市長良志段見地内 | R8.7.29 | 捕獲 | 雌  | 約 113 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18570 | 岐阜市福富地内    | R8.7.29 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18571 | 土岐市駄知町地内   | R8.7.29 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18572 | 土岐市駄知町地内   | R8.7.29 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18573 | 土岐市駄知町地内   | R8.7.30 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18574 | 可児市柿下地内    | R8.7.30 | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18575 | 可児市久々利地内   | R8.7.30 | 捕獲 | 雄  | 約 61 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18576 | 可児市久々利地内   | R8.7.30 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18577 | 可児市長洞地内    | R8.7.30 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18578 | 土岐市駄知町地内   | R8.7.30 | 捕獲 | 雄  | 約 103 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18579 | 下呂市金山町地内   | R8.7.30 | 捕獲 | 雄  | 約 114 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18580 | 可児市西鳴子地内   | R8.7.30 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18581 | 本巣市根尾能郷地内  | R8.7.30 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18582 | 岐阜市城田寺地内   | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18583 | 本巣市山口地内    | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18584 | 大垣市上石津町地内  | R8.7.31 | 捕獲 | 雌  | 約 123 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18585 | 関市富之保地内    | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 88 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18586 | 可児市長洞地内    | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 76 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18587 | 坂祝町勝山地内    | R8.7.31 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18588 | 中津川市坂下地内   | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18589 | 岐阜市打越地内    | R8.8.1  | 捕獲 | 雌  | 約 77 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18590 | 岐阜市打越地内    | R8.8.2  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18591 | 岐阜市打越地内    | R8.8.2  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.6 | 陰性   |
| 18592 | 関市下之保地内    | R8.8.1  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18593 | 関市下之保地内    | R8.8.2  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18594 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.8.2  | 捕獲 | 雄  | 約 78 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18595 | 高山市石浦町地内   | R8.8.1  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18596 | 可児市大森地内    | R8.8.1  | 捕獲 | 雄  | 約 53 cm  | R8.8.4 | 陰性   |
| 18597 | 可児市今地内     | R8.8.1  | 捕獲 | 雌  | 約 134 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18598 | 可児市久々利地内   | R8.8.1  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.4 | 陰性   |
| 18599 | 恵那市明智町地内   | R8.7.30 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18600 | 恵那市明智町地内   | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18601 | 岐阜市長良地内    | R8.7.30 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18602 | 岐阜市出屋敷地内   | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18603 | 中津川市蛭川地内   | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 61 cm  | R8.8.6 | 陰性   |
| 18604 | 岐阜市三輪地内    | R8.8.1  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18605 | 中津川市千旦林地内  | R8.8.1  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18606 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.2  | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.8.6 | 陰性   |
| 18607 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.2  | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.8.6 | 陰性   |
| 18608 | 坂祝町勝山地内    | R8.8.2  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18609 | 坂祝町勝山地内    | R8.8.2  | 捕獲 | 雌  | 約 50 cm  | R8.8.6 | 陰性   |
| 18610 | 本巣市山口地内    | R8.8.3  | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.8.6 | 陰性   |
| 18611 | 関市下之保地内    | R8.8.3  | 捕獲 | 雌  | 約 103 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18612 | 可児市塩河地内    | R8.8.3  | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.8.6 | 陰性   |
| 18613 | 土岐市肥田町地内   | R8.8.3  | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.8.6 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18614 | 飛騨市古川町地内    | R8.8.1  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.6  | 陰性   |
| 18615 | 土岐市妻木町地内    | R8.8.3  | 捕獲 | 雄  | 約 113 cm | R8.8.6  | 陰性   |
| 18616 | 土岐市妻木町地内    | R8.8.3  | 捕獲 | 雌  | 約 88 cm  | R8.8.6  | 陰性   |
| 18617 | 土岐市駄知町地内    | R8.8.3  | 捕獲 | 雄  | 約 86 cm  | R8.8.6  | 陰性   |
| 18618 | 土岐市鶴里町地内    | R8.8.2  | 捕獲 | 雌  | 約 119 cm | R8.8.6  | 陰性   |
| 18619 | 土岐市鶴里町地内    | R8.8.2  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.6  | 陰性   |
| 18620 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.7.31 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.8.7  | 陰性   |
| 18621 | 可児市久々利地内    | R8.8.3  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.7  | 陰性   |
| 18622 | 郡上市白鳥町地内    | R8.8.3  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.7  | 陰性   |
| 18623 | 可児市今地内      | R8.8.4  | 捕獲 | 雄  | 約 102 cm | R8.8.7  | 陰性   |
| 18624 | 高山市上宝町地内    | R8.8.4  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.7  | 陰性   |
| 18625 | 本巣市根尾能郷地内   | R8.8.3  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.8.7  | 陰性   |
| 18626 | 本巣市山口地内     | R8.8.4  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.7  | 陰性   |
| 18627 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.8.4  | 捕獲 | 雄  | 約 53 cm  | R8.8.7  | 陰性   |
| 18628 | 土岐市泉町地内     | R8.8.4  | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.8.7  | 陰性   |
| 18629 | 下呂市馬瀬地内     | R8.8.4  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.7  | 陰性   |
| 18630 | 中津川市蛭川地内    | R8.8.5  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.7  | 陰性   |
| 18631 | 郡上市白鳥町地内    | R8.8.5  | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.8.7  | 陰性   |
| 18632 | 坂祝町勝山地内     | R8.8.5  | 捕獲 | 雄  | 約 96 cm  | R8.8.7  | 陰性   |
| 18633 | 岐阜市打越地内     | R8.8.6  | 捕獲 | 雄  | 約 82 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18634 | 本巣市山口地内     | R8.8.6  | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.8.10 | 陰性   |
| 18635 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.8.6  | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18636 | 坂祝町取組地内     | R8.8.6  | 捕獲 | 雌  | 約 58 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18637 | 瑞浪市日吉町地内    | R8.8.6  | 捕獲 | 雌  | 約 85 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18638 | 中津川市坂下地内    | R8.8.6  | 捕獲 | 雄  | 約 72 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18639 | 下呂市金山町地内    | R8.8.6  | 捕獲 | 雌  | 約 64 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18640 | 恵那市山岡町地内    | R8.8.7  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.10 | 陰性   |
| 18641 | 恵那市明智町地内    | R8.8.6  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18642 | 飛騨市古川町地内    | R8.8.6  | 捕獲 | 雌  | 約 45 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18643 | 郡上市八幡町地内    | R8.8.5  | 捕獲 | 雌  | 約 43 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18644 | 郡上市八幡町地内    | R8.8.7  | 捕獲 | 雄  | 約 121 cm | R8.8.10 | 陰性   |
| 18645 | 可児市瀬田地内     | R8.8.6  | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.10 | 陰性   |
| 18646 | 可児市西帷子地内    | R8.8.6  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.10 | 陰性   |
| 18647 | 岐阜市福富地内     | R8.8.7  | 死亡 | 不明 | 約 70 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18648 | 岐阜市長良志段見地内  | R8.8.6  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 18649 | 可児市柿下地内     | R8.8.7  | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18650 | 瑞浪市日吉町地内    | R8.8.7  | 捕獲 | 雌  | 約 63 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18651 | 郡上市八幡町地内    | R8.8.10 | 捕獲 | 雄  | 約 92 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18652 | 郡上市八幡町地内    | R8.8.10 | 捕獲 | 雌  | 約 43 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18653 | 恵那市上矢作町地内   | R8.8.5  | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 18654 | 恵那市山岡町地内    | R8.8.7  | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 18655 | 恵那市明智町地内    | R8.8.7  | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18656 | 岐阜市打越地内     | R8.8.8  | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18657 | 岐阜市打越地内     | R8.8.8  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18658 | 可児市柿下地内     | R8.8.8  | 捕獲 | 雄  | 約 68 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18659 | 恵那市明智町地内    | R8.8.7  | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18660 | 可児市塩河地内     | R8.8.7  | 捕獲 | 雄  | 約 134 cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 18661 | 可児市大森地内     | R8.8.9  | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.8.12 | 陰性   |
| 18662 | 郡上市大和町地内    | R8.8.6  | 捕獲 | 雄  | 約 91 cm  | R8.8.12 | 陰性   |
| 18663 | 恵那市明智町地内    | R8.8.9  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.14 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18664 | 恵那市山岡町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.14 | 陰性   |
| 18665 | 可児市室原地内    | R8.8.12 | 捕獲 | 雄  | 約 165 cm | R8.8.14 | 陰性   |
| 18666 | 白川町切井地内    | R8.8.7  | 捕獲 | 雌  | 約 105 cm | R8.8.14 | 陰性   |
| 18667 | 岐阜市山県岩地内   | R8.8.8  | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18668 | 各務原市鷺沼地内   | R8.8.8  | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18669 | 郡上市大和町地内   | R8.8.8  | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18670 | 郡上市大和町地内   | R8.8.8  | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18671 | 恵那市明智町地内   | R8.8.8  | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18672 | 大垣市青墓町地内   | R8.8.9  | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18673 | 白川町切井地内    | R8.8.9  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18674 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.8.9  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.14 | 陰性   |
| 18675 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.8.9  | 捕獲 | 雄  | 約 85 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18676 | 瑞浪市日吉町地内   | R8.8.9  | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18677 | 恵那市明智町地内   | R8.8.9  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18678 | 岐阜市石谷地内    | R8.8.10 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.8.14 | 陰性   |
| 18679 | 郡上市大和町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.14 | 陰性   |
| 18680 | 郡上市大和町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18681 | 郡上市八幡町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雌  | 約 68 cm  | R8.8.14 | 陰性   |
| 18682 | 可児市西帷子地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.8.14 | 陰性   |
| 18683 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18684 | 土岐市妻木町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.17 | 陰性   |
| 18685 | 土岐市妻木町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18686 | 土岐市曾木町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18687 | 恵那市明智町地内   | R8.8.10 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18688 | 岐阜市岩井地内    | R8.8.11 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.17 | 陰性   |
| 18689 | 関市中之保地内    | R8.8.12 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18690 | 関市中之保地内    | R8.8.12 | 捕獲 | 雌  | 約 76 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18691 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.8.12 | 捕獲 | 雄  | 約 71 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18692 | 八百津町和知地内   | R8.8.12 | 捕獲 | 不明 | 約 55 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18693 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.8.12 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18694 | 岐阜市岩井地内    | R8.8.12 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.8.17 | 陰性   |
| 18695 | 大垣市上石津町地内  | R8.8.12 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.8.17 | 陽性   |
| 18696 | 郡上市大和町地内   | R8.8.12 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18697 | 中津川市山口地内   | R8.8.12 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18698 | 中津川市川上地内   | R8.8.12 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.17 | 陰性   |
| 18699 | 岐阜市椿洞地内    | R8.8.13 | 捕獲 | 雄  | 約 58 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18700 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.8.13 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.17 | 陰性   |
| 18701 | 岐阜市城田寺地内   | R8.8.13 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18702 | 飛騨市古川町地内   | R8.8.13 | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.8.17 | 陰性   |
| 18703 | 海津市南濃町地内   | R8.8.14 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.8.18 | 陰性   |
| 18704 | 土岐市鶴里町地内   | R8.8.14 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.8.18 | 陰性   |
| 18705 | 可児市西帷子地内   | R8.8.15 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.8.18 | 陰性   |
| 18706 | 可児市長洞地内    | R8.8.16 | 捕獲 | 雌  | 約 97 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18707 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.8.12 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.18 | 陰性   |
| 18708 | 土岐市土岐津町地内  | R8.8.14 | 捕獲 | 雄  | 約 104 cm | R8.8.18 | 陰性   |
| 18709 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.15 | 捕獲 | 雄  | 約 58 cm  | R8.8.18 | 陰性   |
| 18710 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.8.14 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.8.18 | 陰性   |
| 18711 | 恵那市明智町地内   | R8.8.13 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.8.18 | 陰性   |
| 18712 | 白川町切井地内    | R8.8.15 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18713 | 岐阜市加野地内    | R8.8.16 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.8.20 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18714 | 白川町三川地内     | R8.8.16 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18715 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.8.16 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18716 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.8.17 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18717 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.8.17 | 捕獲 | 雄  | 約 68 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18718 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18719 | 土岐市曾木町地内    | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18720 | 土岐市鶴里町地内    | R8.8.17 | 捕獲 | 雄  | 約 135 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18721 | 可児市室原地内     | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 102 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18722 | 可児市西帷子地内    | R8.8.17 | 捕獲 | 雄  | 約 109 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18723 | 恵那市明智町地内    | R8.8.15 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18724 | 可児市瀬田地内     | R8.8.17 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18725 | 可児市大森地内     | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 140 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18726 | 可児市大森地内     | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18727 | 可児市西帷子地内    | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 55 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18728 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.8.16 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18729 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.8.12 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18730 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18731 | 可児市久々利地内    | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.8.20 | 陰性   |
| 18732 | 可児市長洞地内     | R8.8.17 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.20 | 陰性   |
| 18733 | 土岐市泉町地内     | R8.8.17 | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18734 | 坂祝町取組地内     | R8.8.18 | 捕獲 | 雌  | 約 101 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18735 | 可児市久々利地内    | R8.8.18 | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18736 | 岐阜市打越地内     | R8.8.18 | 捕獲 | 雌  | 約 140 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18737 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.8.18 | 捕獲 | 雄  | 約 62 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18738 | 岐阜市出屋敷地内    | R8.8.17 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18739 | 土岐市鶴里町地内    | R8.8.18 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18740 | 下呂市馬瀬地内     | R8.8.18 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18741 | 土岐市泉町地内     | R8.8.18 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18742 | 土岐市泉町地内     | R8.8.18 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18743 | 関市倉知地内      | R8.8.19 | 捕獲 | 雌  | 約 48 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18744 | 可児市久々利地内    | R8.8.19 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18745 | 岐阜市三田洞地内    | R8.8.18 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18746 | 岐阜市加野地内     | R8.8.18 | 捕獲 | 雌  | 約 135 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18747 | 白川町切井地内     | R8.8.18 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18748 | 土岐市駄知町地内    | R8.8.18 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18749 | 郡上市白鳥町地内    | R8.8.14 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18750 | 恵那市明智町地内    | R8.8.18 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18751 | 美濃加茂市下米田町地内 | R8.8.19 | 捕獲 | 雄  | 約 55 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18752 | 郡上市白鳥町地内    | R8.8.19 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18753 | 土岐市泉町地内     | R8.8.19 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.8.21 | 陰性   |
| 18754 | 岐阜市彦坂地内     | R8.8.18 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.8.21 | 陰性   |
| 18755 | 岐阜市城田寺地内    | R8.8.18 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.25 | 陰性   |
| 18756 | 郡上市八幡町地内    | R8.8.16 | 捕獲 | 雌  | 約 92 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18757 | 岐阜市打越地内     | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.8.25 | 陰性   |
| 18758 | 揖斐川町檜原地内    | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 113 cm | R8.8.25 | 陰性   |
| 18759 | 瑞浪市土岐町地内    | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.8.25 | 陰性   |
| 18760 | 土岐市鶴里町地内    | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18761 | 土岐市鶴里町地内    | R8.8.20 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18762 | 関市下之保地内     | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 102 cm | R8.8.25 | 陰性   |
| 18763 | 白川町切井地内     | R8.8.20 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.25 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18764 | 土岐市曾木町地内   | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18765 | 可児市久々利地内   | R8.8.21 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.25 | 陰性   |
| 18766 | 可児市久々利地内   | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18767 | 山県市田栗地内    | R8.8.21 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18768 | 可児市久々利地内   | R8.8.22 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18769 | 八百津町和知地内   | R8.8.22 | 捕獲 | 雌  | 約 85 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18770 | 海津市南濃町地内   | R8.8.21 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.8.25 | 陰性   |
| 18771 | 各務原市松が丘地内  | R8.8.21 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18772 | 可児市塩河地内    | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 81 cm  | R8.8.25 | 陰性   |
| 18773 | 岐阜市三田洞地内   | R8.8.20 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.8.26 | 陰性   |
| 18774 | 郡上市白鳥町地内   | R8.8.20 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.8.26 | 陰性   |
| 18775 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.21 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.8.26 | 陰性   |
| 18776 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.21 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.8.26 | 陰性   |
| 18777 | 岐阜市打越地内    | R8.8.23 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18778 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.8.23 | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.8.26 | 陰性   |
| 18779 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.8.23 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.26 | 陰性   |
| 18780 | 瑞浪市日吉町地内   | R8.8.23 | 捕獲 | 雌  | 約 55 cm  | R8.8.26 | 陰性   |
| 18781 | 海津市南濃町地内   | R8.8.24 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.8.26 | 陰性   |
| 18782 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.24 | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.8.26 | 陰性   |
| 18783 | 可児市西帷子地内   | R8.8.24 | 捕獲 | 雄  | 約 64 cm  | R8.8.26 | 陰性   |
| 18784 | 土岐市肥田町地内   | R8.8.24 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.8.26 | 陰性   |
| 18785 | 下呂市馬瀬地内    | R8.8.24 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.8.26 | 陰性   |
| 18786 | 飛騨市古川町地内   | R8.8.24 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.8.26 | 陰性   |
| 18787 | 白川村荻町地内    | R8.8.25 | 捕獲 | 雄  | 約 55 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18788 | 郡上市高鷲町地内   | R8.8.23 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.9.4  | 陰性   |
| 18789 | 関市下之保地内    | R8.8.26 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.8.28 | 陰性   |
| 18790 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.8.26 | 捕獲 | 雌  | 約 64 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18791 | 岐阜市山県岩地内   | R8.8.24 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18792 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.8.25 | 捕獲 | 雄  | 約 66 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18793 | 岐阜市岩井地内    | R8.8.25 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18794 | 関市志津野地内    | R8.8.25 | 捕獲 | 雌  | 約 46 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18795 | 岐阜市椿洞地内    | R8.8.25 | 捕獲 | 雌  | 約 66 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18796 | 土岐市妻木町地内   | R8.8.26 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18797 | 岐阜市彦坂地内    | R8.8.25 | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.8.28 | 陰性   |
| 18798 | 土岐市鶴里町地内   | R8.8.26 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18799 | 海津市南濃町地内   | R8.8.25 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.8.28 | 陰性   |
| 18800 | 海津市南濃町地内   | R8.8.26 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.8.28 | 陰性   |
| 18801 | 恵那市明智町地内   | R8.8.25 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.8.28 | 陰性   |
| 18802 | 飛騨市古川町地内   | R8.8.25 | 捕獲 | 雌  | 約 87 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18803 | 土岐市駄知町地内   | R8.8.25 | 捕獲 | 雌  | 約 86 cm  | R8.8.28 | 陰性   |
| 18804 | 岐阜市三輪地内    | R8.8.27 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.9.1  | 陰性   |
| 18805 | 本巣市神海地内    | R8.8.27 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.9.1  | 陰性   |
| 18806 | 可児市長洞地内    | R8.8.27 | 捕獲 | 雌  | 約 136 cm | R8.9.1  | 陰性   |
| 18807 | 下呂市金山町地内   | R8.8.27 | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.9.1  | 陰性   |
| 18808 | 郡上市高鷲町地内   | R8.8.26 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.1  | 陰性   |
| 18809 | 土岐市駄知町地内   | R8.8.26 | 捕獲 | 雄  | 約 129 cm | R8.9.1  | 陰性   |
| 18810 | 郡上市八幡町地内   | R8.8.24 | 捕獲 | 雄  | 約 62 cm  | R8.9.1  | 陰性   |
| 18811 | 恵那市明智町地内   | R8.8.27 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.9.1  | 陰性   |
| 18812 | 郡上市大和町地内   | R8.8.27 | 捕獲 | 雄  | 約 98 cm  | R8.9.1  | 陰性   |
| 18813 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.27 | 捕獲 | 雄  | 約 68 cm  | R8.9.1  | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18814 | 本巢市神海地内    | R8.8.28 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.1  | 陰性   |
| 18815 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.8.28 | 捕獲 | 雄  | 約 91 cm  | R8.9.1  | 陰性   |
| 18816 | 恵那市明智町地内   | R8.8.28 | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.9.1  | 陰性   |
| 18817 | 恵那市山岡町地内   | R8.8.27 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.9.1  | 陰性   |
| 18818 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.29 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.9.1  | 陰性   |
| 18819 | 恵那市明智町地内   | R8.8.29 | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.9.3  | 陰性   |
| 18820 | 恵那市山岡町地内   | R8.8.30 | 捕獲 | 雄  | 約 150 cm | R8.9.3  | 陰性   |
| 18821 | 美濃加茂市牧野地内  | R8.8.31 | 捕獲 | 雄  | 約 125 cm | R8.9.3  | 陰性   |
| 18822 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.8.29 | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.9.3  | 陰性   |
| 18823 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.8.29 | 捕獲 | 雌  | 約 85 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18824 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.8.30 | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18825 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.8.30 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.9.3  | 陰性   |
| 18826 | 白川町切井地内    | R8.8.29 | 捕獲 | 雄  | 約 70 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18827 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.8.30 | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18828 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.8.31 | 捕獲 | 雄  | 約 62 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18829 | 美濃加茂市蜂屋町地内 | R8.8.31 | 捕獲 | 雄  | 約 63 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18830 | 大垣市上石津町地内  | R8.8.30 | 捕獲 | 雄  | 約 72 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18831 | 郡上市八幡町地内   | R8.8.31 | 捕獲 | 雌  | 約 90 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18832 | 山県市相戸地内    | R8.8.30 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18833 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.8.28 | 捕獲 | 雄  | 約 85 cm  | R8.9.3  | 陰性   |
| 18834 | 土岐市妻木町地内   | R8.8.31 | 捕獲 | 雌  | 約 121 cm | R8.9.3  | 陰性   |
| 18835 | 関市下之保地内    | R8.9.2  | 捕獲 | 雄  | 約 94 cm  | R8.9.4  | 陰性   |
| 18836 | 土岐市駄知町地内   | R8.8.31 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.9.4  | 陰性   |
| 18837 | 土岐市妻木町地内   | R8.9.2  | 捕獲 | 雄  | 約 120 cm | R8.9.4  | 陰性   |
| 18838 | 土岐市泉町地内    | R8.9.2  | 捕獲 | 雌  | 約 65 cm  | R8.9.4  | 陰性   |
| 18839 | 土岐市鶴里町地内   | R8.9.2  | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.4  | 陰性   |
| 18840 | 本巢市神海地内    | R8.9.2  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.9.4  | 陰性   |
| 18841 | 郡上市八幡町地内   | R8.8.30 | 捕獲 | 雌  | 約 72 cm  | R8.9.4  | 陰性   |
| 18842 | 美濃加茂市伊深町地内 | R8.9.1  | 捕獲 | 雌  | 約 85 cm  | R8.9.4  | 陰性   |
| 18843 | 瑞浪市釜戸町地内   | R8.9.1  | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.9.4  | 陰性   |
| 18844 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.9.1  | 捕獲 | 雄  | 約 102 cm | R8.9.4  | 陰性   |
| 18845 | 各務原市鵜沼地内   | R8.9.1  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.9.4  | 陰性   |
| 18846 | 各務原市鵜沼地内   | R8.9.1  | 捕獲 | 雄  | 約 50 cm  | R8.9.4  | 陰性   |
| 18847 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.9.2  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.9.8  | 陰性   |
| 18848 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.9.2  | 捕獲 | 雄  | 約 80 cm  | R8.9.8  | 陰性   |
| 18849 | 本巢市木知原地内   | R8.9.3  | 捕獲 | 雌  | 約 120 cm | R8.9.8  | 陰性   |
| 18850 | 本巢市木知原地内   | R8.9.3  | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.8  | 陰性   |
| 18851 | 郡上市白鳥町地内   | R8.9.2  | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.8  | 陰性   |
| 18852 | 関市中之保地内    | R8.9.3  | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.9.8  | 陰性   |
| 18853 | 美濃加茂市牧野地内  | R8.9.6  | 捕獲 | 雌  | 約 125 cm | R8.9.8  | 陰性   |
| 18854 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.9.4  | 捕獲 | 雌  | 約 58 cm  | R8.9.8  | 陰性   |
| 18855 | 関市下之保地内    | R8.9.5  | 捕獲 | 雌  | 約 53 cm  | R8.9.8  | 陰性   |
| 18856 | 中津川市中津川地内  | R8.9.4  | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.9.8  | 陰性   |
| 18857 | 高山市朝日町地内   | R8.9.7  | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.9.10 | 陰性   |
| 18858 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.9.4  | 捕獲 | 雄  | 約 85 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18859 | 大垣市青墓町地内   | R8.9.5  | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18860 | 美濃加茂市三和町地内 | R8.9.5  | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18861 | 高山市片野町地内   | R8.9.5  | 捕獲 | 雌  | 約 95 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18862 | 大垣市青野町地内   | R8.9.6  | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18863 | 関市小野地内     | R8.9.6  | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.9.10 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18864 | 関市神野地内      | R8.9.6  | 捕獲 | 雌  | 約 51 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18865 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.9.6  | 捕獲 | 雌  | 約 92 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18866 | 本巣市木知原地内    | R8.9.7  | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18867 | 恵那市山岡町地内    | R8.9.4  | 捕獲 | 雄  | 約 98 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18868 | 恵那市明智町地内    | R8.9.7  | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18869 | 土岐市駄知町地内    | R8.9.6  | 捕獲 | 雄  | 約 86 cm  | R8.9.10 | 陰性   |
| 18870 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.9.8  | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.9.15 | 陰性   |
| 18871 | 下呂市金山町地内    | R8.9.8  | 捕獲 | 雌  | 約 70 cm  | R8.9.15 | 陰性   |
| 18872 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.9.10 | 捕獲 | 雄  | 約 75 cm  | R8.9.15 | 陰性   |
| 18873 | 中津川市千旦林地内   | R8.9.5  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.9.15 | 陰性   |
| 18874 | 中津川市手賀野地内   | R8.9.5  | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.9.15 | 陰性   |
| 18875 | 海津市南濃町地内    | R8.9.11 | 捕獲 | 雌  | 約 75 cm  | R8.9.15 | 陰性   |
| 18876 | 中津川市中津川地内   | R8.9.11 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.9.15 | 陰性   |
| 18877 | 恵那市山岡町地内    | R8.9.8  | 捕獲 | 雌  | 約 85 cm  | R8.9.15 | 陰性   |
| 18878 | 恵那市山岡町地内    | R8.9.11 | 捕獲 | 雄  | 約 98 cm  | R8.9.15 | 陰性   |
| 18879 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.9.11 | 捕獲 | 雌  | 約 52 cm  | R8.9.15 | 陰性   |
| 18880 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.9.12 | 捕獲 | 雄  | 約 81 cm  | R8.9.15 | 陰性   |
| 18881 | 下呂市馬瀬地内     | R8.9.12 | 捕獲 | 雄  | 約 115 cm | R8.9.15 | 陰性   |
| 18882 | 関市志津野地内     | R8.9.11 | 捕獲 | 雌  | 約 110 cm | R8.9.17 | 陰性   |
| 18883 | 関市志津野地内     | R8.9.11 | 捕獲 | 雄  | 約 51 cm  | R8.9.17 | 陰性   |
| 18884 | 中津川市中津川地内   | R8.9.12 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.17 | 陰性   |
| 18885 | 中津川市中津川地内   | R8.9.12 | 捕獲 | 雄  | 約 105 cm | R8.9.24 | 陰性   |
| 18886 | 本巣市根尾口谷地内   | R8.9.13 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.9.17 | 陰性   |
| 18887 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.9.13 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.9.17 | 陰性   |
| 18888 | 本巣市外山地内     | R8.9.14 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.17 | 陰性   |
| 18889 | 関市下之保地内     | R8.9.14 | 捕獲 | 雄  | 約 97 cm  | R8.9.17 | 陰性   |
| 18890 | 関市中之保地内     | R8.9.12 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.9.17 | 陰性   |
| 18891 | 関市中之保地内     | R8.9.12 | 捕獲 | 雄  | 約 76 cm  | R8.9.17 | 陰性   |
| 18892 | 関市下之保地内     | R8.9.16 | 捕獲 | 雄  | 約 93 cm  | R8.9.24 | 陰性   |
| 18893 | 美濃加茂市蜂屋町地内  | R8.9.16 | 捕獲 | 雄  | 約 79 cm  | R8.9.24 | 陰性   |
| 18894 | 郡上市白鳥町地内    | R8.9.14 | 捕獲 | 雌  | 約 80 cm  | R8.9.24 | 陰性   |
| 18895 | 本巣市木知原地内    | R8.9.17 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.24 | 陰性   |
| 18896 | 本巣市根尾能郷地内   | R8.9.17 | 捕獲 | 雄  | 約 140 cm | R8.9.25 | 陰性   |
| 18897 | 郡上市白鳥町地内    | R8.9.17 | 捕獲 | 雄  | 約 110 cm | R8.9.25 | 陰性   |
| 18898 | 本巣市日当地内     | R8.9.18 | 捕獲 | 雄  | 約 65 cm  | R8.9.25 | 陰性   |
| 18899 | 美濃加茂市下米田町地内 | R8.9.21 | 捕獲 | 雌  | 約 60 cm  | R8.9.25 | 陰性   |
| 18900 | 飛騨市神岡町地内    | R8.9.23 | 調査 | 雌  | 約 120 cm | R8.9.25 | 陰性   |
| 18901 | 中津川市中津川地内   | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 73 cm  | R8.9.25 | 陰性   |
| 18902 | 下呂市金山町地内    | R8.9.20 | 捕獲 | 雄  | 約 95 cm  | R8.9.25 | 陰性   |
| 18903 | 美濃加茂市三和町地内  | R8.9.22 | 調査 | 雄  | 約 75 cm  | R8.9.25 | 陰性   |
| 18904 | 下呂市金山町地内    | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 80 cm  | R8.9.25 | 陰性   |
| 18905 | 恵那市明智町地内    | R8.9.19 | 捕獲 | 雌  | 約 100 cm | R8.9.25 | 陰性   |
| 18906 | 関市中之保地内     | R8.9.19 | 捕獲 | 雄  | 約 83 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18907 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.8.19 | 捕獲 | 雄  | 約 100 cm | R8.9.29 | 陰性   |
| 18908 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.8.20 | 捕獲 | 雌  | 約 91 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18909 | 岐阜市長良志段見地内  | R8.9.22 | 調査 | 雌  | 約 75 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18910 | 岐阜市三田洞地内    | R8.9.22 | 調査 | 雌  | 約 100 cm | R8.9.28 | 陰性   |
| 18911 | 岐阜市太郎丸地内    | R8.9.22 | 調査 | 雌  | 約 105 cm | R8.9.28 | 陰性   |
| 18912 | 瑞浪市小田町地内    | R8.9.22 | 調査 | 雄  | 約 105 cm | R8.9.28 | 陰性   |
| 18913 | 土岐市泉町地内     | R8.9.22 | 調査 | 雌  | 約 75 cm  | R8.9.28 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所     | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|-------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18914 | 瑞浪市稲津町地内    | R8.9.23 | 調査 | 雌  | 約 92 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18915 | 瑞浪市明世町地内    | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 87 cm  | R8.9.28 | 陽性   |
| 18916 | 土岐市泉町地内     | R8.9.23 | 調査 | 雌  | 約 100 cm | R8.9.28 | 陰性   |
| 18917 | 土岐市泉町地内     | R8.9.23 | 調査 | 雌  | 約 55 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18918 | 土岐市鶴里町地内    | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 75 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18919 | 中津川市蛭川地内    | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 120 cm | R8.9.28 | 陰性   |
| 18920 | 中津川市蛭川地内    | R8.9.23 | 調査 | 雌  | 約 60 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18921 | 恵那市長島町地内    | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 110 cm | R8.9.28 | 陰性   |
| 18922 | 恵那市岩村町地内    | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 80 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18923 | 郡上市八幡町地内    | R8.9.24 | 調査 | 雄  | 約 85 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18924 | 瑞浪市稲津町地内    | R8.9.24 | 調査 | 雌  | 約 75 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18925 | 瑞浪市稲津町地内    | R8.9.24 | 調査 | 雌  | 約 92 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18926 | 土岐市泉町地内     | R8.9.24 | 調査 | 雌  | 約 100 cm | R8.9.28 | 陰性   |
| 18927 | 土岐市泉町地内     | R8.9.24 | 調査 | 雄  | 約 75 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18928 | 土岐市曾木町地内    | R8.9.24 | 調査 | 雄  | 約 120 cm | R8.9.28 | 陰性   |
| 18929 | 土岐市鶴里町地内    | R8.9.24 | 調査 | 雄  | 約 90 cm  | R8.9.28 | 陰性   |
| 18930 | 中津川市中津川地内   | R8.9.24 | 調査 | 雄  | 約 120 cm | R8.9.29 | 陰性   |
| 18931 | 恵那市東野地内     | R8.9.24 | 調査 | 雄  | 約 75 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18932 | 土岐市鶴里町地内    | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 70 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18933 | 恵那市明智町地内    | R8.9.18 | 捕獲 | 雌  | 約 130 cm | R8.9.29 | 陰性   |
| 18934 | 垂井町平尾地内     | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 95 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18935 | 垂井町大滝地内     | R8.9.24 | 調査 | 雄  | 約 85 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18936 | 瑞浪市釜戸町地内    | R8.9.22 | 調査 | 雌  | 約 98 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18937 | 大垣市上石津町地内   | R8.9.24 | 調査 | 雌  | 約 73 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18938 | 岐阜市諏訪山地内    | R8.9.23 | 調査 | 雄  | 約 60 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18939 | 郡上市高鷲町地内    | R8.9.24 | 捕獲 | 雄  | 約 130 cm | R8.9.29 | 陰性   |
| 18940 | 美濃加茂市伊深町地内  | R8.9.23 | 調査 | 雌  | 約 70 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18941 | 各務原市鷺沼地内    | R8.9.24 | 調査 | 雌  | 約 94 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18942 | 本巣市日当地内     | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 70 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18943 | 美濃市保木脇地内    | R8.9.25 | 調査 | 雌  | 約 110 cm | R8.9.29 | 陰性   |
| 18944 | 美濃加茂市伊深町地内  | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 80 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18945 | 坂祝町黒岩地内     | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 140 cm | R8.9.29 | 陰性   |
| 18946 | 多治見市市之倉町地内  | R8.9.25 | 調査 | 雌  | 約 67 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18947 | 土岐市鶴里町地内    | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 110 cm | R8.9.29 | 陰性   |
| 18948 | 土岐市鶴里町地内    | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 90 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18949 | 中津川市千旦林地内   | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 92 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18950 | 中津川市千旦林地内   | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 92 cm  | R8.9.29 | 陰性   |
| 18951 | 恵那市明智町地内    | R8.9.24 | 調査 | 雌  | 約 74 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18952 | 恵那市明智町地内    | R8.9.25 | 調査 | 雌  | 約 80 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18953 | 美濃加茂市下米田町地内 | R8.9.27 | 調査 | 雌  | 約 110 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18954 | 郡上市和良町地内    | R8.9.26 | 調査 | 雌  | 約 75 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18955 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.9.24 | 調査 | 雌  | 約 120 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18956 | 御嵩町大久後地内    | R8.9.27 | 調査 | 雄  | 約 110 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18957 | 下呂市金山町地内    | R8.9.27 | 捕獲 | 雄  | 約 118 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18958 | 郡上市八幡町地内    | R8.9.27 | 調査 | 雄  | 約 95 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18959 | 美濃加茂市山之上町地内 | R8.9.25 | 調査 | 雌  | 約 95 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18960 | 郡上市八幡町地内    | R8.9.23 | 捕獲 | 雌  | 約 115 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18961 | 郡上市八幡町地内    | R8.9.25 | 捕獲 | 雌  | 約 35 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18962 | 川辺町比久見地内    | R8.9.25 | 調査 | 雄  | 約 95 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18963 | 瑞浪市土岐町地内    | R8.9.25 | 調査 | 雌  | 約 75 cm  | R8.10.1 | 陰性   |

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

| 番号    | 発見・捕獲場所    | 発見・捕獲日  | 状態 | 性別 | 体長       | 検査日     | 検査結果 |
|-------|------------|---------|----|----|----------|---------|------|
| 18964 | 瑞浪市小田町地内   | R8.9.25 | 調査 | 雌  | 約 80 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18965 | 瑞浪市小田町地内   | R8.9.25 | 調査 | 雌  | 約 72 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18966 | 岐阜市太郎丸地内   | R8.9.26 | 調査 | 雌  | 約 80 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18967 | 岐阜市長良志段見地内 | R8.9.26 | 調査 | 雌  | 約 82 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18968 | 本巣市根尾大井地内  | R8.9.26 | 調査 | 雄  | 約 92 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18969 | 海津市南濃町地内   | R8.9.26 | 調査 | 雄  | 約 80 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18970 | 瑞浪市日吉町地内   | R8.9.26 | 調査 | 雄  | 約 130 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18971 | 中津川市蛭川地内   | R8.9.26 | 調査 | 雄  | 約 92 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18972 | 中津川市中津川地内  | R8.9.26 | 調査 | 雌  | 約 138 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18973 | 岐阜市長良志段見地内 | R8.9.27 | 調査 | 雌  | 約 78 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18974 | 大垣市上石津町地内  | R8.9.27 | 調査 | 雌  | 約 75 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18975 | 大垣市上石津町地内  | R8.9.27 | 調査 | 雄  | 約 70 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18976 | 垂井町梅谷地内    | R8.9.27 | 調査 | 雄  | 約 75 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18977 | 八百津町八百津地内  | R8.9.27 | 調査 | 雌  | 約 66 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18978 | 瑞浪市稲津町地内   | R8.9.27 | 調査 | 雌  | 約 125 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18979 | 瑞浪市稲津町地内   | R8.9.27 | 調査 | 雄  | 約 85 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18980 | 恵那市串原地内    | R8.9.27 | 調査 | 雄  | 約 70 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18981 | 中津川市中津川地内  | R8.9.27 | 捕獲 | 雄  | 約 60 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18982 | 山県市田栗地内    | R8.9.28 | 調査 | 雌  | 約 80 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18983 | 海津市南濃町地内   | R8.9.28 | 調査 | 雌  | 約 110 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18984 | 瑞浪市稲津町地内   | R8.9.28 | 調査 | 雄  | 約 110 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18985 | 中津川市蛭川地内   | R8.9.28 | 調査 | 雌  | 約 85 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18986 | 下呂市金山町地内   | R8.9.28 | 調査 | 雌  | 約 100 cm | R8.10.1 | 陰性   |
| 18987 | 多治見市笠原町地内  | R8.9.28 | 調査 | 雄  | 約 85 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18988 | 中津川市中津川地内  | R8.9.26 | 調査 | 雄  | 約 75 cm  | R8.10.1 | 陰性   |
| 18989 | 大垣市上石津町地内  | R8.9.26 | 調査 | 雌  | 約 67 cm  | R8.10.1 | 陰性   |