

シラミ目 (シラミ類)

対応事項

被害概要は

どこで

いつ

どこを

症状は

周囲の環境

調査場所

虫の形態

主な発生時期

原因虫

虫にさされた、かまれた、かゆい

室内

1日中

主に頭をさされている

腹部、脇の下等体の柔らかい部分をさされている

主に陰部をさされている

激しいかゆみ
発疹チフス

青斑が生じ、激しいかゆみ
発疹チフス

家族、共同生活者等も同様な症状

さされている付近、成虫がいたり卵を付着させる場所は頭髮に多いので調査

さされている付近、成虫がいたり卵を付着させる場所は衣類、毛布等の繊維に多いので調査

さされている付近、成虫がいたり卵を付着させる場所は陰毛に多いので調査

成中の体長は、2.3～3.3mm、体に暗斑がある。体は、未吸血時淡黄色～灰白色、吸血時赤褐色～黒褐色
卵は、乳白色～黄白色

成虫の体長は2.5～3.5mm、体の色は、アタマジラミに似る。
卵は乳白色～黄白色

成虫の体長は、1.2～2.0mm、体は未吸血時褐色、吸血時赤褐色～黒褐色



発生 年中
被害 5～6、9～11
2月

発生 年中
被害 冬

発生 年中

アタマジラミ

コロモジラミ

ケジラミ